

384241B

TV. 2. 20

M xx

19/n



H A N D B O E K

D E R

PAARDENKENNIS.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

H A N D B O E K

D E R

PAARDENKENNIS,

VOOR DEN BURGER- EN KRIJGSSTAND;

D O O R


C. A. GEISWEIT VAN DER NETTEN,

MAJOR BIJ DE KAVALLERIJ EN INSTRUC-
TEUR BIJ DE KONINGLIJKE MILITAIRE
RIJDSCHOOL.

II. DEEL.

BEVATTENDE DE GEZONDHEIDSBEWARING EN
GENEESWIJS VAN DE ZIEKTEN DER PAARDEN.Te 's GRAVENHAGE en AMSTERDAM,
Bij de Gebroeders VAN CLEEF.

1817.





INLEIDING.

Hoe zeer het naauwkeurig volgen der voorschriften der gezondheidskunde, aanmerkelijk het getal der ziekten vermindert, die uit hunne verwaarloozing ontspruiten, verschilt nogtans de levenswijs des paards, in den getemden staat te zeer van dien der vrije natuur, dan dat zij deszelfs gezondheid in dezen, even min als in genen, zouden storen, en al ware het zelfs, dat de kennis en waarneming der gezondheidsregels voldoende mogten zijn, ter afwending diergene welke uit hunne verzuimenis ontstaan, zoude dit slechts een ongenoegzaam behoedmiddel ter hunner geheele voorkoming opleveren, daar de dienst welke de mensch van hetzelfde vordert, vaak tot eene behandeling noopt, welke door deze regels volstrekt gewraakt, zoo in levenswijze als voeding het tegenover gestelde is dergene die door haar voorgeschre-

I N L E I D I N G.

schreven wordt, en die met deszelfs natuurstaat het meeste overeen stemt. Bovenal zijn het de krijgspaarden bij welke de drang der omstandigheden, niet alleen de oplettende waarneming dezer voorschriften in den weg staat, en daardoor den kiem tot eene menigte ongesteldheden legt, maar hen dagelijks aan een aantal beschadigingen bloot stelt, die zij als onafscheidelijke gevolgen des oorlogs met den krijgsman gemeen hebben, en welke volstrekt genees- en heekundige hulp vereischen. Dit zij genoeg om de kennis der middelen ter genezing dezer ongesteldheden volstrekt noodzakelijk, en in die evenredigheid belangrijker te doen beschouwen, als het aantal bekwame paardenartsen zeldzamer is, en daardoor veelal slechts de keuze over blijft, tusschen de genezing des zoo nuttigen paards aan de onkunde toe te vertrouwen, of haar alleen aan de natuur over te laten; geringe ongesteldheden, die in den aanvang gemakkelijk hadden kunnen worden weg genomen, ontaarden dikwerf door zoodanig verzuim in ernstige ziekten, of de verkeerde en ondoelmatige behandeling doet vele anderzins onbeduidende toevallen, maar al te vaak de doodelijkste gevolgen hebben.

Niet verder dan in de dagelijkse ondervinding behoeft men de voorbeelden tot staving van dit betoog te zoeken; immers hoe vaak gebeurt het niet, dat het
paard

I N L E I D I N G.

paard des officiers op marsch, dat des burgerlijken reizigers op weg, of van den landman op zijne afgelegen landhoeve, onverhoeds door eene ernstige, spoedige hulp vereischende ongesteldheid aangetast wordt; welke is dan niet luime verlegenheid, en hoe menigmaal heeft niet de ongunstigste uitflag plaats, indien zij alsdan alleen vande hulp afhangen, die hen de nabijheid van eenen veeärts verleen kan, en welke maar al te vaak door zijne verwijdering of mangel aan kunde, te spade of vruchteloos aangewend wordt, terwijl daarentegen de nadeelige gevolgen grootendeels zonden voorgekomen worden, indien eene aanwijzing tot eigene behandeling der meest voorkomende ziekten en toevallen, in staat stelde, in dringende gevallen, de doelmatigste middelen aan te wenden, en daardoor de schaarsheid aan waarlijk bekwame veeärtsenijkundige, onschadelijker te maken.

Bovenal en met regt moge men zich verwonderen, over den lagen trap, waarop het vak der veeärtsenijkunde zich in een land bevindt, waarin de veeteelt tot eene der hoofdbronnen van welvaart verstrekt, en dat, terwijl Holland zich te regt beroemen kan, in de geneeskunde de grootste mannen te hebben opgeleverd, deze tak zoodanig terugstaat tegen deszelfs voortgangen in naburige landen, dat het even min de namen van be-

I N L E I D I N G.

roemde paardenärzten, als schriften over dit vak, onder hare oorspronkelijke voortbrengselen vermag op te tellen, en dat, indien men de verhandelingen over eenige bijzondere onderwerpen uitzondert, welke door beroemde geneesheeren uitgegeven, den aandacht der beoefenaren der veeärtsenkunde overwaardig zijn, de laatste zich alleen beperken tot eenige voorschrift-boekjes en samenrapingen onzer verlichte tijden onwaardig, en de vertalingen der werken van BOURGELAT, VITET, enz., welke, daar zij met de voortgangen der latere geneeskunde geen en gelijken tred hebben gehouden, geenszins de algemeene behoefte voldoen kunnen.

Bestond er echter ooit een tijdperk, waarin de middelen tot gezondheids-bewaring en genezing der paarden verdienden gewaardeerd, en de zorgvuldigste oplettendheid geschonken te worden, het is datgene welk wij thans beleven, daar de voorbeeldeloos moorddadige oorlogen onzes tijds, eene zoodanige vernieling dezes nuttigen huisdiers hebben te wege gebragt, dat niet alleen deszelfs rasfen ten eenemaal verbasterd, maar zelfs de stoeterijen verwoest en uitgeput zijn geworden, waardoor niet alleen deszelfs prijs tot eene voorbeeldelooze hoogte is gestegen, maar een goed paard eene wezenlijke zeldzaamheid geworden is.

OF.

I N L E I D I N G.

Offchoon een verlicht bestuur, door de nadrukkelijkste pogingen, blijken geeft welke waarde door haar aan dezen tak wordt gehecht, zal er echter nog een aanmerkelijk tijdvak moeten verloopē, alvorens derzelver vruchten tot die rijpheid gedijen, dat zij de algemeen heerschende mangel wegnemen kunnen.

Het kan derhalve voor ieder die eenige betrekking op paarden heeft, niet anders dan ten uiterste belangrijk zijn, door het ontvangen eener handleiding tot onderscheiding hunner meest voorkomende ziekten, en ter aanwending der eenvoudigste geneeswijze, zich van de zorg ontheven te zien welke iedere ongeesteldheid hem moest veroorzaken, waarin hij geen paardenärts kon raadplegen of te hulp roepen; en het zijn de bovengemelde beweegredenen die den schrijver genoopt hebben tot het wagen eener poging om dezen taak te volbrengen, welke hem toefcheen niet zoo zeer in het ontwerpen van een volledig zamenstelsel der paardenärtsfenijkunde, als wel in dat van een huis- en handboek te moeten bestaan, dat een ieder ten vraagbaak en raadgever konde verstrekken, en tevens ten grondslag dienen tot eene verdere beoefening der veeärtsfenijkunde, tot welks bevordering de opgave der voornaamste werken over dezelve, en tot verstaan der schrijvers in andere talen, ook de benamingen der geneesmiddelen en ziekten

I N L E I D I N G.

ruimschotiger voorgesteld is, ten einde deze, welke zeker het grootste gedeelte der lezers dezes werks zullen uitmaken, in hun gebrek aan ar. t. s. k. d. g. e. w. e. t. e. n. s. c. h. a. p. p. e. n te gemoet te komen; tot welk einde ook de bijgevoegde platen moeten dienen.

Het zoude de laatlunkendste vooringenomenheid verraden, gevoelde niet de schrijver hoe veel dit werk in waarde zoude hebben gewonnen, ware deszelfs volvoering door iemand ondernomen, die met alle vakken der artsenijkunde gemeenzaam, deze taak geheel had willen of kunnen afwerken, en daarin niet gelijk hij, door aan dit vak ten eenemaal vreemde werkzaamheden gedurig gestoord was geworden; het zij hem echter geoorloofd de hoop te mogen koesteren, dat zijne pogingen ter uitbreiding eener algemeene kunde van dit belangrijk onderwerp, hun doel niet geheel zullen gemist hebben, en dat, in afwachting een volkomener werk dit beter bereike, zij intusfchen het heerschende gebrek aan eene voortgelijke handleiding in onze taal, eenigermate zullen te gemoet komen.

Indien er eenige grond bestaat om deze verwachting op te mogen bouwen, zoo is dezelve in de krachtadige ondersteuning gelegen, welke hij in zijnen arbeid van verscheidene onzer verdienstelijke geneeskundigen,

en


en bijzonder van den heer ALEXANDER, Med. Doct. en Chir. Majoor bij de Koninklijke Militaire School, heeft ontvangen, en die hij niet nalaten kan pligtschuldig zijnen opregten dank daarvoor te betuigen; daar niet alleen hunne teregtwijzingen veel hebben toegebragt om het werk, een geregelder zamenhang te doen verkrijgen, maar zoo door het ophelderen van de denkbeelden des schrijvers als de mededeeling der hunne nopens den aard en de vereischte behandeling van onderscheidene ziekten, ook het wetenschappelijke gedeelte belangrijker voor meer onderrigte is geworden, waardoor, indien het algemeene oordeel eenige waarde aan dit werk mogte toekennen, het tevens hun alle aanspraak geeft, om de algemeene erkentenis, voor hunne aangewende moeite te verwachten.

Daar zelden eene eerste poging anders dan met vele onvolmaakheden vergezeld, het doelwit nadert, zij het verre van den schrijver te verwachten, dat deze iets beter zoude slagen, of dat hij eene hoogere verwachting koestere, dan dat het goede dat er in bevat mag zijn, het minder volkomene verschooning in de oogen van kunstervarene beoordeelaren zal doen verwerven, en deze daarbij de bedoeling des werks, en de klasfe der lezers voor welke het bestemd is, wel in het oog zullen willen houden.

Bewust hoe veel aan dit werk, op eene beperkte

I N L E I D I N G.

fchaal ontworpen, nog ter volkomenheid ontbreekt, zullen alle gegronde en onderrigtende te regt wijzigen door hem steeds met genoegten ontvangen, en van dezelve een gepast gebruik gemaakt worden, in een bijvoegfel, dat dit handboek staat te volgen; terwijl hij diegene wier oordeel zijne onderneming befchouwen mogt, volftrekt het voorgestelde doel gemist te hebben, dringende uitnoodigt, door zamenftelling eener betere handleiding, het gebrekkige te verbeteren, dat met iedere eerfte fchrede op eenen nieuwen weg onaffcheidelijk gepaard gaat, en zich daardoor eene wel verdienende aanspraak op de algemeene erkenfenis te verwerven.



*AANWIJZING der voornaamste werken
over de paardenkennis en geneeskunde.*

Daar het dengenen, welke eene uitgebreidere kunde in de paardenartsenijkunde wenscht te verwerven, dan dit werk hem verleen kan, ten hoogsten belangrijk is, de daartoe geschiktste bronnen te kennen, zal de volgende aanwijzing hem voorzeker welkom zijn, daar dezelve die der voornaamste en nieuwste werken bevat, welke over de onderscheidene deelen dezer wetenschap in het licht verschenen zijn.

A. Werken over alle deelen der paardenkennis, ontleed- en artsenijkunde.

La Fosse, cours d'hippiatrique, Paris 1772, gr. fol. met 65 pl. vertaald in het hoogduitsch onder den titel van:

——— lehrbegriff der arzneikunst, von Knoblauch, 1788. 4 th. gr. 8°. met 57 pl.

——— Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, Paris 1776. 4 vol. in 8°.

Pil-

A A N W I J Z I N G

Pilger, systematisches handbuch der theoretische practische vétérinaire wissenschaft, Giesfen 1804. 4 th. 8°.

Profesfor Busch, system. der theoretisch pract. vétérinaire-wissenschaft, zum behuf academischer vorlesungen, Marburg 1806—16. 4 th. 8°.

Delabare Blaine, notions fondamentales de l'art vétérinaire, traduit de l'anglais, Paris 1803. 3 vol. in 8°.

B. Over de bijzondere hoofddeelen derzelve.

a) Natuurlijke geschiedenis en uitwendige kennis van het paard.

Naumann, über die vorzüglichste theilen der pferde-wissenschaft, Berlin 1815. 2 th. gr. 8°.

Gotthard, dasz ganze der Pferdezuht, Erfurth 1804. 2 th. 8°.

Sebald, naturgeschichte des pferdes. Munchen 1812. 8°.

Bourgelat, conformation extérieure du cheval, Paris 1808. 8°.

b.) Gezondheidskunde.

Ammon, tasschenbuch, über die wartung, pflegung und behandlung der pferde, Giesfen 1806.

Wollstein und Fügler, über die zuht und wartung der kriegs- und bürgerpferde.

c.)

V A N W E R K E N.

1.) Over de ontleed- en natuurlijkkunde in
het bijzonder.

Stubbs, the anatomy of the horse, London 1766. gr. fol.

Bourgelat. précis anatomique du cheval, Paris 1807.
2 vol. 8°.

Girard, anatomie des animaux domestiques, Paris 1807.
2 vol 8°.

Cuvier, leçons d'anatomie comparée, Paris 1802. 5 vol.
in 8°.

Blumenbach, handbuch der vergleichende anatomie,
Göttingen 1 15. 8°.

2.) Het werktuigelijke samenstel des paards.

Goiffon en Vincent, mémoire artificielle sur la ré-
présentation fidèle des animaux. 1^{re} partie, le cheval, Paris
1779. 3 vol. in fol.

3.) Kennis der geneesmiddelen.

Bourgelat, matière médicale raisonnée, Paris 105.
2 vol. 8°.

Ypei, handboek der materia medica, Amst. 1811. gr. 8°.

Bouillon la Grange, dispensaire pharmaco-chimique
à l'usage des élèves des écoles vétérinaires, Paris 1813. 8°.

4.) Veeartsfenijkundige kruidkunde.

Buchoz, manuel vétérinaire des plantes, Paris 1799. 8°.

Veith,

A A N W I J Z I N G.

Veith, abrisz der kräuterkunde für thierarzte und oecomenen, Wien 1813. 8°

Oswald, beschrijving en afbeelding der artsenij-gewas-
ten, Amst. 1796. 6 deelen in 3°.

f.) Ziekten-, genees- en heelkunde.

Wollstein, von innerliche krankheiten der füllen der
kriegs- u bürgerpferde.

———— bücher der wundarzney der thiere.

Ammon, vollständiges handbuch der practische pferde-
arzneikunde, Heelbron 1807. 8°.

Tenneker, handbuch der practische arzneimittellehre,
1798. 2 th. 8°.

———— roszarz, 1806. 2 banden gr. 8°.

Rohlwes, der taschen-pferdenarzt, Berlin 1807. 8°.

Jung, lehrbuch der vétérinair-wissenschaft, umgearbeitet
durch prof. Busch, Frankfort und Leipzig 1800. 8°.

Busch, recept-taschenbuch für angehende thierarzte,
oder beschreibung der gewöhnliche krankheiten der haus-
thiere, Marburg 1801. 8°.

Schreger, operations-lehre für thierarzte.

C. Werken en verhandeligen over on-
derscheidene deelen der paarden-
artsenijkunde.

a.) Over de gebreken der voeten en het beslag
Kers.

V A N W E R K E N.

Nersting, unterricht zum beschlag und heilung der gebrochen der füsse, Göttingen 1794. 8°.

Colemans, bemerkungen über den bau, die erhaltung und krankheiten des pferdefüßes und beschlag, Gießen 1804. 8°.

Clarke, dissertation on the foot of the horse and shoeing, London 1812. 4°.

La Fosse, Guide du maréchal, Paris 1766. 4° en 8°.

Bourgelat, essai théorique et pratique sur la ferrure,

Girard, traité du pied des animaux domestiques et des ferrures, Paris 8°.

b.) Over verschillende onderwerpen.

Instructions vétérinaires par Chabert, Flandrin et Huzard, Paris 1809. 6 vol. 8°.

Fromage de Feugré, correspondance sur la conservation et l'amélioration des animaux domestiques, Paris 1810.

Rohlfes, magazin für die thierarzneikunde, 1802. 4th.

Ludwich, auferlesene beyträge zur thierarzneikunde, Leipzig 1786 — 33. 4 th. 8°.

Viborg, sammlung von abhandlungen für thierärzte, Kopenhagen. 4 th. 8°.

Tenneker, zeitung für die pferdezucht, Tubingen, 1804. 4 th. 8°.

Ten-

AANWIJZING VAN WERKEN.

Tenneker, Beschreibung auf die leichteste art pferde zu
angelifiren, 8^o.

A. G. Camper, abhandlung von den krankheiten die
zo wohl menschen als thieren eigen sind, met anmerk. en
zufatzen ausgeg. durch J. M. Herbell, Lingen 1794.



INHOUD.

EERSTE AFDEELING.

OVER DE KENMERKEN VAN DEN STAAT VAN GEZONDHEID EN ZIEKTE. Bl. I.

§ 1.	Belangrijkheid en aanwijzing derzelve.	ib.
2.	Vershil der teekenen, welke het onderscheid tusfchen den staat van ziekte en gezondheid aanwijzen.	2.
	De teekenen van gezondheid en ziekte.	
3.	Wijze waarop men dezelve onderzoekt.	ib.
4.	Onderscheiding der kenteekenen.	3.
5.	Aanwijzing der uitwendige teekenen.	4.
I.	HOOFDD. <i>De teekenen van gezondheid.</i>	5.
§ 6.	Over dezelve in het algemeen, en waaruit men ze ontleent.	ib.
ART. 1.	De trappen des ouderdoms.	ib.
§ 7.	Welke teekenen dezelve opleveren.	ib.
ART. 2.	De onderscheidene verrigtingen.	7.
§ 8.	De levensverrigtingen, als: de omloop des bloeds en de ademhaling.	ib.
9.	De dierlijke verrigtingen: gevoel en beweging.	ib.
	**	§ 10.

INHOUD.

§ 10. De natuurlijke: voeding, ontlastingen en afschei- dingen	Bladz. 3.
ART. 3. De temperamenten.	10.
§ 11. Welk befluit deze vergunnen.	ib.
ART. 4. De gesteldheid der onderscheidene levenswerktuigen en ligchaams- deelen.	11.
§ 12. Welke teekenen de levenswerktuigen tot gezondheid opleveren.	ib.
13. Welke de ligchaamsdeelen.	13.
II. HOOFDD. <i>De teekenen van ziekte.</i>	14.
ART. 1. Kenmerken welke de levensverrig- tingen opleveren.	ib.
§ 14. Waaruit deze bestaan.	ib.
a. <i>De pols.</i>	ib.
15. Deszelfs beschrijving, wijziging en getal.	ib.
16. Onderscheidene afwijkingen in den staat van ziekte.	15.
b. <i>De ademhaling.</i>	18.
17. Algemeene verdeling.	ib.
18. Onderscheidene kenteekenen welke de ademhaling op- levert.	19.
19. Het hoesten.	22.
20. Het proesten en briefchen	23.
ART. 12. De dierlijke verrigtingen.	ib.
§ 21. Te sterke levenswerkzaamheid.	ib.
22. Vermeerderde prikkelbaarheid.	24.
23. Verminderde prikkelbaarheid, rilling, verstijven, kramp, trekkingen.	ib.
	§ 24.

I N H O U D.

§ 24. Pijn.	Bladz. 26.
25. Gedaalde levenskracht: vermoeidheid, afge- marheid, verlamming, gevoelloosheid, beven, zwak- heid.	27.
26. Aangetaste levenskracht	28.
27. Kenmerken door de uitwendige zinnen: gevoel	29.
28. Reuk.	ib.
29. Gezigt.	ib.
ART. 3. De inwendige zinnen.	32.
§ 30. Bewustzijn, gevoelloosheid, razernij, slaap.	ib.
ART. 4. De natuurlijke verrigtingen.	33.
§ 31. Honger, dorst, kaauwen, slikken.	ib.
32. Spijsvertering.	34.
33. Ontlastingen: afgang, pis.	ib.
34. Affcheidingen: speekfel, snot, zweet.	36.
35. Het bloed.	38.
ART. 5. Teekenen der onderscheidene lig- chaamsdeelen.	39.
§ 36. Verandering van den omtrek des ligchaams: dikte, dunte en magerheid; opzwellling van bijzondere deelen.	ib.
37. Veranderde tempering des ligchaams: warmte, hitte, koude en derzelver afwisfeling.	40.
38. Kenteekenen aan de ledematen: ooren, neus, mond, tong, kaakklieren, borst, buik, voeten, staart, huid, haren.	42.
39. Uitwendig gedrag: staan, gaan, liggen, op- staan, onvermogen daartoe.	46.
40. Bijzondere ziekte-kenteekenen.	49.
41. Uitwendige ziekte-kenteekenen.	ib.

INHOUD.

TWEEDE AFDEELING.

DE ZIEKTEN.

<i>De oorzaken en onderscheiding der ziekten.</i>	Bl. 51.
<i>a. Oorzaken der ziekten.</i>	<i>ib.</i>
§ 42. Oorzaken der ziekten: verwijderde en naaste.	<i>ib.</i>
43. Uit de zes zoogenaamde niet natuurlijke dingen.	54.
De lucht, de behandeling, het verblijf, voedsel, slapen en waken.	<i>ib.</i>
De lucht.	<i>ib.</i>
Hemelftrek en landsgesteldheid.	<i>ib.</i>
Verblijfplaatsen.	55.
Te veel rust en arbeid, te sterke inspanningen en langdurige vermoeijenis.	56.
Voedsel: overmaat en gebrek.	<i>ib.</i>
Verhinderde ontlastingen en afzonderingen.	57.
44. Scheikundige en werktuigelijke.	58.
Ziekte - smetstof.	<i>ib.</i>
Vergiften: delf-, groeistoffelijke, dierlijke.	<i>ib.</i>
Werktuigelijk.	59.
Steenen, wormen, uitwendige beschadigingen.	<i>ib.</i>
45. Voorbereidende en verwijderde oorzaken.	<i>ib.</i>
Aanleg tot ziekte.	<i>ib.</i>
46. Gebreken der vorming.	60.
Erfelijke, aangeborene, verworvene.	<i>ib.</i>
<i>b. Onderscheiding en verdeeling der ziekten.</i>	61.
47. Wezenlijk onderscheid.	<i>ib.</i>
48. Toevallige onderscheidingen.	62.
49. Volgens de leeftijden, levenswijze, geslachten en jaargetijden.	<i>ib.</i>
50. Volgens hun toevallig onderscheid.	<i>ib.</i>
51. Naar het getal: in heerschende, afzonderlijk voorkomende en tuschenloopende.	<i>ib.</i>
	§ 52.

I N H O U D.

§ 52. Oorsprong: erfelijke; verkregene.	62.
53. Enkelvoudige en zamengeftelde.	63.
54. Volgens de plaats: algemeene, plaatfelijke, uit- en inwendige.	ib.
55. Naar de toevallen: idiopatifche en fymptomatifche.	ib.
56. Naar de mededeeling: in befmettelijke en niet befmettende.	64.
57. Naar den tijd van duur: fneleindigende, fleepende.	ib.
58. Naar de afwifeling: aanhoudende, afgaande, wifelende, periodieke.	ib.
59. Naar de levenskracht: vermeerderde, verminderde.	ib.
60. Volgens den uitflag: geneesbare, ongeneesfelijke, terugkomende, doodelijke.	ib.
61. Naar de tijdperken: begin, toenemen, ftand, vermindering en einde der ziekte.	65.

I. HOOFDD. *Ziekten welke bijzonder het geftel der opflorpende vaten aandoen.* 66.

ART. I. De droes. ib.

§ 62. Deszelfs aard in het algemeen.	ib.
63. Algemeene oorzaken.	67.
64. Verfchillende trappen: verkoudheid.	ib.
65. De gewone of goedaardige droes.	ib.
66. Deszelfs kenteekenen.	68.
67. Merkteekenen van den toefland der ziekte.	ib.
68. Onderfcheidene karakters welke dezelve aanneemt.	69.
69. De boosaardige droes.	70.
70. Deszelfs uitgang en kenteekenen.	ib.
71. Toevallen welke zich vaak daarbij voegen.	71.
72. De verplaatfte droes.	ib.
73. De omzwervende droes.	72.
74. Over de geneeswijze van den droes in het algemeen.	ib.
75. Over die der verkoudheid of van eenen ligtten droes.	73.
1.] Vervaardiging der meeldranken.	74.
76. Die van den goedaardigen droes.	ib.
2.] Dampbaden.	77.

INHOUD.

3.] Lavementen.	Bladz.	75.
§ 77. Die van den boosaardigen droes.		76.
4.] Gebruik van kamfer en salpeter.		77.
78. Van den verplaatsten droes.		78.
79. Behandeling wanneer de ziekte vermindert.		79.
80. Wanneer een hoest overblijft.		ib.
ART. 2. De kwade droes.		79.
§ 81. Deszelfs aard.		ib.
82. Oorzaken en zetel.		80.
83. Kenmerken in de drie onderscheidene trappen dezer ziekte.		ib.
84. Bijzondere onderscheidings-teekenen.		82.
85. Bepaling wanneer dezelve besmettelijk wordt		ib.
5.] Hoedanig de besmetting geschiedt.		83.
86. Wanneer men den droes als verdacht kan beschouwen.		ib.
87. Deszelfs genezing.		84.
88. Geneeswijze van den eigenlijken kwaden droes.		ib.
89. Middelen daartoe door de veeartsenijkundige aangeprezen. St. PAUL.		86.
90. Door WOLSTEIN.		ib.
5.] Geneeswijze van COLLAINÉ, in den kwaden droes en worm aangewend.		87.
ART. 3. De worm.		89.
§ 91. Aard dezer ziekte.		ib.
92. Derzelver oorzaken.		90.
93. Kenmerken van den eigenlijken worm.		ib.
94. Die van den oneigenlijken en deszelfs genezing.		91.

II. HOOFDD. De rheumatieke en krampachtige toevallen. Bl. 93.

ART. 1. De rheumatieke of zinkingachtige toevallen *ib.*

- § 95. Derzelver onderscheidene aard en oorzaken. *ib.*
 96. Kenmerken dergene welke met ontsteking verzeld zijn. *ib.*
 97. Geneeswijze. 94.
 98. Rheumatismus, onder den naam van onzwerfenden droes bekend. *ib.*
 99. Oorzaken en kenteekenen. *ib.*
 100. Geneeswijze. 95.
 a. Vervangenheid en jigt. 96.
 101. Deszelfs onderscheiding van de voorgaande. *ib.*
 102. Kenteekenen. *ib.*
 103. Uitflag. 97.
 104. Oorzaken. 93.
 105. Geneeswijze indien ze uit te veel rust ontstaat. 99.
 106. Indien vorige ziekten of vermoeijensissen ze veroorzaken *ib.*
 107. Wanneer ze aan slecht beslag en behandeling der voeten is toe te schrijven. 101.
 108. Langdurig reumatismus of jigt en stijfheid. 102.

ART. 2. De krampachtige toevallen 104.

- § 109. Welke deze zijn. *ib.*
 a. De klem. *ib.*
 110. Deszelfs beschrijving. *ib.*
 111. Oorzaken 105.
 112. Geneeswijze. *ib.*
 b. De kramp der beenen. 106.
 113. Onderscheiding. *ib.*
 114. Oorzaken. 107.
 115. Geneeswijze. *ib.*
 116. Uitflag. 108.

III. HOOFDD. Ziekten der levenswerktuigen. 109.

ART. 1. Ziekten der hersenen. *ib.*

INHOUD.

<i>a. Ontsteking der hersenen.</i>	Bladz. 109.
§ 117. Deszelfs oorzaak, kenteekenen en geneeswijze.	<i>ib.</i>
118. Bevangen door de hitte.	110.
<i>b. De kolder.</i>	<i>ib.</i>
119. Deszelfs onderscheiding.	<i>ib.</i>
120. Oorzaken.	<i>ib.</i>
121. Kenmerken van den stillen kolder.	111.
122. Die van den flapenden kolder.	112.
123. Die van den razenden kolder.	<i>ib.</i>
124. Deszelfs geneezing.	113.
ART. 2. De keelontsteking.	<i>ib.</i>
§ 125. Derzelver onderscheiding en oorzaken.	<i>ib.</i>
126. Kenmerken der inwendige	114.
127. Deszelfs geneeswijze.	<i>ib.</i>
128. Kenteekenen en geneeswijze der nitwendige.	115.
ART. 3. Ziekten van de werktuigen der ademhaling.	116.
§ 129. Over dezelve in het algemeen	<i>ib.</i>
<i>a. De ontsteking der long.</i>	<i>ib.</i>
§ 130. Verscheidene soorten der longontstekingen.	<i>ib.</i>
131. Onderscheiding in ware en valsche.	117.
132. Algemeene beschouwing van derzelver aard en voor- rstaande regels ter behandeling.	<i>ib.</i>
133. Aanwijzingen ter onderscheiding derzelve	121.
134. Oorzaken der ware longontsteking.	<i>ib.</i>
135. Die der valsche.	<i>ib.</i>
136. Algemeene kenmerken.	122.
137. Kenteekenen der ware longontsteking.	<i>ib.</i>
138. Die der valsche.	123.
139. Beschouwing van het zoogenaamde longenvuur.	124.
6.] Tijdperken van vermeerdeerde levenswerkzaam- heid en verzwakking in ontstekingsziek- ten.	<i>ib.</i>

I N H O U D.

§ 140.	Voorbehoedmiddelen.	Bladz.	125.
	7.] Voorbeelden van derzelver nut.		<i>ib.</i>
141.	Wijziging der geneeswijze.		126.
142.	Geneeswijze der ware longontstekingen in den aanvang.		<i>ib.</i>
143.	Behandeling derzelve in het tijdperk van verzwaking in de valsche longontstekingen.		127.
	8.] Middelen in gevreesd versterk.		<i>ib.</i>
144.	Uitgang der longontstekingen.		129.
	<i>b.) De dampigheid</i>		
145.	Derzelver beschrijving.		130.
146.	Oorzaken.		<i>ib.</i>
147.	Kenmerken.		<i>ib.</i>
148.	Geneeswijze.		131.
	<i>c.) De hoest</i>		<i>ib.</i>
149.	Onderscheiding.		<i>ib.</i>
150.	Oorzaken.		132.
151.	Kenmerken en geneeswijze van de drooge hoest.		<i>ib.</i>
152.	Geneeswijze van de zwakke vochtige en krampachtige hoest.		133.
	ART. 4. Ziekten der ingewanden.		134.
	<i>a.) Het kolijk of buikwyze</i>		<i>ib.</i>
§ 153	Deszelfs onderscheiding.		<i>ib.</i>
154.	Algemeene toevallen en kenteekenen.		<i>ib.</i>
155.	Het windkolk.		<i>ib.</i>
156.	Deszelfs genezing.		135.
157.	Het kolijk door verkouding.		136.
158.	Het krampkolk.		<i>ib.</i>
159.	Deszelfs oorzaken.		<i>ib.</i>
160.	Geneeswijze		137.
161.	Het kolijk door onverteerbaarheid.		138.
162.	Geneeswijze.		139.
163.	De verftoptheid.		<i>ib.</i>
	** 5		<i>b.)</i>

I N H O U D.

b.) <i>De loop.</i>	.	.	.	Bladz. 140.
§ 164. Deszelfs verschillende foorten.	.	.	.	<i>ib.</i>
165. Oorzaken.	.	.	.	<i>ib.</i>
166. Onderscheidings - teekenen.	.	.	.	141.
167. De leverloop.	.	.	.	<i>ib.</i>
168. Uit zwakte der verterings - werktuigen.	.	.	.	<i>ib.</i>
169. Het zoogenaamde vetsmelten.	.	.	.	<i>ib.</i>
170. De bloedloop.	.	.	.	142.
171. Geneeswijze	.	.	.	<i>ib.</i>
172. Wanneer de loop een ontstekend karakter bezit.	.	.	.	<i>ib.</i>
173. Die van den galachtigen	.	.	.	143.
174. Die van den loop uit zwakte en gebrekkige afscheiding.	.	.	.	<i>ib.</i>
175. Die door verandering van voedsel veroorzaakt.	.	.	.	<i>ib.</i>
176. Algemeene regels in ziekten der ingewanden.	.	.	.	144.
177. Verstopt- of hardlijvigheid.	.	.	.	145.
c.) <i>Verlorene eetlust.</i>	.	.	.	<i>ib.</i>
178. Regels in het gebruik der middelen om deze te herstellen.	.	.	.	<i>ib.</i>
d.) <i>Wormen.</i>	.	.	.	147.
179. Derzelver verdrijving.	.	.	.	<i>ib.</i>
ART. 5. Ziekten van de werktuigen der pisontlasting.	.	.	.	148.
a.) <i>Opfopping van water.</i>	.	.	.	<i>ib.</i>
§ 180. Derzelver oorzaken.	.	.	.	<i>ib.</i>
181. Kentekenen.	.	.	.	<i>ib.</i>
182. Geneeswijze.	.	.	.	<i>ib.</i>
183. De koude pis of louterstal.	.	.	.	149.
IV. HOOFDD. <i>De toevallen door uitwendige oorzaken voortgebracht, of die zich uitwendig aan het ligchaam vertoonen.</i>	.	.	.	150.
ART. 1. De vergiftigingen.	.	.	.	<i>ib.</i>
§ 184. Derzelver onderscheidene werking en eigenschappen.	.	.	.	151.
	.	.	.	a.)

I N H O U D.

<i>a.) De delfstoffelijke vergiften.</i>	Bladz.	151.
185. Waaruit dezelve bestaan en hunne werking	<i>ib.</i>	
186. Tegengiften.		152.
<i>b.) De groeistoffelijke vergiften.</i>	<i>ib.</i>	
187. Optelling en beschrijving der werking van dezelve.	<i>ib.</i>	
188. Bijtende plantgiften.		153.
189. Hun tegengift.	<i>ib.</i>	
<i>c.) De dierlijke vergiften.</i>	<i>ib.</i>	
190. Waaruit dezelve bestaan.		154.
<i>a.) De dolle hondsbeest.</i>		
191. Deszelfs geneeswijze.	<i>ib.</i>	
<i>b.) De vergiftigingen door besmetting.</i>		
192. De besmettelijke ziekten		155.
ART. 2. De huidziekten.		156.
§ 193. Onderfcheiding derzelve.	<i>ib.</i>	
<i>a.) De fchurft.</i>	<i>ib.</i>	
194. Derzelver oorzaaken.	<i>ib.</i>	
195. Onderfcheiding.	<i>ib.</i>	
196. Geneeswijze, vooral der vochtige fchurft.	<i>ib.</i>	
9.] Middel van profesfor DUPUITREN.		158.
197. Geneeswijze der drooge fchurft en leefregel.		159.
198. De manenfchurft.		160.
<i>b.) Het verharen.</i>		160.
199. Beschouwing van hetzelfde.	<i>ib.</i>	
200. Waarschouwing tegen misbruiken.		161.
201. Behandeling der paarden in dit tijdstip.		163.
202. Verharen in buitengewone tijden.	<i>ib.</i>	
<i>c.) De luizen.</i>		164.
203. Oorzaken.	<i>ib.</i>	
204. Verdrijving derzelve.	<i>ib.</i>	

V. HOOFDD.

V. HOOFDD. *Over de koortfen.* Bladz. 165.

ART. 1. Over de koortfen in het algemeen. *ib.*

- § 205. Derzelver aard. *ib.*
 206. Onderscheiding. *ib.*

ART. 2. Over de koortfen met verhoogde levenskracht, (heete of ontstekings-koortfen) 167.

- § 207. Derzelver aard *ib.*
 208. Oorzaken, vereischten en loop. *ib.*
 209. Overgang tot verzwakking. 168.
 210. Kenmerken. *ib.*
 211. Bessifing, (kritif.) *ib.*
 212. Regels tot derzelver genezing 169.

ART. 3. Koortfen met verminderde levenskracht. 171.

- § 213. Derzelver onderscheiding. *ib.*
 a. *De rotkoortfen,* *ib.*

1.) *Over dezelve in het algemeen.* *ib.*

- § 214. Aan welke koortfen men dezen naam geeft. *ib.*
 215. Derzelver oorzaken. *ib.*
 216. Toevallen en kenmerken. *ib.*
 217. Bessifing (kritif.) 173.
 218. Onderscheiding volgens derzelver karakter en trappen. *ib.*
 219. Algemeene regel tot derzelver genezing 174.

10.] Aanmerking over het gebruik der opium. *ib.*

2.) *Bijzondere befchrijving dezer koortfen* 175.

220. Onderscheiding in twee foorten. *ib.*
 De goedtaardige. 176
 221. Algemeene kenteekenen *ib.*
 222. Het eerfte foort dezer koortfen. *ib.*
 223. Het tweede foort. 177.
 224. Het derde foort. *ib.*
 225. Het vierde foort. *ib.*

§ 226.

I N H O U D.

226.	Derzelver geneeswijze.	. . .	Bladz. 178.
	De boosaardige rotkoortsen of de longziekte.		<i>ib.</i>
§ 227.	Dezelve heeft drie tijdperken	. . .	<i>ib.</i>
228.	Derzelver onderscheidings-toevallen.	. . .	<i>ib.</i>
229.	Geneeswijze	180.
230.	Middelen tegen bijzondere toevallen.	. . .	<i>ib.</i>
231.	Behandeling en voedsel.	. . .	181.
	<i>b. De zenuwkoortsen.</i>		182.
232.	Derzelver aard	<i>ib.</i>
233.	Oorzaken.	<i>ib.</i>
234.	Onderscheidene trappen derzelve	. . .	183.
235.	Voorboden.	<i>ib.</i>
236.	Kenteekenen in het eerste tijdperk,	. . .	<i>ib.</i>
237.	In het tweede	184.
238.	In het derde	185.
239.	Geneeswijze	186.
240.	Leefregel.	<i>ib.</i>
	1.) De hoofdzwellings.		187.
241.	Aard dezer kwaal.	<i>ib.</i>
242.	Toevallen.	<i>ib.</i>
243.	Onderscheidingsteekenen en geneeswijs.	. . .	<i>ib.</i>
	2.) Boosaardige zenuwachtige slijmkoortsen.		188.
244.	Aard dezer ziekte.	<i>ib.</i>
245.	Onderscheidingsteekenen.	<i>ib.</i>
246.	Kenmerken.	189.
247.	Geneeswijze	<i>ib.</i>
248.	Zamengefelde rot-slijmkoortsen; derzelver behandeling.	<i>ib.</i>	
	<i>c. Koortsen uit verkeerde afscheiding der ingewanden.</i>		190.
	1.) De galkoortsen.		<i>ib.</i>
249.	Derzelver oorzaken en kenmerken.	. . .	<i>ib.</i>
250.	Geneeswijze volgens derzelver karakter	. . .	<i>ib.</i>
	2.) De slijmkoortsen.		191.
251.	Derzelver oorzaken en kenmerken.	. . .	<i>ib.</i>
252.	Geneeswijze	<i>ib.</i>

I N H O U D.

D E R D E A F D E E L I N G.

D E U I T W E N D I C E T O E V A L L E N.

§ 254. Derzelver onderscheiding. Bladz. 193.

I. H O O F D D. *De wonden.* *ib.*

ART. I. Over dezelve in het algemeen. *ib.*

§ 255. Beschrijving der wonden. *ib.*

256. Derzelver onderscheiding. 194.

257. Onderzoek van derzelver aard en kenmerken. *ib.*

258. Middelen om de bloedstorting te fleinen 196.

259. Genezing der wonden door spoedige vereeniging. 197.

II] Voordeelen dezer geneeswijze. *ib.*

260. Geneeswijs door verbanden. 198.

261. Door naden. *ib.*

262. Verdere behandeling. 199.

263. Toevallen tot genezing: ontfeking, ettering. 200.

264. Pijn, zwelling; middelen daartegen. 201.

265. Wondkoorts. *ib.*

266. Beoordeeling van den staat des ligchaams bij de genezing. 202.

267. Versterving. 203.

268. Het wilde vleesch. *ib.*

269. Ettering onmisbaar tot genezing. 204.

270. Etterbevorderende middelen. *ib.*

271. Verbetering van den etter. 205.

272. Vermindering van te sterke ettering. 206.

273. Behandeling der wonden. *ib.*

274. De wondranden. 207.

275. Diëet en behandeling van het paard, 208.

ART.

I N H O U D.

ART. 2. Over de wonden in het		
	bijzonder.	Bladz. 208.
a. De gehouwene wonden.		ib.
§ 276.	Derzelver aard.	209.
277	De halswonden.	ib.
278	De hoofdwonden.	ib.
279.	Algemeene behandeling der gehouwene wonden.	ib.
b. De gestokene wonden.		210.
§ 280.	Algemeene behandeling der gestokene wonden.	ib.
281	De voetwonden.	211.
	De voestwonden.	ib.
§ 282.	Derzelver onderscheiding in eenvoudige (vernagelen).	ib.
283.	In gevaarrijke.	212.
284.	In ongeneeslijke.	ib.
c. De geschotene wonden.		213.
§ 285.	Derzelver aard.	ib.
286.	Onderzoek.	ib.
287.	Behandeling en geneeswijze.	ib.
II. HOOFDD. De kneuzingen.		215.
ART. 1. Over de kneuzingen in het		
	algemeen.	ib.
§ 288.	Derzelver aard.	ib.
289.	Onderscheiding.	216.
290.	Geneeswijze.	ib.
291.	Door verdeeling.	217.
292.	Door ettering.	ib.
293.	Onderscheiden voort van kneuzingen volgens derzelver plaatfen.	218.
ART. 2. Over de kneuzingen in het		
	bijzonder.	ib.
a. De mol of varent.		ib.
§ 294.	Deszelfs, oorzaak en genezing.	ib.
	b. De	

	<i>b. De zadelkwetsing.</i>		Bladz. 219.
§ 295.	Deszelfs beschrijving.		<i>ib.</i>
	12.] Beschouwing van de oorzaken der zadelkwetsingen.		<i>ib.</i>
296.	Oonderscheiding.		220.
297.	Brandvlek.		221.
298.	Eenvoudige zadelkwetsing en deszelfs genezing door verdeeling		<i>ib.</i>
299.	Gevolgen wanneer deze mislukt.		222.
300.	Waterblaas.		<i>ib.</i>
301.	Zwam.		223.
302.	Brandvlek.		<i>ib.</i>
303.	Ettergezwel.		<i>ib.</i>
304.	Diep indringende zadelkwetsing.		224.
305.	Wanneer den nekband aangetast is.		225.
306.	Middelen tegen de wormen.		226.
	<i>c. Leggers en schijthakken.</i>		<i>ib.</i>
307.	Derzelver aard en beschrijving.		<i>ib.</i>
308.	De leggers en derzelver genezing		<i>ib.</i>
309.	De schijthakken.		227.
	<i>d. kwetsing door den halsterketen.</i>		228.
§ 310.	Geneeswijze.		<i>ib.</i>
	<i>e. Peeskwetsing.</i>		<i>ib.</i>
§ 311.	Geneeswijze.		<i>ib.</i>
312.	Knobbels door rheumaticke oorzaken.		229.
	<i>f. Beschadiging der knie.</i>		230.
§ 313.	Derzelver oorzaak en genezing.		<i>ib.</i>
	13.] Gevolgen der kniegezwellen.		<i>ib.</i>
	<i>g. De kroonbetrapping.</i>		<i>ib.</i>
§ 314.	Oorzaken en geneeswijze		<i>ib.</i>
315.	Kroonverzweringen.		231.
§ 316.	Vijk of padgezwel.		<i>ib.</i>
	<i>i. De</i>		

I N H O U D.

Hoornkloven als gevolgen van kroonbetrap-
pingen. Bladz. 231.

h. De steengallen. 232.

§ 317. Derzelver beschrijving, oorzaken en genezing *ib.*

i. De kneuzing der hielen of het verballen. 233.

§ 18. Oorzaak, gevolgen en geneeswijze. *ib.*

k. De vervangenheid door uitwendige oorzaken. 234.

319. Onderscheiding. *ib.*

320. Beschrijving. 235.

321. Oorzaken. 236.

322. Kenmerken. *ib.*

323. Verscheidende trappen. *ib.*

324. Geneeswijze. 237.

III. HOOFD. *De verrekkingen en verstuikingen.* 239.

325. Beschrijving. *ib.*

326. Onderscheiding. *ib.*

327. Geneeswijze. 240.

ART. 1. Over de kreupelheid uit deze en
rheumatische oorzaken. *ib.*

§ 328. Boeglam en kruislam. *ib.*

ART. 2. Over de onderscheidende kenmer-
ken der kreupelheid. 242.

§ 329. Algemeene regels bij derzelver onderzoek. *ib.*

330. Kenmerken der boeglamigheid. *ib.*

331. Van de verrekking der kniebanden. 243.

332. Van die des kootgewrichts. *ib.*

333. Van de kwetfing der buigpees. 244.

334. Van de kreupelheid door mok, gezwollene beenen, enz. *ib.*

335. Van die door uitwendige beschadigingen. *ib.*

§ 326.

I N H O U D.

§ 336.	Van die door kroonbetrapping.	Bladz. 245.
337.	Door strijken.	ib.
338.	Door ingetrapte ligchamen.	ib.
339.	Door vervangenheid.	ib.
340.	Bijzondere kenteekenen dat zij in den voet schuilt.	ib.

ART. 3.	Wijze van onderzoek om de oorzaak en plaats der kreupelheid te ontdekken.	246.
---------	---	------

§ 341.	Voorafgaand onderzoek.	ib.
342.	Onderzoek van den voet.	247.
343.	Van het kootgewricht.	ib.
344.	Van de buigpees.	248.
345.	Van de knie en het schouderblad.	ib.
346.	Van de achterbeenen.	ib.

IV. HOOFDD.	<i>De gezwollen en ongemakken der beenen.</i>	250.
-------------	---	------

ART. 1.	De heete gezwollen zonder uitwendige oorzaken.	ib.
---------	--	-----

§ 347.	Derzelver oorzaak en genezing.	ib.
	<i>b. De beslisfende (kriticke) gezwollen.</i>	ib.
348.	Wanneer deze zich vertoonen en derzelver behandeling.	ib.

ART. 2.	De koude gezwollen.	251.
---------	---------------------	------

§ 349.	Wat men daardoor verstaat.	ib.
350.	De zakgezwollen.	ib.
	<i>a. Gezwollene achterbeenen en koker.</i>	ib.
351.	Derzelver oorzaak en genezing.	ib.
	<i>b. De gallen.</i>	253.
352.	Onderfcheiding in vlotgallen en peesgallen.	ib.
	§ 353.	

I N N O U D.

§ 353. Geneeswijze door uitwendige middelen.	Bladz. 254.
354. Door branden.	255.
355. De hazenhakken.	256.
<i>c. Stijfheid der voorbeenen.</i>	<i>ib.</i>
356. Derzelver genezing.	<i>ib.</i>

ART. 3. De mok, egelsvoet, raspen, koot- verzwering, rotftraal, vijfwratt- ten.	257.
---	------

§ 357. Aard en oorzaak dezer onderscheidene kwalen.	<i>ib.</i>
358. De mok, deszelfs onderscheiding: in toevallige.	<i>ib.</i>
359. En eigenlijke.	258.
360. Derzelver kenteekenen: kootverzwering.	<i>ib.</i>
361. Eigenlijke mok.	259.
362. Egelsvoet.	<i>ib.</i>
363. Raspen, barsten.	<i>ib.</i>
364. Vijk of padgezwel.	<i>ib.</i>
365. De rotftralen.	260.
366. De vijfwratten.	<i>ib.</i>
367. Genezing dezer verschillende ongemakken: van de mok.	261.
368. Van den egelsvoet.	<i>ib.</i>
369. Der rotftraal.	<i>ib.</i>
370. Der vijfwratten.	262.
371. Bijzondere heilzaamheid van dragten in deze kwalen.	<i>ib.</i>

V. HOOFDD. <i>De ooggebreken.</i>	263.
---	------

ART. 1. De oogontftekingen en derzel- ver oorzaken.	<i>ib.</i>
--	------------

§ 372. Derzelver onderscheiding in drooge en vochtige.	<i>ib.</i>
373. De drooge.	<i>ib.</i>
374. Die uit inwendige oorzaken.	265.
<i>a. De maanoogen.</i>	<i>ib.</i>

I N H O U D.

§ 375. Beschrijving.	.	.	.	Bladz. 265.
376. Genezing.	.	.	.	ib.

ART. 2. Gevolgen der oogontstekingen. 266.

§ 377. Waarin deze bestaan.	.	.	.	ib.
<i>a. Het traanoog.</i>	.	.	.	ib.
378. Deszelfs oorzaak.	.	.	.	ib.
<i>b. Het etteroog.</i>	.	.	.	267.
379. Oorzaken en geneeswijze.	.	.	.	ib.
<i>c. Het bloedoog.</i>	.	.	.	ib.
380. Beschrijving en behandeling van dit toeval.	.	.	.	ib.
<i>d. Vlekken in het hoornvlies.</i>	.	.	.	268.
381. Waaruit zij bestaan.	.	.	.	ib.
<i>e. Vliezen op de oogen.</i>	.	.	.	ib.
382. Waar zij zich bevinden, en hoe zij weggenomen kunnen worden.	.	.	.	ib.

INHOUD.

VIERDE AFDEELING.

OVER DE BEHANDELING DER PAARDEN IN DEN STAAT VAN ZIEKTE.

§ 383 Noodzakelijkheid dezer kundigheid. Bladz. 271

I. Hoofdd. *Regels ter behandeling der paarden in
den staat van ziekte.* *ib.*

§ 384. Bedoeling dezer regels; middelen om de ziekten te
verhoeden. *ib*

385. Middelen om de vatbaarheid voor dezelve te ver-
minderen 272

386. Noodzakelijkheid om de kenmerken der ziekten te
leeren onderscheiden. 273.

387. Die om oordeelkundig in de aanwending der ge-
neesmiddelen te handelen. *ib.*

388. Regels in den aanvang eener ziekte. 274.

389. Over de eigenschappen van den veeärts, wien men
om raad vraagt. 275.

390. Waarschouwing tegen zoogenaande paardendokters. 276.

391. Gedrag jegens een ervaren paardenarts. 277.

392. Voorschriften wanneer men zelfs de geneezing besluit
te ondernemen. *ib.*

393. Gedrag in den aanvang, vooral bij twijfelachtige
ziekten, en bij die van eenen ontstekingsachtigen aard. 278.

394. Verdubbelde oplettendheden door de gezondheidskun-
de voorgeschreven 279.

395 Oplettendheid wegens de voedselmiddelen. *ib.*

14.] De meeldranken. 280.

*** 4 § 396.

I N H O U D.

§ 396. Bepaling van den leefregel. Wanneer eenen schralen nadeelig zoude zijn.	Bladz. 280.
397. Zuiverheid vooral der stallingen en drinkvaten.	281.
398. Zorgvuldigheid in den leefregel bij beterschap.	<i>ib.</i>
399. Goed legftroo, luchttempering en matige beweging.	282.
400. Zindelijkheid boven alles gevorderd.	283.
401. Aanleg der stallingen.	<i>ib.</i>
402. Voorzorgen bij gekwetste paarden tegen versterf.	284.
403. Verschillende afdeelingen in den ziekenstal.	286.
15.) De berookingen tegen besmetting.	<i>ib.</i>

II. HOOFDD. *De Genees- en Heelkundige verrigtingen en werktuigen.* 288.

§ 404. Bepaling in hoe verre de genees- en heelkundige hulp door ieder paardenbezitter toegebracht kan worden. <i>ib.</i>

ART. I. De heelkundige verrigtingen en werktuigen. 290.

<i>a. De aderlatingen.</i>	<i>ib.</i>
§ 405. Nut der aderlatingen.	<i>ib.</i>
406. Keuze van den tijd waartoe.	<i>ib.</i>
407. Plaatsen waar men dezelve moet verrigten.	291.
408. Die van de lating aan den hals.	<i>ib.</i>
409. Werktuigen tot de aderlating.	<i>ib.</i>
16.] Aderlancet.	<i>ib.</i>
17.] Snepper.	292.
18.] Lancetten.	<i>ib.</i>
410. Wijze hoedanig zulks verrigt wordt.	293.
19.] Laatband.	<i>ib.</i>
411. Aderlating met den laatband.	294.
412. Zonder denzelven.	<i>ib.</i>
413. Met den snepper.	295.
	§ 414.

I N H O U D.

§ 414. Verband der lating.	.	Bladz. 296.
415. Lating aan de boegader.	.	297.
416. Aan de fpoor- en fpatader.	.	<i>ib.</i>
417. In het verhemelte.	.	<i>ib.</i>
418. Opening van den flaap-flagader.	.	298.
<i>b. De dragten.</i>	.	<i>ib.</i>
419. Uitgebreid nut der dragten.	.	<i>ib.</i>
420. Onderfcheiding in dragten en fontenellen.	.	299.
421. Plaatsen waar men ze aanwendt en werktuigen die men er toe gebruikt.	.	300.
20.] Scherpe fontenel-naalden.	.	<i>ib.</i>
21.] Stompe.	.	<i>ib.</i>
422. Wijze hoodanig men ze zet.	.	<i>ib.</i>
423. Fontenellen.	.	301.
<i>c. De infnijdingen.</i>	.	<i>ib.</i>
424. Gevallen waarin men deze verrigt.	.	302.
425. Opening der gezwellen.	.	303.
426. Vershillende werktuigen daartoe nodig.	.	304.
427. Bistourien. fchalpels en heefmesfen.	.	<i>ib.</i>
22.] Schalpels en bistourien.	.	<i>ib.</i>
23.] Hoefmesfen.	.	305.
428. Scharen.	.	<i>ib.</i>
24.] Kromme en gebogene.	.	306.
429. Werktuigen tot opening van harde deelen.	.	<i>ib.</i>
25.] Trephine.	.	<i>ib.</i>
430. Vershillende hulpwerktuigen.	.	307.
26.] Sonde.	.	<i>ib.</i>
27.] Tang en pincet.	.	<i>ib.</i>
431. Bepaling der heekunftige bewerkingen voor ongeleerde.	.	308.
432. Algemeene regels daarbij.	.	<i>ib.</i>
<i>d. Het branden.</i>	.	309.

I N H O U D.

§ 433. Oogmerken waarom men dit verrigt.	Bladz. 309.
434. Werktuigen die men er toe gebruikt.	310.
435. Wijze hoedanig men zulks verrigt	ib.
<i>c. Het verëenigen der wonden.</i>	311.
436. Wijze hoe zulks geschiedt: wondnaalden, hechtpleisters.	ib.
437. Het onderbinden van bloedvaten.	ib.
<i>f. De verbanden.</i>	ib.
438. Middelen die men daartoe gebruikt: plukfel.	312.
439. Kompresfen; zwachtels.	313.
440. Hoofd-, ligchaam- en been-verbanden.	314.
ART. 2. Middelen om zich van het paard te verzekeren.	
§ 441. Werktuigen daartoe noodig.	315.
442. De praam.	316.
443. De mondrooster.	ib.
444. De noodital.	ib.
445. Het nederwerpen van het paard.	ib.
28.] De kluisters.	ib.
ART. 3. Het toedienen en de vorm der genees- en heelmiddelen.	
<i>a. Keuze en onderscheiding der geneesmiddelen.</i>	ib.
§ 446. Algemeene regels in de keuze en bereiding derzelve; hunne onderscheiding: in enkelvoudige en zamengestelde, in in- en uitwendige.	ib.
29.] Onderfcheide uitwerking op de vleesch- en plantëtende dieren.	ib.
<i>b. Vorm en toedeeling der genees- en heelmiddelen.</i>	320.
447. Volgens derzelver gebruik.	ib.

A. Vorm

I N H O U D.

A. Vorm en toedeeeling der geneesmiddelen	Bladz. 321
1.) Geneesmiddelen in vaste zelfstandigheid.	ib.
§ 448. Poeders.	ib.
449. Pillen en flikbrokken.	ib.
450. Toedeeeling der pillen.	322.
451. Toedeeeling der flikbrokken.	ib.
452. De kaauwpoppen.	ib.
2.) Geneesmiddelen in vloeibare zelfstandigheid.	ib.
a. De dranken.	ib.
453. Derzelver gebruik en wijze van ingeven.	ib.
30.] Toom tot ingeven der dranken.	323.
b. De lavementen en inspuitingen.	324.
454. Nut der inspuitingen.	ib.
455. De lavementen en daartoe noodige werktuigen.	ib.
31.] De klijsteerspuit.	ib.
32.] De klijsteerkan.	325.
456. De inspuitingen.	ib.
c. Het inademen van dampen.	ib.
457. Vochtige dampbaden.	326.
458. Berookingen en lavementen van tabaksrook.	327.
33.] Werktuig voor de berookingen.	ib.
34.] Dat tot lavementen van tabaksrook.	ib.
B. Vorm en gebruik der heelmiddelen.	328.
459. Waaruit deze bestaan.	ib.
460. De omslagen.	ib.
a. De omslagen.	ib.
461. Koude omslagen.	ib.
462. Warme omslagen.	329.
463. Pappen.	330.
b. De inwrijvingen.	ib.
§ 464.	

§ 464. Derzelver gebruik en samenstelling.	Bladz. 330.
<i>d. Wasfchingen en baden.</i>	331.
465. Gebruik derzelve.	<i>ib.</i>
466. De baden.	<i>ib.</i>
467. Algemeene koude baden.	<i>ib.</i>
468. Stortbaden.	<i>ib.</i>
469. Warme baden.	332.
470. Zalven, balsems, pleisters.	<i>ib.</i>
<i>Wondwaters en wondflecken.</i>	333.
471. Hunne samenstelling en gebruik.	<i>ib.</i>
<i>De geneeskundige maten en gewigten.</i>	334.
472. Aanwijzing hunner onderscheidingsteekenen.	<i>ib.</i>



V O O R S C H R I F T E N

F A N

GENEES- EN HEELMIDDELEN.



Voorafgaande aanmerkingen.

Gebruik en bedoeling dezer voorschriften.	I.
Over het getal en de keuze der geneesmiddelen in dezelve.	II.
Over derzelver benamingen.	IV.
Verkiezbaarheid der eene boven de andere.	V.
Algemeene regels nopens de keuze en toediening der geneesmiddelen in ziekten.	VI.

GENEESMIDDELEN.

A. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN VAN GENEESMIDDELEN.

Verkoelende in ontstekingsziekten.	N ^o . 7, <i>a</i> , <i>b</i> ; 21, <i>a</i> . 27.
Bedarende.	7, <i>b</i>
Tot bevordering der uitwaseming.	1, 4, 10.
Opwekkende.	21, <i>c</i> . 53, <i>a</i> , <i>b</i> .
Versterkende.	8, 9, 34, 53, 69, <i>f</i> .
Krampstillende.	23, 26, <i>b</i> . 35, 49, <i>b</i> .
Buikopenende, (<i>purgatien</i> .) . . .	28, <i>i</i> — <i>c</i> .
Lavementen.	39, <i>a</i> — <i>g</i> .

B. VOORSCHRIFTEN IN BIJZONDERE
GEVALLEN.

I. Ziekten die bijzonder de opslorpemde vaten aandoen.

I. De droes.

a. De goedaardige droes en verkoudheid.

In den aanvang. . . N^o. 1, 2, a - c. 3, 4, 5.

九九

14

I N H O U D.

In droes met ontsteking. .	Nº. 7, 27, 22, a.
Op het eind. .	2, 3
Tot versterking in droes met verzwakking. . .	8, c, b, 9.
b. De boosaardige droes.	2, 4, 5.
Tot bevordering van ontlasting uit den reus. . .	6, a.
Versterkend middel bij verzwakking.	9.
c. De verplaatsten droes.	4, 5, 10.

II. De kwaden droes.

In de laatste trap en den verdachten	11, 12, 19, l, 20, e.
In hooren trap. .	13 — 17, 19, b, 20, e.
Versterkend middel tot nakuur.	18, 19.

III. De wõrm.

Uitwendig. . .	20, a.
Inwendig. . .	20, b — f, 62.

II. De rheumatieke en krampachtige toevallen.

I. Rheumatieke of zinkingachtige toevallen.

Rheumatismus met ontsteking.

Rheumatismus met verzwakking, valschen of omzwervenden droes.

In den aanvang. .	10, a, b, c.
Bij beestebau. .	8, 9.
Vervangenheid met ontsteking.	7, 27.
Uit te veel voedsel. .	48, b.
Uit overmatige vermoeienis.	2, 4, 10, 48, a.
Langdurig rheumatismus of jigt.	4, 6, a, b, c.

II. Krampachtige toevallen.

In het begin: inwendig. .	49, a, b.
Uitwendig. .	49, c.
De kramp der beenen.	97, a

III. Ziek

I N H O U D.

III. Ziekten en ontstekingen der levenswerktuigen.

I. Ziekten der hersenen.

- a. Ontsteking der hersenen. N^o. 7, 10.
- b. De kolder. 23, 29.

2. De keelontsteking.

- Inwendig. 10, 27, 30, 31.
- Inwrijving, uitwendig. 32.

II. Ziekten der adembalingswerktuigen.

I. De longontstekingen .

- In den aanvang tot wegneming der ontsteking. 7, a, b, 21, a, 27.
 - Bij derzelver vermindering. 21, b.
 - In het tussehen-tijdstip van ontsteking en verzwakking. 21, c.
 - Tot vermindering van den hoest. 21, aa.
 - Na het ophouden der ontsteking. 22, a.
 - Wanneer er vrees is dat de ziekte in ettering zal overgaan. 22, c.
 - In het tijdstip van verzwakking, en in borstontstekingen met verminderde levenskracht. 21, c, d.
 - Versterkend middel. 22, b.
2. Aamborstigheid of dampigheid. 3, 22, a, 23 a.
- In langdurige longgebreken. 23, b.

3. De hoest.

- Uit bijzondere oorzaken. 24, 25.
- Vochtige hoest uit verzwakking. 26, a.
- Krampachtige drooge hoest. 26, b.

III. Ziekten der ingewanden.

I. Het buikwee, (holijk.)

- Het windkolk. 33, a, b, 31, a, 2.
- Het

I N H O U D.

Het kolijk door onverteerbaarheid en overlading.	Nº. 33, <i>a</i> .
Het kolijk door verkouding.	33, <i>a</i> , 38.
Het krampkolijk.	35, <i>a</i> , <i>b</i> , 36, 37.
Het kolijk door wormen.	35, <i>b</i> .
Het kolijk door zuren.	36, 37.
Lavementen.	39, <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i> .
2. De wormen.	28, <i>a</i> , <i>c</i> .
Tot versterking der ingewanden.	8, 9, 34, <i>a</i> .
3. De loop.	
Uit gebrekkige afscheiding, opgehoopte vuiligheden in het darmkanaal en verkouding.	40, 42.
Uit zuren en toevallig.	41.
Ontstekingsachtige loop.	40, 44, 45.
Galachtige.	40, 42, 44.
Toevallige en zachte afgang.	43, 44, <i>a</i> .
Langdurige	44.
Zenuwkoortige.	45, 34, <i>a</i> .
Tot versterking en na het ophouden.	8, 33, <i>b</i> , 34, <i>a</i> .
Lavementen in den loop.	39, <i>d</i> , <i>e</i> .
4. Gebrekkige spijsvertering en verlorene eetlust.	46. <i>a</i> — <i>c</i> .
5. Opstopping van water.	47, <i>a</i> , <i>b</i> .
Lavement	39, <i>f</i> .

IV. Toevallen door uitwendige oorzaken.

De dulle hondsbeet.	50.
De schurft, manenschurft, staartworm, — inwendig.	69, <i>a</i> — <i>d</i> .
In hardnekkig verouderde.	69, <i>e</i> .
Versterkend middel voor herstellende.	69, <i>f</i> .
Uitwendig.	69, <i>g</i> .
Mok, egelsvoet, rotstralen, raspen, enz.	70, <i>a</i> .
Eijtend water.	70, <i>b</i> .

V. De koortfen.

a. De ontstekings koortfen.

In den aanvang. N^o 7, 21, *a*, 51.

Na het ophouden der ontsteking. 8, 9.

b. Eenvoudige afgaande koortfen met verzwakte levenskracht. 51, *a*, 52, *a*, *b*.

c. Koortfen met neiging tot ontbinding der vochten of rotkoortfen. 51, *b*, 52, 53, *a*, *b*.

Boosaardige rotkoortfen of het zoogenaamde longenvuur 53, *a*, *b*, 54, 53, *a*, *b*.

In bijkomende zwakte der spijsverterings - werktuigen. 52, 34, *a*.

Verminderde levenskracht. 21, *c*, 52, *b*, 56, *b*.

Uitwendig tegen de gezwollen in den mond. 57.

d. De Zenuwkoortfen. 21, *c*, 54, *b*, 59, 60,

Lavement in zenuwkoortfen. 39, *g*. (61, *a*, *b*.

Versterkend middel tot nakuur. 62.

De hoofdzwellings, (*mal d'es-*
pagne. 63, 64.

Wasfching des hoofds, — uitwendig. 65, 66.

e. De boosaardige zenuwachtige flijmkoorts. 67.

f. De koortfen uit verkeerde afscheiding der ingewanden.

De galkoortfen. 68.

De flijmkoortfen. 22, *b*, *c*, 46.

I N H O U D.

DE UITWENDIGE OF HEELMIDDELEN.

A. ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN VAN HEELMIDDELEN.

In wonden.

Bloedstillende middelen.	.	.	N ^o . 73.
Pijnstillende.	.	.	72, 74, 75, <i>b</i> . 78.
Genezende.	.	.	72, 91, 94.
Etterbevorderende.	.	.	75, <i>a. b</i> , 77, 83.
Zuiverende.	.	.	72, 80, 82.
Kneuzingen.	.	.	71, 85, 94, 97.
Verdeelende.	.	.	71, 84, 85, 97.
Verstuikingen en verrekkingen.			99, 101.

B. VOORSCHRIFTEN IN BIJZONDERE GEVALLEN.

1. Wonden.

Bloedstillend middel.	.	.	73.
Pijnstillende waschmiddelen en omslagen in sterke ontstekingen.			71, 74, 78.
Verdelenden omslag in kwerfingen en met kneuzing verzelde wonden.			71.
Wondwater en wondsteen.			72, 94.
Ettering bevorderende middelen.			75, 76, 77, 83.
Zuiverende wondzalf.			80.
Zuiverend middel in verouderde wonden.			82, <i>aa</i> .
Te en vuile slecht etterende wonden, wild vleesch en valsche ontstekingen.			82, <i>b</i> . 92, 93.
Bijend wondwater.			82, <i>a</i> .
Tot verzachting der wondranden.			79.

I N H O U D.

Om goede wonden te doen sluiten en opdroogen.	Nº. 91.
Tegen de wormen in de wonden.	81, <i>a</i> , <i>b</i> .
Voetwonden.	98.

ii. Kneuzingen.

Omflagen tot verdeeling.	84, <i>a</i> , <i>f</i> .
Balsen.	84, <i>g</i> , 97, <i>a</i> .

iii. Zadelkwetfing.

Omflagen tot verdeeling.	71, 84, 85.
Bij mislukte verdeeling.	86.
Tegen de brandvlekken.	87.
Omflagen bij verminderde ontsteking.	88.
Bij opene zadelwonden.	89.
Indien de nekband aangetast is.	82, <i>b</i> 90,
Indien de beenderen daarenboven aan- gedaan zijn.	82, 90.

iv. Kneuzingen en koude gezwel- len.

Leggers, fchijthakken en knie- gezwellen.	95, 96, <i>a</i> — <i>c</i> , 97.
Peeskwetfing.	97, <i>b</i> .
Kwetfing in den halfterke- ten.	72, 78, 97, <i>c</i> .
Gezwollene beenen en koker.	102, 103.

v. Verrekkingen en verftui- kingen.

In geringen trap.	99, 100.
Met bijkomende zwelling.	101, 102.

Y N H O U D.

VI. De ooggebreken.

De oogontsteking.	.	Nº. 105, 106, 107, 108.
Het etteroog.	.	109, 110.
Vliczen op de oogen.	.	111, <i>a, b</i> .
Scherpe tranen.	.	112.
Oogontsteking met verzwakking.	.	113.

DE GEZONDHEIDSBEWARING EN GENEESWIJZE VAN
DE ZIEKTEN DER PAARDEN.

E E R S T E A F D E E L I N G .

Over de kenteekenen van den staat van gezondheid en ziekte.

Indien er eene kundigheid van gewigt is , zoo is het die , om den staat van ziekte van dien der gezondheid , niet alleen wel te onderscheiden , maar tevens om zich in den aard der ongesteldheid welke het dierlijk gestel aantast , niet te vergisfen , ten einde geen gevaar te loopen door eene ondoelmatige geneeswijs dezelve te verergeren in plaats van weg te nemen.

Hiertoe is het noodig dat men de kennis der kenteekenen poge te verwerven , welke de natuur tot aanwijzing van het verschil tusfchen den staat van ziekte en gezondheid in het algemeen en ter onderscheiding der onderscheidene kwalen aanbiedt , ten einde hiernaar de geneeswijs te wijzigen . Deze teekenen worden of door de zintuigen ontdekt of wel door nadenken verklaard en uit gevolg-

A

volg-

volgtrekkingen ontleend, welke laatste minder duidelijk en zeker zijnde dan de eerste, eene grootere scherpzinnigheid des geneesheers vorderen.

- 2 Daar de staat van ziekte eene afwijking van dien der gezondheid is, zoo moeten de teekenen welke de eerste aanwijzen van diegene verschillen, welke de laatste aankondigen: wanneer dus b. v. een gezond dier eenen rooden mond heeft, zoo kan men indien deze bleek is deszelfs ongesteldheid vermoeden; de huid welke bij hetzelfde eenigzins door de haren heen schemert, heeft bij de meeste gezonde dieren eene eenigzins roode kleur; wanneer nu dezelve zich bleek, geel, enz. vertoont, kan men het dier als ongesteld beschouwen; gelijk mede, wanneer de anders gladde haren om hoog staan, de huid los afhangt of vast op de ribben kleeft, of wanneer deelen heet zijn, die anders koud waren en omgekeerd; voorts wanneer enig deel hard is, hetwelk voorheen week was of dat het deszelfs vorige veërkracht verloren heeft.

De teekenen van gezondheid en ziekte.

- 3 Hieruit blijkt dat deze teekenen eene alge-

gemeene verdeeling in die van den staat van gezondheid en van ziekte aanbieden, tot wier ontdekking alle zinnen moeten medewerken, daar ieder derzelve ons andere doet ontwaren, en men dus niet alleen door het gezigt en gevoel, de pols, de oogen, de ooren, de mond, de neus en de huid onderzoeken, maar tevens het gehoor te werk stellen, aan welk het aanwezen eener ongesteldheid door zuchten, steunen, romelingen in het lijf, knarsen der tanden enz. aangekondigd wordt.

- 4 Voorts zijn de teekenen welke den staat van ziekte aanwijzen, of algemeene, waaruit men ontdekt dat het dier ziek is, of bijzondere, welke den eigenlijken aard der ziekte aantoonen; daarenboven zijn de toevallen onderscheiden, in wezenlijke, welke altijd bij de ziekte voorkomen en moeten plaats grijpen, om haar te kenmerken en van andere te onderscheiden, en in toevallige die door andere toevallen veroorzaakt, vaak in ziekten voorkomen, zonder tot het wezen derzelve te behooren, en die men wel moet weten te onderscheiden, ten einde geen toeval voor de ziekte zelve te nemen; dus vormen de huidkramp, eene snellere pols en veranderde tempering des ligchaams, de eigenlij-

4 DE TEEKENEN VAN GEZONDHEID EN ZIEKTE.

ke kenteekenen der koorts, terwijl de borstkramp, loop, heete gezwollen enz. alleen bijkomende toevallen zijn.

5 Behalve de reeds opgegevene, bestaan er nog eene menigte uitwendige kenteekenen, welke men bij de bepaling der geneeswijze niet uit het oog verliezen mag, als: de houding van het dier, het te weinig of te veel gevoel, angstigheid, gevoelloosheid, gemis van gehoor, reuk en gezigt; beven, fidderen, trekkingen, kramp, verlamming; geeuwen, knarstanden, aanhoudend staan of liggen, wankelen, slapeloosheid, gebrek aan honger en dorst; als mede de ademhaling, het hoesten, niezen, de sterke of zwakke beweging van het hart en des slagaderlijken gestels, alle welke teekenen in de bijzondere ziekte-teekenkunde nader ontvouwd zullen worden.



E E R S T E H O O F D D E E L.

OVER DE TEEKENEN DER GEZONDHEID.

6 **D**e kenteekenen van den staat en toestand des paards, zijn niet alleen voor den paarden-arts, maar voor iedere eigenaar van hetzelfde al-
 lerbelangrijkst, daar dezelve hem tevens de
 natuurlijke gesteldheid van hetzelfde, zoo wel
 als die van deszelfs gezondheid, voor oogen
 stellen, en verdienen dus dat zij die van den
 zieken staat vooraf gaan, ten einde deze door te-
 genover stelling des te duidelijker te kunnen
 ontdekken.

Men ontleent deze teekenen uit. 1^e de on-
 derfcheidene trappen des ouderdoms,
 2^e. uit de verrigtingen des ligchaams,
 3^e. uit de levens-, 4^e. de dierlijke-, 5^e. de
 natuurlijke en 6^e. de geslachts-ver-
 rigtingen.

Hierbij kunnen nog als gezondheids-teekenen
 gevoegd worden: de onderscheidene tempera-
 menten, en 2^e. de vereischte gesteldheid
 der levenswerktuigen en die der lig-
 chaamsdeelen.

E E R S T E A R T I K E L.

De trappen des ouderdoms.

7 De teekenen van gezondheid welke in
 A 3 de

6 DE TEEKENEN DER GEZONDHEID,

de onderscheidene trappen des ouderdoms plaats grijpen, worden in de eerste plaats door de afstamming van gezonde ouders, en vooral uit een edel ras, opgeleverd, daar zulks tot eene sterke waarborg voor de gezondheid hunner afstammelingen verstrekt, aangezien paarden van een edel ras veel minder dan andere aan toevallen onderhevig zijn, en daarentegen veulens van onvolkomene en ziekelijke paarden veelal derzelver gebreken overerven.

Bij eenen meerderen groei in het eerste en tweede jaar worden de vaste deelen steviger en veêrkrachtiger, terwijl een goede eetlust en de daardoor bevorderde groei, de toeneming in krachten, levendigheid en een juist evenwigt van alle verrigtingen bewijzen van welzijn opleveren.

Bij toenemenden ouderdom, eenige jaren later, het welk men den volwasfenen staat kan noemen, kenmerkt zich de gezondheid door onverhinderde ontwikkeling des ligchaams en der krachten, behoorlijken honger en dorst, onvermoeidheid, volle kracht en ongestoorde verrigtingen.

Nu blijft het paard gedurende eenige jaren in het volle genot van gezondheid en sterkte; waarvan gelijkvormigheid in de levensverrigtingen, zonder zwakheid na inspan-

spanning of derzelver storing, door invloed der uitwendige oorzaken, te gevoelen, blijken opleveren; tot dat eindelijk met het tijdvak des ouderdoms dat der zwakte en onvolkomenheid intreedt, in hetwelk de verrigtingen zelden meer ongestoord plaats grijpen.

TWEEDE ARTIKEL.

De onderscheidene verrigtingen.

- 8 De levensverrigtingen zijn diegene welke door die werktuigen (organen) volbragt worden, die volstrekt tot het leven noodig zijn, en waaronder men in de eerste plaats de omloop des bloeds rekent; dezelve moet gelijkvormig, bedaard, en niet afwisselend zijn; terwijl geen overmaat of gebrek van vochten in het ligchaam mag plaats grijpen, daar beide de levenswerkingen hinderen.

De ademhaling behoort ruim, vol, alleen met de borst, en niet met den buik of de zijden, noch met groote moeite, maar zonder gedruis, benaauwdheid of pijn te geschieden, en wanneer dezelve door beweging sneller dan natuurlijk is, geschiedt, moet zij dra tot de vorige orde terug keeren.

- 9 Men rekent onder de dierlijke verrig-

8 DE TEEKENEN DER GEZONDHEID,

tingen bijzonder het gevoel en de beweging, die beide vooral van de volkomene vorming, evenredigheid en eigenschappen des ligchaams afhangen.

- Het behoorlijk gevoel bestaat in een volmaakt befef der zinnen, als een goed gezigt en fcherp gehoor, fijne fmaak, reuk en een zoodanig gevoel, dat zonder pijn iederen indruk ontvangt. Tot beweging wordt eene goede, duurzame en krachtige vorming der spieren vereischt, welke in staat ftelt de vrijwillige bewegingen op de gemakkelijkfte, en de onwillekeurige der levenswerktuigen op de volkomenfte wijs te volbrengen.

10 De natuurlijke verrigtingen welke tot voeding en instandhouding van het dierlijk ligchaam verftrekken, en een der zekerfte kenteekenen van deszelfs welstand opleveren, bestaan: in eenen goeden eetlust, evenredigd aan de krachten, grootte en werkzaamheden van het dier; in een juist gewijzigde dorst, en goede verteeringskrachten, die het gebruikte behoorlijk bearbeiten, de fpijzen koken, het melkfap inzui- gen, en door geene benaauwdheid of opgeblazendheid, het bezwaren der fpijzen verraden.

In de tweede plaats komen behoorlijke afzonderingen en ontlastingen in aan-
mer-

merking : waartoe behoort een gemakkelijke en geëvenredigde afgang , die de kracht der ingewanden aankondigt door de behoorlijke gesteldheid en kleur des afgangs , welke met de noodige gal vermengd , en zonder eene andere dan de haar natuurlijk eigene reuk moet zijn.

Het water eene behoorlijke kleur , warmte en reuk bezittende , moet in eene aan den genotenen drank geëvenredigde hoeveelheid , zonder dwang of inspanning ontlast worden. Het zweet moet naar mate van den arbeid en het weder niet te veel noch te weinig plaats grijpen , niet afstroomen maar zich eenparig over alle ligchaamsdeelen verspreiden ; voorts moet deszelfs reuk niet sterk , bedorven , zuur noch stinkend wezen , en hetzelfde daarenboven eene behoorlijke warmte en vloeibaarheid bezitten , zonder koud of kleverig te zijn. Nimmer moet het speeksel ontbreken , maar steeds den mond vochtig houden , zonder immer anders dan bij het genot der spijsen in eene grootere hoeveelheid afgescheiden te worden , en voorts helder , eenigzins taai , niet te dun , scherp of stinkend zijn.

Ook de geslachts-verrigtingen leveren blijken van den gezonden of kranken staat des paards op ; zij wijzen den eersten aan , wanneer geene der daartoe bestemde deelen eenige gebreken bezitten , en dezelve met ge-

mak en kracht volbragt worden, voorts wanneer bij eene merrij de natuurdriфт de maat niet te boven gaat, dezelve gedurende hare dragt, aan haren toestand geevenredigde werkzaamheden zonder moeite volbrengt, niet verwerpt, gezonde veulens voortbrengt en in staat is dezelve te voeden.

DERDE ARTIKEL.

De temperamenten.

- II De temperamenten hangen bij de dieren van derzelver gedaante, vorming en levenswijs af; Bij eene vaste vorming der vezelen is meer beweegbaarheid, zamentrekking, veërkracht en werking op de vochten te wachten, waardoor grootere warmte, levendigheid enz. voortgebracht wordt, hetgene de eigenschappen der edele rasfen zijn; daarentegen zijn dieren met flappe vezels, vele vochten en weinig veërkracht, trager en minder levendig, offchoon zij met hun zwak ligchaamsgestel, echter gezond kunnen zijn; andere bezitten drooge, vaste en duurzame vezels, weinig veërkracht en terugwerking op de kleine hoeveelheid vochten; deze zijn sterk, duurzaam, moedig en onbevreesd, doch hellen bijzonder tot hersfenontsteking, de kolder, enz. over.

Van het onderscheid der temperamenten hangt ook de meerdere of mindere prikkelbaarheid

heid af, daar sterke vaste vezels deze eigenschap meer dan flappe bezitten, zoo dat de meerdere of mindere kracht, vrolijkheid en duurzaamheid van deze afhangen, waardoor zij zeer veel invloed op de gezondheid en dus op de deugd des paards hebben.

Neemt men voorts de kleuren in aanmerking, zoo zijn, indien men het gevoelen van sommige vee-artsenijkundige mag aannemen, de paarden van een donker en helder haar sterker, vrolijker en duurzamer dan die van eene bleeke en lichte kleur, terwijl zij daarenboven hevige ziekten eerder dan deze te boven komen.

VIERDE ARTIKEL.

De gesteldheid der onderscheidene levenswerktuigen en ligchaamsdeelen.

- 12 De juiste evenredigheid der deelen en de regelmatigheid der ligchaamsvorming, gepaard met derzelver onbelemmerde overeenstemmende verrigtingen, voltoojen dat beeld der volmaaktheid en gezondheid, dat men van een paard wenschen kan. Het is vooral in de eerste betrekking dat de uitwendige paardenkenis zich met de beschouwing der ligchaamsdeelen bezig houdt, terwijl het alhier de plaats is om de vereischten der inwendige deelen te onderzoeken.

De

De bewijzen van een gezond, welgevormd, en deszelfs verrigtingen met gemak volbrengend hart zijn: een regelmatige, met gelijke langzame slagen in iederen ouderdom zich gelijk blijvenden pols, welke na eene door inspanning voortgebragte versnelling, weldra tot de vorige orde terugkeert, zonder eenig teekenen van smart of benaauwdheid te doen ontwaren.

Eene gezonde long openbaart zich door eene breede borst, door vrij en behoorlijk ongedwongen uit- en inademen, zoo wel bij inspanning als anderzins, en zonder dat het weder, de lucht- en landstreek er eenigen invloed op heeft; in het algemeen door eene goede vorming der lucht- en longpijpen, van het strottenhoofd, van het neuskanaal enz. zonder dat de adembaling met hoesten of uitwerpen van slijm, bloed en etter verzeld gaat.

De maag is zulks, wanneer de eetlust en spijsvertering goed is, zonder dat men spanning, winden of kwade reuk gewaar wordt, hetgene tevens een bewijs voor den goeden toestand van het darmkanaal oplevert.

Eene gezonde lever ontdekt zich door de frische kleur der oogen, en wanneer derzelver vliezen niet geelachtig zijn; indien de rechterzijde onder de onware ribben niet opgezet noch pijnlijk is, de mist en het water derzelver natuur-

tuurlijke kleur bezitten, en de spijsvertering ongestoord volbragt wordt.

Het bestaan van gezonde nieren en blaas kan men veronderstellen wanneer de pis onbepaald ontlast wordt, zij eene natuurlijke kleur, reuk en zelfstandigheid bezit, en zich geene teekenen van pijn in den omtrek der lendenen opdoen.

- 13 Wat de uitwendige lichaamsdeelen aangaat, zoo moeten dezelve geene afwijkingen vertoonen, het zij door wangeftalte, andere kleur of tempering, dan die natuurlijk is, en zij voorts derzelver bewegingen met gemak verrigten, zonder na inspanning eene buitengewone vermoeienis aan te kondigen. Wanneer nu zoo wel deze als de levenswerktuigen in derzelver gezonden en volmaakten toestand overeenstemmen, alsdan kan men gerust dezelve een staat van volkomen welzijn en gebruikbaarheid toekennen.

Somtijds heeft er eenen middelstaat tusſchen volkomene gezondheid en ziekte plaats, beſtaande in den aanleg tot ongefteeldheid, welke door eene ſlap- en matheid, langzame volbrenging der onderſcheidene verrigtingen, en eene ongeregeldheid in de afzonderingen en ontlaſtingen, afwiſſeling in de tempering des lichaams, en eene gebrekkige ſpijsvertering, aangewezen wordt.

TWEE-

T W E E D E H O O F D D E E L.

D E K E N T E E K E N E N V A N Z I E K T E.

E E R S T E A R T I K E L.

Kenteekenen welke de levensverrigtingen opleveren.

14 **O**nder de kenteekenen welke de ongesteldheid des ligchaams aankondigen, verdienen die welke de levensrigtingen opleveren vooral onzen aandacht, aangezien de omloop des bloeds en de ademhaling, het eerst door iedere ongesteldheid gestoord worden.

a. De pols.

15 De polslag welke door het beurtelings zamentrekken en uitzetten van het hart en der slagaderen, door den aandrang des bloeds te weeg gebragt wordt, levert eene der onbedriegelijkste middelen ter beoordeeling van den staat en aard der ziekte, zoo wel als van dien der gezondheid, op, waarbij men echter de ouderdom, het geslacht, de levenswijs, het weder en de luchtstreek in aanmerking moet nemen, welke alle er den grootsten invloed op hebben; dus heeft een groot plantëtend dier
een

een langzamer pols dan een klein vleeschë-tend, en een oud, een tragere dan een jong dier; In het algemeen rekt men dat bij een volwasfen paard 40 à 50 polsflagen in de minuut in den ftaat van gezondheid gefchieden; terwijl zoo wel een dit te bovengaand als onder hetzelfde blijvend getal, als eene afwijking van den gewonen ftaat aangemerkt kan worden.

Het is niet genoegzaam zich flechts bij deze aanwijzing te bepalen, welke alleen aanduidt, dat het dier ongefteeld is, maar men behoort met de eigenschappen der verfchillende polsflagen bekend te zijn, om deszelfs naderen aard te onderscheiden, te welken einde men deze, het zij aan de borst tuffchen de voorbeenen; het zij in fommige gevallen aan de flapflagader onderzoekt, en welke de volgende kenmerken oplevert.

- 16 De fnelle pols welke meermaal in eene minuut ftaat, en fterker zamentrekkende dan in den gezonden ftaat, met een heviger kloppen der flapaderen gepaard gaat, wordt de koortspols genaamd.

De langzame welke daarentegen minder flagen dan vereifcht wordt in de minuut telt, is een teeken van flapheid, traagheid en een onaanadoenlijk (phlegmatiek) temperament.

De fterke pols, voortgebragt wanneer
de

de slagaderen met geweld kloppende eene zekere volheid aankondigen, is een teeken van te veel kracht, en meestal van ontsteking; voorts bij eene langzaam afloopende ziekte van weinig gevaar en eenen goeden uitslag.

De harde, plaats hebbende wanneer de slagaderen hard en gespannen kloppende, grooter weêrstand bieden en het gevoel als dat van eene gespannene snaar veroorzaken, beteekent kramp, belemmerden omloop des bloeds, en is een kwaad teeken in koortsen, hij verkondigt het einde, ingeval trekkingen plaats hebben, en de dood wanneer dezelve in langdurige ziekte op den zwakken pols volgt.

De zwakke getuigt van gebrek aan kracht, veranderde terugwerking, van eene langzame slepende, moeilijk te genezene kwaal, en tevens snel zijnde, verstrekt zulks ten teeken van vermoeijenis na arbeid, van inwendige gebreken, ettering, tering en snipkoortsen.

Door een weeke verstaat men diegene welke naauwelijks merkbaar, breed en aan de drukking der vingers bijna geenen weêrstand biedend is; hij getuigt van groote zwakte na kramp of afmatting, vernauwing der vaten, teruggang des bloeds, en vermindering der ziekte; terwijl hij in koortsen, zweet en aanstaande beëindiging der ziekte aankondigt.

De gelijke pols welke regelmatig maat houdende, na afgemetene tusschentijden klopt,

zonder voller, harder, weeker of zwakker te worden, is een der zekerste teekenen der gezondheid.

Daarentegen levert de ongeregelde, welke in getal, kracht en tijd der kloppingen verschilt, een bewijs op van ongeregeltheid in de terugwerking van het slagaderlijk stelsel, van gebreken in de vorming der vaste deelen, het zij door polijpen, verhardingen in de slagaderen enz., of wel van dikbloedigheid; dezelve is bedenkelijk in heete koortsen, minder gevaarlijk in andere ziekten, doch een doodelijk teeken wanneer hij tevens zwak, week en snel is.

De tusschenpoozende, welke tusschen de polsflagen een meerder of minder tijd laat verloop, heeft eene gelijke oorzaak met de vorige en voorspelt de nakende dood op het einde van heete ziekten.

Wanneer de pols plaatselijk ontbrekende is, verstrekt dit ten teeken van gebrek aan levenswerkzaamheid of verlamming, en in het algemeen van uitputting, flaauwte of de dood; ofschoon echter somtijds het vet en de diepe ligging der slagaderen beletten kunnen de pols te ontdekken.

Al deze opgenoemde, en iedere afwijking des polsflags van den natuurlijken toestand toont eenen staat van of aanleg tot ziekte aan; dezelve kan eenvoudig of zamengesteld

wezen, waarvan het eerste dan plaats heeft, wanneer slechts ééne foort van pols door het gevoel ontdekt wordt; terwijl men door de zamengestelde diegene verstaat; waarbij men verscheidene foorten gelijktijdig waarneemt, en vier zamenvoegingen, die men meest in hevige ziekten aantreft, vooral wanneer de pols klein en zwak is, de grootheid des gevaars te kennen geven, en sterk en hard zijnde, hevige toevallen voorspellen.

b. De ademhaling.

- 17 De ademhaling moet met eene zekere gelijkvormig- en bedaardheid geschieden, om ten teeken van ongestoorde gezondheid te verstreken, terwijl voorts uit hoofde van den omloop des bloeds door de longen, de naauwste betrekking tusfchen haar en den pols plaats grijpt, zoodanig, dat deszelfs snelheid steeds eene verhaasting der ademhaling voortbrengt, en omgekeerd, in diervoege: dat alle afwijkingen in den pols, in de ademhaling bemerkbaar worden, die even als deze, sneller bij een jong dan bij een oud dier plaats heeft, en voorts door den vorm der borst, de gesteldheid en het weder gewijzigd wordt; kunnende men in het algemeen, bij een volwasfen paard drie polsslagen op iedere ademhaling rekenen, terwijl men de ademhaling in het algemeen verdeelt: in de

de natuurlijke, die alleen in de gezondheid plaats heeft, en in de ziekelijke, welke hare storing aanwijst en waarvan de onderverdeelingen tot meenigerlei kenteekenen van onderscheidene toevallen verftrekken.

18 Het snelle ademen dat zonder merkbare tusfchenpoozingen met zekeren haast gefchiedt, en door eenen fterkeren aandrang van het bloed naar de longen voortgebracht, met eenen snellen pols verzelde gaat, is in gezondheid het gevolg van fterke beweging, hartstogten, winden, enz. In ziekte: een teeken van hevige koorts, kramp en groote benaauwdheid; het is gevaar voorfpellende in ontstekings ziekten, doodelijk in heerschende en aanstekende, terwijl het zwak, met geruisch en hol roghelen gepaard gaande eene voorboede van den naderenden dood is.

Het langzame eenen vrijen omloop des bloeds bewijzende, is dan alleen gevaarlijk wanneer het door de hevigheid der ziekte wordt te weeg gebragt, terwijl, indien het op de snelle ademhaling volgt, de dood als nabij zijnde te befchouwen is.

Het diepe ademen met volle long, genoegzame kracht en uitzetting derzelve gefchiedende, is fteeds een gunftig teeken, en voorfpelt bij voorafgaande borstkwalen, herftelling van dezelve.

Het korte en afgebrokene ademhalen, beteekent belemmering der ademhalings-werktuigen met verval van krachten verzeld; met hitte gepaard: longontsteking; zonder koorts, in bedompte stallen: stikgas; Hetzelve is zorgelijk in besmetting; onbeduidend gedurende de koorts, doch een gevaarlijk teeken wanneer het na dezelve voortduurt, wijl het grootte zwakte aanwijst.

Het hooge, kenmerkt eenen gestoorden omloop des bloeds en sterk aangetaste werktuigen der borst, en is een kwaad teeken in koortsen en borstwaterzucht, terwijl het in trommel- of windzucht veel gevaar dreigt.

Het angstige, dat in gezondheid een teeken van vrees of schrik is, verstrekt in ziekte tot dat van de hoogte der toevallen, van aandrang des bloeds naar het hart en deszelfs gestoorden omloop; en, terwijl het in den aanval der koorts niet zeer beduidende is, wordt het op het einde van zware ziekten bedenkelijk.

Het zuchtende ademhalen, een nadeelig teeken in heerschende en besmettende ziekten, voorspelt met andere kwade teekenen gepaard den naderenden dood, en in andere kwalen de hoogte der ziekte.

Het fluitende dat werktuigelijke hinderpalen, als vernauwing der strottenhoofdspleet, verslijming der longpijpen en gezwollen aankondigt, is in de keelontsteking meest doodelijk,

lijk, en in alle keelziekten eene aanwijzing van het grootste gevaar.

Het ro g c h e l e n d e is altijd een teeken van den nakenden dood, ten minste van het grootste gevaar, vooral in besmettelijke ziekten.

Het p i j n l i j k e ademen, dat in longontstekingen in derzelver aanvang, mits met kracht en goede teekenen gepaard, niets beduidend is, wordt op derzelver einde bedenkelijk, terwijl het in koortsen, kramp en gevaarlijke toevallen voorspelt.

Het w a r m e u i t a d e m e n wijst gezondheid; h e e t, longontsteking, en in koortsen de hevigheid der ziekte aan; terwijl het k o u d e, zinkende levenskracht, het vuur en de dood aankondigt.

Een s t i n k e n d e a d e m bewijst in borstziekten, ettering, diepleggende verzweringen en bederf der long; kwade droes, enz.; in koortsen dreigt dezelve gevaar, en indien hij krengachtig ruikt, eene spoedige dood.

Het k u g c h e n is een teeken van borstgebreken, van longziekten of dampigheid; en in koortsen, van borstkramp; lietzelve is gevaarlijk, wanneer het intrekken des buiks en het kloppen der zijden er mede gepaard gaat, edoch in slepende ziekten is het minder zorgverwekkend.

- 19 Het hoesten dat in eene stootswijze uitzetting der long bestaat, vaak met uitwerping van slijm, etter of andere stoffen gepaard gaat, is aan verschillende onderscheidingen onderhevig.

Het hoesten dat uit eene volle borst een goed en krachtaankondigend teeken is, getuigt ook in longontsteking, droes en verkoudheid van de onbeschadigdheid der longen en dus van weinig gevaar.

Daarentegen is het korte hoesten eene aanwijzing van finart, aangetaste long, verzwering, dampigheid en sterken prikkel; terwijl het kort afgebroken alleen met de keel geschiedend, in longontstekingen, pijn en de hoogte der ziekte; in koortsen krampaanwijst; voorts kan hetzelfde in doffe stallen door scherpe dampen, alsmede door prikkeling van slijm of vreemde lichamen veroorzaakt worden.

Het vochtige hoesten dat ten teeken eener zwakke long verstrekt, is minder bedenkelijk dan het drooge, en levert zelfs, gepaard met sterk uitwerpen, na ziekten en ontstekingen een goed teeken op, doch is van een kwaad voorbeduidfel in koortsen.

Hetzelfde kan men van het drooge hoesten in heete ziekten en long-ontstekingen zeggen, waarin hetzelfde vaak doodelijk wordt.

Dikwerf hoesten de paarden wanneer zij uit warme stallen in eene koudere buitenlucht komen

men of door het stof gaan, zulks heeft echter even weinig te beduiden, als wanneer hetzelfde door het likken der kalk- of kleiwanden veroorzaakt wordt.

20 Het proesten is niet alleen bij gezonde dieren een teeken van den goeden toestand der inademinings-werktuigen, maar kondigt in ziekten de terugkeering der gezondheid en de verheffing der levenskracht aan.

Het briesfchen dat in gezondheid verlangen naar voedselenz. uitdrukt, voorfpelt vaak het naderende einde in besmettende en heerschende koortsen.

T W E E D E A R T I K E L.

De dierlijke verrigtingen.

Daar gevoel en beweging juist gewijzigd de gezondheid aankondigen, zoo worden door derzelver verschillende afwijkingen eenen zieken toestand aan den dag gelegd.

21 Eene veel te sterke levenswerkzaamheid, is als eene overtreding der natuurlijke gesteldheid, als gebrekkig aan te merken; dezelve kenmerkt zich door eene grootere levendigheid, krachtigere beweging, eenen vurigen wilden blik, het opsteken der ooren, enz.

22 De vermeerderde prikkelbaarheid welke zich door angstigheid in blik en houding, groote onrust, pijn, heen en weder trappen, neêrvallen en opspringen, enz. aankondigt, is even onbeduidende in koortsen, als zij gevaarlijk in ontstekings ziekten is.

23 De verminderde prikkelbaarheid welke een toestand van zwakte, steeds bedenkelijk en nimmer zonder gevaar is, uitgenomen wanneer zij door het afnemen der vermeerderde prikkelbaarheid voortgebracht wordt, kensteekent zich door de verminderde beweging, den flauwen blik, het hangen in den halfter of het leggen op het stroo.

De rilling is een aanval van koude met eene vastliggende huid en opstaande haren, welke schielijk voorbij gaat, en vaak schudden in koortsen zijnde, is dezelve een teeken van derzelver aanval, en wordt gewoonlijk door sterke hitte gevolgd; in besmettende ziekten verkondigt dezelve aansteking, en in slepende of langdurige, opslorping van schadelijke vochten en etter; In weinig beduidende toevallen is dezelve niet gevaarlijk, edoch bedenkelijk op het einde eener ziekte, terwijl zij den dood voorspelt wanneer zij in besmettende ziekten lang duurt; gaat hiermede eene inwendige hitte gepaard, zoo is dezelve meestal zorgelijk, edoch ook vaak eene voorbode der besliss-

sisfing en van het uitbreken des zweets, terwijl derzelver poedige terugkeering de hoogte der ziekte aan den dag legt.

Een hooger trap van dit toeval is het *verftijven*, welk indien het na sterke verkouding, en den invloed van schadelijke prikkels volgt, meest als een bijkomend toeval plaats grijpt; Hetzelve duidt niet alleen de hevigheid der koorts aan, maar is als zeer gevaarlijk in longontstekingen, en vooral in gestremde uitwaseming en buikwee aan te merken; minder is het indien wormen aanleiding daartoe geven, edoch wanneer het met sterke zamentrekking der spieren, zoo als in de klem enz. gepaard gaat, kenmerkt het groote zwakte en benevens de overige bedenkelijke toevallen een doodelijk gevaar.

In *kramp en trekkingen*, wordt eene bloote kortstondige zamentrekking der spieren, *kramp* genaamd, van welke men die welke langer duurt, door den naam van *aanhoudende kramp* onderscheidt; terwijl men *trekkingen* noemt, wanneer de zamentrekking en het uittrekken beurtelings geschiedt. De *kramp* is in reumatieke toevallen, zoo als in vervangendheid enz. van weinig beduiding, edoch bedenkelijker in de klem, en doodelijk wanneer zij in trekkingen ontaardt, terwijl wanneer zij door wormen veroorzaakt wordt, zulks de ongeneesbaarheid daarvan,

en in heete ziekten den dood aankondigt.

Het peestrekken dat in eene trillende of trekkende beweging der huidspieren en vooral van derzelver peesachtige nitbreidingen bestaat, is onbeduidend na bewegingen, wijl het alsdan door zweet gevolgd wordt, edoch het verstrekt ten teeken van gevaar in koortsen en besmettelijke ziekten.

- 24 De pijn welker gewaarwording het dier door weêrstand en ontwijken te kennen geeft, wordt door eene zeer verhoogde prikkelbaarheid te weeg gebragt, die zelfstandig of toevallig plaats heeft. In het eerste geval, bepaalt zich de pijn vooral tot de aangedane plaats, doch wordt in het tweede ook naar andere deelen voortgeplant en levert door haar zetel de volgende kentee-kenen der kwalen op: pijn in het hoofd doet hersenontsteking; die in den hals keel- ziekte vermoeden; in de borst geeft zij long- ontsteking, in den buik, het kolijk, in de lendenen, ontsteking der nieren, en onder de onware ribben, die der lever te kennen; zware pijn, beteekent groot ongemak en dreigend gevaar, zoo als geringe de onbedui- dendheid des ongemaks, de aanhoudende, deszelfs hardnekkigheid, de tuschenpoo- zende en kortstondige deszelfs eindiging, de omzwervende, de wisseling van deszelfs zetel aankondigt, en gevaar voorspelt wanneer edele deelen aangetast zijn. Het

Het steunen en zuchten, zijn steeds uitingen van pijn, bewijs van vermindering der krachten, van de hoogte der ziekte, van gevaar en snellen dood.

α. Gedaalde levenskracht.

- 25 Vermoeidheid na arbeid, beteekent bij sterke dieren groote inspanning; bij zwakke, gebrek aan kracht; doch zonder arbeid, ongesteldheid of eene aauftaande ziekte; zij heeft in den loop derzelve na de aanvallen plaats, en verkondigt, na dat zij in evenredigheid van derzelver hevigheid meer of minder aanmerkelijk is, een grooter of kleiner gevaar.

De afgemathheid die een teeken van gedaalde krachten oplevert, is in zware ziekten zeer bedenkelijk en een gewone voorlooper des doods; voorts is eene zoodanige verzwaking steeds gevaarlijk, welk een deel het ook moge zijn dat er door aangedaan wordt, en brengt, wanneer zij de ingewanden treft, de loop, droppel pis enz. voort.

Verlamming is het ophouden der verrichtingen van een werktuig, en dus doodelijk wanneer zij een dergene treft, die tot het leven noodzakelijk zijn.

De gevoelloosheid is steeds een kwaad teeken; wanneer dus het paard de voorwerpen die het omringen niet bemerkt, geene vliegen afweert,

weert, noch op de stem of zweep acht staat, zoo is deszelfs einde nabij.

Het schudden is een goed, genezing en gezondheid aankondigend teeken.

Zwakte is meestal een teeken van geleden gebrek, vermoeijenis of van eenen aanleg tot ongesteldheid, indien men ze dus in een anders gezond en sterk paard aantreft, verdient dezelve alzins opmerking, schoon in eenen minderen trap wanneer het dier anders zwak mogt zijn; gevaarlijk is de zwakheid der spieren in koortsen, en een kwaad teeken wanneer dezelve den omloop des bloeds treft; die der zenuwen kenmerkt gedaalde levenskracht, en is, gepaard met die der spieren meestal doodelijk. Iedere plaatselijke zwakte eens werktuigs kan ligt aanleiding geven tot opzwellingen, uit hoofde dat deszelfs vaten alsdan den aandrang der vochten niet wederstaan kunnen; hiervan verstrekt ten voorbeeld, dat wanneer een ziek paard niet kan liggen, deszelfs beenen zwellen, doordien dezelve verzwakt wordende, het zinken der vochten in dezelve geenen tegenstand ontmoet.

26 De aangetaste levenswerkzaamheid geeft zichte kennen door beven, hetwelk eene werking der spieren is die in korte en bijna onmerkbaar trekkingen bestaat, welke in een

ge-

gezond dier vrees en angst, in een ziek, aanvallen der koorts aankondigt, en alsdan onbeteekenend is; édoch, in langdurige ziekten geeft het groote zwakte te kennen, zoo als eene bevende tong groot gevaar aanwijst

27 De uitwendige zinnen geven de duidelijkste kenteekenen van den staat der ziekte. Van dezelve is een zeer opgewekt gevoel in de hoogte derzelve minder gevaarlijk dan gevoelloosheid, welke na eene langdurige ziekte meestal den dood voorspelt.

28 Daar de reuk den dieren onontbeerlijk is, zoo kondigt deszelfs gemis steeds eenig gebrek aan.

29 Het gezigt dat door de oogen als in een spiegel vele merkteekenen doet zien, belooft wanneer dezelve levendig staan, zelfs in het grootste gevaar nog de mogelijkheid eens gunstigen uitslags; terwijl daarentegen, doffe oogen steeds tot een nadeelig voorteeken verstrekken.

De starende blik voorspelt in heete ziekten, als: in de klem en ontsteking der hersenen, een spoedigen dood; De gestadige beweging der oogen beteekent inwendige kramp. Schitterende wild rondziende oogen, woede, razernij, koorts, de
hoog-

hoogte der kwaal en ontstekingen; terwijl een schelende blik met vertooning van veel wit aan de kolder eigen is. De parelachtige glans en glasachtigheid wijzen in rotkoortsen enz. het grootste gevaar aan; Uitpuilende oogen met roodheid van het zamenvoegend oogvlies, geven in hersenontstekingen enz. den aandrang des bloeds naar het hoofd, en in koortsen, de hevigheid der ziekte te kennen; zoo als de stijve, kramp, hevige pijn, en vaak de ongeneesbaarheid der kwaal; Matte en doffe, wijzen verminderde levenskracht aan, gelijk slaauwe halfgeflotene, in gezondheid vermoeidheid en slaperigheid; in ziekte, kolder en hoogte der ziekte te kennen geven; ingevallene, verstreken in koortsen tot een kwaad teeken; terwijl verdraaide, ontsteking in hoofdwonden, kramp en andere ziekten aanwijzen.

Voorts levert de van de natuurlijke verschillende kleur der oogen, verscheidene ziekte kenteekenen op.

Daar de roode kleur van het oogvlies ten teeken van gezondheid verstrekt, zoo is de bleeke, dat van zwakte en aanstaande ongesteldheid; te roode van oog-ontsteking; gele van lever- en galziekten; witte van zwakheid, terwijl de slapheid van het oogvlies vooral wanneer het in den binnensten ooghoek zichtbaar uitsteekt, een gemeen ras verraadt.

Is het hoornvlies zeer glinsterend en met groote hitte gepaard, zoo kan men ontsteking der hersenen vermoeden, en een flecht einde der ziekte, ingeval deze glans vermindert; zoo als het een teeken des doods is, wanneer de oogen breken, het regenboogvlies overdekt wordt; en weder te rug gaat.

Dikke gezwollene oogleden, verraden den aanleg tot maanoogen; te wijd geopende mistaan, en hebben vaak plaats wanneer de oogen bij eene ontsteking uitpuilen; half geopende, toonen zwakte der opheffspieren en in ziekte, diep gezonkene krachten aan, terwijl geflotene, oogontsteking, zwakte en groote aandoenlijkheid voor het licht te kennen geven.

Traanlozing, is, of een gevolg van kwetsing en oogontsteking, of van verkoudheden en droes, menigmaal ook een toeval van den kwaden droes, wanneer de traanbuizen verstoppt of aangetast worden, of van een traanfistel; terwijl ook scherpe staldampen vaak tranende oogen te weeg kunnen brengen, die in koortsen van eene kwade voorbeduiding zijn; het gebrek aan tranen, heeft groote hitte, en sterke uitwaseming, en in hoofdontstekingen, gevaarlijke toevallen te beduiden.

Een verwijderde oogappel, geeft in ziekte gevaar, in gezondheid met onbewe-
ge-

gelijkheid gepaard, blindheid de zwarte staar genaamd, of de gevolgen van het gebruik van verdoovende vergiften en wormen te kennen; terwijl een vernaauwde in hoofdwonden, drukking der gezigtzenuw, en een onbewegelijke derzelver verlamming en blindheid aankondigt.

DERDE ARTIKEL.

De inwendige zinnen.

30 Ook de inwendige zinnen leveren verscheidene kenteekenen op; dus wordt het bewustzijn vaak in zware ziekten gemist, schijnende de paarden als te mijmeren zonder op iets dat hen omringt, acht te geven. De razernij is een der bedenkelijkste en door de moeilijkheid om hen te naderen of te helpen, eene der gevaarlijkste toevallen. Terwijl duizeligheid een prikkel op de hersenen aankondigt.

De aan het waken geëvenredigde flaaap, verstrekt tot een teeken van gezondheid, te veel daarentegen ten blijk van aangetaste hersenen, kolder enz. te weinige van aan-
drang der vochten naar het hoofd, van onrust, kramp en ziekte.

VIERDE ARTIKEL.

De natuurlijke verrigtingen.

31 Wanneer in heete ziekten weinig dorst bespeurd wordt, duidt zulks eenen geringen trap derzelve aan, daarentegen ontdekt sterke dorst, veel hitte en gevaar in ontstekingsziekten, alsmede in die uit zwakte ontstaan, en reeds eenigen tijd geduurd hebben, vooral wanneer de mond daar bij droog is. Dorst met onvermogen tot drinken, heeft vaak in long- en keelontstekingen plaats; vermindert de dorst zoo vooripelt zulks beterschap, doch geheel ontbrekende en met andere ongunstige toevallen gepaard gaande, een spoedig einde.

Eene juiste geëvenredigde eetlust is een der zekerste gezondheidsteekenen, daar derzelve onmatigheid, wormen, bedorven gal, te scherp maagsap; enz. en de verminderde, ongesteldheid aanwijst, terwijl de na ziekte terugkeerende honger, beterschap verkondigt.

Daar het kaauwen zonder moeite dient te geschieden, zoo zijn in het tegengesteld geval ongemakken aan de tanden, het gehemelte of onder de tong te vermoeden, en indien daarbij het paard den mond bezwaarlijk kan openen, zoo moet men voor de klem beducht zijn.

C

Het

Het flikken, dat onbelemmerd een goed teeken is, kenmerkt, wanneer het verandering ontmoet, verzwakking, verdrooging, verslijming of ontsteking der keel; hetgene ook door een gezwel of vreemd ligchaam kan worden veroorzaakt, en verstrekt na langdurige ziekten tot voorbode des doods.

32 De winden voortgebracht door in de darmen zich ontwikkelende gazsoorten, verstreken tot een goed teeken in buikwee en andere ziekten der ingewanden; edoch wanneer zij niet geloosd worden, geven zij kramp en zamentrekking der darmen te kennen; rommeling in het lijf beteekent bij opgeblazene dieren een spoedig en gunstig einde des ongemaks. Opgeblazenheid geeft een bewijs van genoten winderig voedsel, en met pijn gepaard; van kolijk, terwijl zulks na ontstekings-ziekten het vuur verraad.

Gebrekkige spijsvertering is steeds een bewijs van werkeloosheid der ingewanden, vaak van overeten, koorts en zwakte, terwijl zij een zeker gevolg is van te veel rust en mangel aan beweging in de opene lucht.

33 De afgang die even min te hard als te week behoort te zijn, doet verscheidene ongemakken door deszelfs gesteldheid onderkennen, vast en rond met slijm overtrokken, ken-

kenmerkt dezelve groote hitte; zwarte, galziekten; terwijl witte, gebreken der lever, en doorgaans mangel aan bijgevoegde gal aan den dag legt. Te harde is een teeken van te groote werkzaamheid der opslorpemde vaten, b. v. in ontstekingsziekten, of van een te lang verblijf in de darmen, als in koortsen. Zeeer dunne, door de vermeerderde beweging der ingewanden voortgebracht, is, wanneer zij door het voeder veroorzaakt wordt, van weinig gewigt, doch in koortsen gevaarlijk; met onverteerd voeder vermengd, wijst dezelve eene gebrekkige spijsvertering; dunne en waterige, zwakheid; en slijmerige, eene gebrekkige afscheiding van het darmlijm aan; terwijl de met wormen vermengde, het zekerste getuigenis van derzelver aanwezig geeft; eindelijk, is de bloedige steeds gevaarlijk, vooral diegene, welke geheel bloed zijnde, de verlamming van de bloedvaten des achterlijfs aan den dag legt; daarenboven levert de verschillende reuk des afgangs onderscheidene ziekte kenteekenen op.

De verstoptheid welke in koortsen of ontstekingen nimmer geheel onbeduidende is, wordt door langdurigheid, vooral in het eerste geval gevaarlijk.

De pis welke niet alleen den tegenwoordigen toestand maar ook de hoogte der ziekte aanwijst, levert de volgende teekenen op. Kan

het paard niet wateren, zoo is zulks een bewijs van kramp der werktuigen der waterloozing, van ontsteking, zwakte, steenen, buikwee of van koorts, welke in dit ongemak steeds met gevaar verzeld gaat; het afloopen derzelve zonder gevoel, voorspelt in gevaarlijke ziekten, den naderenden dood; te veel vermagering, flechte verteering, veel zuur en verlamming der piswerktuigen; veel pis op het einde eener ziekte: derzelve beslissenden uitslag, (crisis.) Heldere en klare betekent kramp, aanval van koorts, gebrek aan krachten en onverteerbaarheid; roode, hitte; vlammen de: ontstekingen; bloedige, aangetaste blaas en nieren; gele: galzicken en leverontstekingen; troebele met bezakking, geeft het afgaan der koortsen te kennen, edoch wanneer dezelve niet bezinkt, zoo is zulks een teeken van gevaar; en etterachtige, dat van verzweringen. Voorts is de ziekte des te gevaarlijker, naar mate de kleur hooger is; terwijl de afwijkingen van de natuurlijke reuk mede onderscheidene merkteekenen van den staat der ziekte opleveren.

- 34 Wanneer het speeksel van deszelfs gewonen toestand afwykt, kan het als een ziekte teeken beschouwd worden, te veel, getuigt de verflapping van deszelfs buizen, gebrekkige ver-

vertering en afzondering; te weinig van te werkzame opflorpende vaten en droogheid des ligchaams; en terwijl het schuimende, gezondheid aankondigt, is het wankleurige het zij al of niet bloedig, een bewijs van ongezondheid, kwetsing des monds of der speekselbuizen, of de gebrekkige afscheiding van derzelver klieren; terwijl het etterachtige, dikke, taaije, stinkende, het grootste gevaar in koortsen verkondigt, en zeer dun, groote zwakte en bepaling der vochten naar den mond ontdekt.

Indien de snot uit beide neusgaten ontlast wordt, geeft zij dun en waterachtig zijnde, verkoudheid en gewonen droes te kennen, ook dan wanneer zij geelachtig en dikker wordt; edoch etterachtig en stinkende, zonder zwelling der kaakklieren, verraadt zij longtering; en wordt zij slechts uit één neusgat ontlast, is zij daarbij wit, groen, geel, bruin, wankleurig, bloedig en stinkende, zoo kan men den kwaden droes niet miskennen.

Het weet welks nuttigheid zoo ontegenzeggelijk is, wanneer het zich alleen als uitwafeming naar evenredigheid der beweging met eene gepaste warme ligchaamstempering over het geheele lijf vertoont, verstrekt alsdan ten waarborg der gezondheid; te veel, echter bewijst bij een gezond paard, zwaren arbeid, uitgestane vermoeijenissen, het genot van veel hooi

of zwakte; het gebrek aan uitwaseming: ongesteldheid, huidkramp en zinkingachtige toevallen, en terwijl dit een gevaarlijk teeken in koortsen is, daar zulks eenen gebrekkigen omloop der vochten bewijst, is der zelve herstel allerheilzaamst, in ziekten waarin zij gestoord was geworden; een algemeen zweet kan men als een goed teeken in koortsen en buikwee door verkouling veroorzaakt, beschouwen; terwijl het integendeel als een kwaal in de klem is aan te merken; voorts verkondigt een plaatselijk, aan de ooren en in de zijden, aanvallen van koorts; koud: groot gevaar; klam en kleverig: onzuiverheid der huid of den naderenden dood; stinkend, de grootte der kwaal; krengeachtig riekend, eenen spoedigen dood.

35. Of schoon men het bloed niet als algemeene teekenen opleverende, kan aanmerken, wijl men slechts in bijzondere gevallen aderlatende, zeldzaam gelegenheid heeft het te onderzoeken, geeft echter datgene hetwelk terstond stolt, dik en taai wordt, kracht te kennen; zoo als dat, met veel gestolde lympha bedekt wordt, onuteking, dun of waterig zijnde, besmettende ziekten aankondigt.

Teekenen der onderscheidene ligchaamsdeelen.

36 Wijl derzelver beschouwing veel licht in ziekten verspreidt, zoo komt in de eerste plaats de verandering van den omtrek des ligchaams in aanmerking.

Wanneer een dier in dikte toeneemt, zoo wordt zulks bij gezonde paarden door goed voedsel of andere omstandigheden te weeg gebragt, b. v. gedurende den arbeid, wanneer de vochten naar de huid vloeijen, door de zonnehitte, of na het genot van verhittend voeder; in ziekte is het een teeken eener ontstekingskwaal of van koorts, en terwijl zulks met verstopping gepaard in het begin onbeduidende is, zoo is het zeer bedenkelijk op het einde eener heete ziekte; dezelve kan insgelijks vergroot worden door water in het celwijs weeffel in den buik of tusfchen de buitenste bekleedselen, zoo als in de waterzucht, wanneer zij steeds een teeken van gevaar is.

Wanneer de lucht door eene wond in het celwijs weeffel dringende, de huid opblaast, is zulks in borstwonden een gevaarlijk teeken en bewijs van beschadiging der long, doch minder zorgelijk in andere, terwijl het zeer bedenkelijk na den beet van vergiftige dieren, en somtijds beslissende na het uitstaan van ziekte is.

De dunte en magerheid, welke den omtrek des ligchaams vermindert, is van geen gewigt bij gebrek lijdende dieren, doch van

beduidenis in loop en tering, terwijl het in dampigheid en kwaden droes het naderend eind voorispelt.

Het opzwellen van bijzondere deelen, door waterachtige vochtigheden of lucht, is altijd min of meer zorgelijk; dus doet dat der oogleden, maanblindheid vreezen; der neus en borst, watergezwollen; des balzaks en koker ziekten verplaatfingen van den droes en kwaden droes; dat der beenen, waterzucht in dezelve of mok; der bloedaderen: verslapping of gebrek aan beweging, enz.

37 In de tweede plaats verdient de verandering van de tempering des lichaams onzen aandacht.

Het gezonde dierlijk ligchaam is eene zooldanigewarmte eigen welke met de het omringende dampkringslucht in evenredigheid staat; eene meerdere warmte of hitte is aanwijzing van ziekte, welke indien dezelve onder de ongelegde hand toeneemt, van eene koorts met verzwakte levenskracht, en verdwijnende, van ontteking getuigt; terwijl indien de hitte mat is, en nog lang een prikkelend gevoel in de hand nalaat, zulks gevaar verkondigt.

Bespeurt men bij hetzelfde eene koude, welke die der omringende lucht overtreft, zoo ontdekt zulks gebrek aan kracht, aanstaanden aanval van koorts, krampen en gestoorden omloop;

loop; en wanneer zij op het einde eener langdurige ziekte plaats heeft, het naderen des doods. Wisselt warmte en koude beurte- lings, zoo is dit een teeken van krampen en aanvallen van koorts, terwijl naar mate de- ze afwisseling schielijker plaats heeft, hieruit de hevigheid en aard der ziekte kan afgeleid worden.

Eene matige warmte is een goed teeken in ziekte en zelfs van genezing, wanneer deze langdurig is geweest; vooral is dezelve en zelfs hitte goed, wanneer er uitwaseming op volgt, edoch zij is meer bedenkelijk wanneer zij met droogte gepaard gaat. In eenige ziek- ten heeft somtijds eene onaangename matte, prikkelende en met eene bijzondere en walge- lijke reuk verzelde warmte, plaats, die wan- neer zij in koortsen voor komt, zeldzaam ver- gunt genezing te hopen.

Groote hitte des ligchaams met koude ooren en voeten gepaard, ver- kondigt veel gevaar, daarentegen zijn heete ooren en voeten geen gevaarlijk teeken, ter- wijl plaatfelijke sterke hitte gewoonlijk ontsteking aanwijst. Uitwendige koude en inwendige hitte zijn zeer kwade tee- kenen, terwijl ook indien de inwendige hitte door koude vervangen wordt, zulks den aan- staanden dood voorspelt, hetgene ook vaak door branden geschiedt, dat ten minste den hoo-

gen trap der ziekte aanwijst; eindelijk is de droogheid der huid met hitte gepaard een kwaad teeken, vooral navoorafgaande uitwafeming, edoch een goed, wanneer zij door deze gevolgd wordt.

38 Onder de ziekte-kenmerken welke de ledematen opleveren, beteekenen beweegbare, gespitste en naar ieder geluid vrolijk gerigt wordende ooren, gezondheid; derzelve terugleggen, nukken, valsheid en wil tot bijten; vooruitgespitste met eenen zijdelingschen blik, vrees; flappe afhangende, luiheid, een gemeen ras, weinig moed en traagheid; wanneer het eene vooruit en het andere teruggedigd wordt, is zulks vaak een teeken van kolder; opgerigte ooren die geheel onbewegelijk zijn, beteekenen vaak met andere toevallen verëenigd, ontsteking der hersenen; koude of heete, een aanval van koorts, in welke één heet en één koud, tot een kwaad teeken verstrekt. Is derzelve wortel met zweet bedekt, zoo wordt zulks als een goed, doch indien zij tot aan het hoofd toe zeer koud zijn, als een nadelig teeken aangemerkt.

De neus moet bij gezonde dieren matig koud en vochtig zijn, en zoo wel als het slijmvlies eene frische roode kleur bezitten, daar indien dit hoogrood is, zulks ontfte-

steking, bleek zijnde, zwakte, en loodkleur: met zweren bezet, den kwaden droes aankondigt.

De mond en deszelfs deelen leveren de volgende teekenen op; een flap afhangende kenfchetst een gemeen ras, zwakte en week voeder; een opene, gebrek aan lucht of verstopping der neusgaten, en een geflotene krimp; terwijl indien dezelve inwendig droog, heet en rood is, dit sterke inwendige hitte, koud, bleek en vochtig, groote hevigheid in de koorts beteekent, en wan kleurigen stinkende zijnde, de dood voorspelt.

Vaststaande tanden zijn getuigen der gezondheid, zoo als derzelver uitvallen, van zwakte en hoogen ouderdom; rood, frisch, vast tandvleesch kondigt gezondheid; doch sponsachtig, flap, bloedig: ongesteldheid, zwakte en scheurbuik aan; zoo als hetzelfde en flecht voeder, door ingekrompen tandvleesch en nitwasfen aangewezen wordt; gekwerfte lagen leveren blijken van een flecht gebit en eene zware hand des ruiters op en zijn met verborgene beeneters gepaard, niet onbeduidend.

De tong, welke in gezondheid gelijke kleur als het overige des monds behoort te bezitten, moet zuiver, week, beweegbaar en van eene behoorlijke dikte wezen: daar eene drooge, zeer roode tong veel hitte en ge-
vaar

vaar in koortfen aanwijst, en indien dezelve bruin, hard en gesprongen is, het aanstaande vuur verkondigt: zoo als eene gezwollene bruine tong in keelziekten voor nabijzijnde verstikking doet vreezen: eenewitte vochtige koude tong voorfpelt gevaar: heet en met slijm bedekt, is zij een teeken van zinkingen en longontsteeking: walge-lijk warm, wit met roode streepen naar de keel, doet zij in koortfen een spoedig einde duchten, doch met blaren bezet en andere goede teekenen gepaart, eene onvolkomene of valsche beslissing te gemoet zien: voorts geeft eene opengebarste tong veel hitte; eene ingetrokkene krampen; eene uit- hangende zwakte te kennen; terwijl eene bevende in koortfen en besmettende ziek-ten, een kwaad teeken is, welke ongunstige teekenen des te bedenkelijker zijn naar mate zij zich nader aan het einde vertoonen.

Gezwollene keel- en kaakklieren beteekenen verkoudheid, en droes, en ver- raden kwaden droes wanneer zij vastzitten en slechts aan de eene zijde gezwollen zijn.

Eene naauwe borst ontdekt den aanleg tot ziekten van de werktuigen der ademhaling, als longtering, kortademigheid, (asthma,) en dampigheid.

Een opgetrokken buik en zijden kondigen tering, dampigheid, gebrekkige spijsverte- ring en voeding aan.

Kou-

Koude voeten, geven den aanval van koorts te kennen, welk teeken onbeduidend in ligte, doch gevaarlijk in zware ziekten is; terwijl indien zij het gevoel verloren hebben, zulks eenen spoedigen dood voorspelt: derzelver hitte geeft een plaatfelijk ongemak te kennen.

Gelijk sterkte in den staartkracht verkondigt, zoo is daarentegen wanneer dezelve slap afhangt, zich gemakkelijk laat draaijen of van het lijf verwijderen, zulks een teeken van zwakte en gezonkene levenskracht, terwijl voorts het kwispelen en slaan met dezelve in koortfen den naderenden dood verkondigt.

De huid welke in gezondheid behoorlijk zacht, buigzaam en vochtig behoort te wezen, kenmerkt indien zij hard, droog, stijf en vastliggende is, koorts, krampen, gebrekkige omloop in de uitwendige deelen, en met andere toevallen verzeld, een groot gevaar.

De haren welke in den staat van gezondheid by welgevoede en niet aan de koude blootgestelde paarden glad en glansrijk zijn, verkondigen ongesteldheid, wanneer zij deze missen en hunne kleur verliezen, ruw worden, over eind staan en verwarren; terwijl derzelver uitvallen in ziekte, verlamming der huidvaten en groote zwakte, doch daarentegen in gezondheid, welvaren en groei aanduiden.

De

De aars, en aarsdarm welke bij het gezonde dier gefloten is, verftrekt wanneer zij uitgezakt, flap, openftaande en eenig is mekeerd is, tot een teeken van zwakte, terwijl deszelfs uitzakking als gevaarlijk in koortfen vooral die met buikloop geaard zijn; als een doodelijk teeken in kolijk, doch minder bedenkelijk in andere ziekten befchouwd moet worden: voorts levert deszelfs beweging die het ademen verzelt, ook een teeken van dampigheid op.

Vlekken en builen welke vaak als een toeval, fomtijds als befliffing op de huid verfchijnen, beduiden fteeds groote verflapping en verwijdering der uitwafemende vaten, en mangel aan werkzaamheid van het bloedaderlijk ftelfel. Meest zijn deze builen befliffende, (kritisch) en vaak doodelijk wanneer zij in het begin der ziekte verfchijnen, minder zorgelijk op deszelfs einde wanneer zij goede etter en warmte bezitten, edoch fteeds gevaarlijk, indien zij met lucht gevuld en krakende zijn.

- 39 Niet minder belangrijk is het uitwendige gedrag van het dier gade te flaan, waarbij vooreerst deszelfs ftaan in aanmerking komt. Staat het paard moedig aan de krib, ziet het wild rond, zoo beduidt zulks eene ontftekings ziekte: mijmerend en flaperig: kolder en aanftaande razernij. Met den mond in de kribbe
ftaan-

staande: ontsteking der hersenen en de kolder; in den halfter hangende: -groote zwakte. Het schuiven met de borst tegen de krib, hetgene onbeduidend in de kolder is, beteekent in koortsen groot gevaar. Zet het paard den eenen of anderen voet vooruit: zoo beduidt zulks afmatting en geledene zware vermoeijensfen; met de vier beenen onder het lijf en eenen opgetrokken rug: aanval van koorts, en algemeene kramp, gelijk ook de klem wanneer de vier beenen stijf uiteen gesteld zijn; het wankelen op de achterbeenen is een kwaad teeken in koortsen; het wijd uiteen zetten derzelve, duidt gebrek in de nieren of piswerktuigen aan; gelijk het trappen met dezelve zonder te kunnen liggen: waterzucht der borst; het stijf staan met de voorbeenen: longontsteking; het stampen en schrappen met één voorvoet, koud en darmontsteking aanwijst.

Het gaan levert de volgende merkteekenen op: geschiedt zulks met vooruitgestokene stijve voorbeenen op de hielen, zoo kenmerkt dit vervangendheid, en wankelende op de achterbeenen: koorts; met hoog opgeligte beenen als of het paard door water moest baden, kolder en blindheid; terwijl, wanneer hetzelfde op alles aangaande niets schijnt te zien, zulks bewusteloosheid, ijelhoofdigheid en hevige koorts aan den dag legt.

Het liggen dat in gezondheid, eenen natuur-

tuurlijken toestand bewijst, verkondigt in ziekte eenen hoogen trap van ongesteldheid, en met magteloosheid gepaard, zoo dat het hoofd en de vier beenen liggen, een spoedig einde; het zitten op het achtergestel, wijst verrekking des ruggraads, buikpijn, darmontsteking en groot gevaar aan. Wanneer daarbij het hoofd in de linkerzijde gelegd wordt, vooripelt zulks in koortsen eenen spoedigen dood; is hetzelfde uitgetrekt, zoo kan men dit aan groote vermoeidheid toeschrijven; zijn de vier beenen nog onder het lijf geplaatst en wordt het hoofd nog omhoog gehouden, zoo is de toestand niet geheel hopeloos; edoch, het slaan met de beenen, het omwentelen, het opheffen en laten vallen des hoofds, zijn de naaste voorboden des doods.

Het opstaan geeft nog kracht te kennen, vooral wanneer het met gemak geschiedt, terwijl de hoogte van het gevaar door deszelfs moeijelijkheid, en de naderende dood, door het volstrekt onvermogen daartoe, aangekondigd wordt.

Het onvermogen tot liggen dat in longontsteking, opstopping van water, borstwaterzucht en hevige koortsen plaats heeft, verkondigt steeds gevaar; terwijl wanneer met vermindering der toevallen dit onvermogen ophoudt, men beterschap kan hopen, edoch wanneer dezelve toenemen en het paard zich nederligt, zoo is gewoonlijk de dood nabij.

Be-

40 Behalve deze kan men nog de volgende bijzondere ziekte teekenen opmerken :

Het uittrekken der bovenlip, geeft wormen, en in hevige koortsen den aanstaanden dood te kennen. Eet een paard liever van den grond dan uit de krib of ruif, zoo ver-raadt zulks kolder; Het zien in de zijde is een teeken van pijn, buikwee, darmontsteking, enz.; het wentelen, dat van dezelfde toevallen, en in gezondheid van huidjeukte. Het jeuken en schuren, dat van schurft en uitflag: terwijl wanneer de dieren met eenen voet naar eene plaats des lichaams slaan of naar dezelve bijten, zulks plaatselijke pijn aldaar te kennen geeft.

41 Onder de uitwendige kenteekenen, verstrekken hitte, klopping, zwelling, en somtijds koorts ten teeken van ontsteking. Eene gekwetste slagader, wordt door springend ligtrood bloed en zwelling aangewezen; het beenbederf, door zwarte dunne stinkende etter, ongelijk gevoel met de sonde, en langzame moeilijke genezing. Het koude vuur wordt aangekondigd door gevoel- en bewegingloosheid, zwarte en slappe huid, het uitvallen van het haar; voorts is de wond zeer gezwollen, de opperhuid (*epidermis*) met bla-zen bezet, en een zwart stinkend vocht ontlast zich in plaats van etter. Men ontdekt de

gewrichtkwaetsing door ongeneesbaarheid der wond en het lekken van het gewrichtsap of zoogenaamd ledewater, hetgene men daaraan onderkent, dat het, offchoon als helder water uitloopende, echter zoo dra het koud geworden is, in een gele gelei verandert, welke men ook in plaats van etter bij het afnemen van het verband op de kompresfen vindt.



TWEEDE AFDEELING.

De ziekten.

DE OORZAKEN EN ONDERSCHIEDING DER ZIEKTEN.

a. De oorzaken der ziekten.

42 **H**oezeer bij iedere in het vervolg afzonderlijk voorkomende ziekte kortelijk derzelver min of meer bekende oorzaken zullen opgegeven worden, kan het echter noch overbodig, noch onnoodig gerekend worden, eer wij tot deze overgaan, om met weinige woorden een kort algemeen overzicht van de oorzaken der ziekten te geven, waardoor in het vervolg de uitweiding over dezelve merkelyk zal kunnen verkort worden.

Eene algemeene, zoo wel als bijzondere kennis der oorzaken van de ziekten, (*aethiologia*) is onontbeerlijk voor een ieder die zijne geneeswijs met een goed, gelukkig en spoedig gevolg bekroond wil zien.

Niet altijd liggen de oorzaken der ziekten binnen het bereik onzer zinnen, edoch het blijft steeds pligt dezelve zoo veel mogelijk na te sporen.

• Verschillende zijn de bepalingen der geleerden omtrent hetgene oorzaak der ziekte genoemd kan worden.

Met vermijding van alle geleerde redekavelingen zij het hier genoeg, al datgene wat tot het voortbrengen eener ziekte bijdraagt, ziekte oorzaak (*causa morbi*) te noemen.

Men verdeelt de oorzaken in verwijderde, (*causa remota*) en in naaste oorzaak der ziekte, (*causa proxima*.)

De verwijderde oorzaken kan men weder in voorbereidende, (*causa praedisponentes*) en gelegenheids oorzaken, (*causa occasionales*) verdeelen.

De voorbereidende oorzaken worden ook aanleg (*seminium, praedispositio*) genoemd.

Deze aanleg kan een algemeene natuurlijke zijn, namelijk de vatbaarheid van ieder dier om ziek te worden, of een bijzondere natuurlijke, waardoor het eene dier boven het andere voor de eene ziekte meer vatbaar is, dan voor de andere; en eindelijk eene tegennatuurlijke, wanneer er in het ligchaam reeds eene gebrekkige wijziging bestaat, die door de geringste oorzaak in ziekte overgaat.

Het behoeft geen betoog dat deze voorbereidende oorzaak eene inwendige, of in het ligchaam gelegene is, terwijl de gelegenheidsoorzaken tot de uitwendige

ge moeten gebragt worden, daar zij buiten het ligchaam gelegen zijn, en alleen door van buiten op hetzelfde werkende, ziekten te wege brengen.

Tot de uitwendige of gelegenheids oorzaken brengt men de zes volgende zaken, die wel eens hoe wel oneigenaardig de zes niet natuurlijke dingen (*sex res non naturales*) genoemd worden, zij zijn: i. de lucht, ii. voedfels en dranken, iii. beweging en rust, iv. flaap en waken, v. ontlasting der in het ligchaam aanwezige stoffen, als de afgang, pis, enz. vi. de hartstogten.

Aanleg en gelegenheids-oorzaak moeten zich vereenigen om eene ziekte voort te brengen; waar de eerste niet is, wordt de laatste onwerkzaam, en wanneer de laatste ontbreekt, blijft de eerste onopgewekt.

Onder naaste oorzaak, verstaat men diegene welke het ontstaan der ziekte onmiddelijk voorafgaat, en met dezelve op het naauwste is verbonden, zoo dat zij volgens sommigen, met het wezen der ziekte één en hetzelfde is, en zij weggenomen zijnde, de ziekte ook met haar ophoudt.

Na dit vooraf gezegd te hebben, zonder in verdere bijzonderheden, of liever gisflügen omtrent de naaste oorzaak te willen treden,

zal het niet onbelangrijk zijn ieder der zoogenaamde zes niet natuurlijke zaken nog eens kort, doch afzonderlijk te beschouwen, en met een enkel woord, zoo wel den aanleg als de gelegenheden-oorzaken te gewagen.

- 43 Zeker is het dat onder dezelve, de lucht, en het verblijf, de behandeling, en het voedsel, de gezondheid in meer dan een opzigt kunnen storen, wanneer het te gengestelde bij dezelve plaats grijpt, van hetgene door de gezondheidskunde gevorderd wordt.

De lucht versprekt tot oorzaak van ziekte wanneer warmte of koude, droogte en vooral vochtigheid haar van dien toestand doet afwijken welke voor het dierlijke leven het heilzaamste is, of dat eene scheikundige vermenigting met gassoorten of smetstoffen haar eenen nadeeligen invloed op de gezondheid doen verkrijgen.

Met haar staan hemelstreek en landsgefteldheid in de naauwste betrekking; niet alleen hebben de beide uitersten van te groote hitte en te strenge koude, den nadeeligsten invloed op de volkomenheid van de rasfen der paarden, die men alleen onder een gematigde hemelstreek als zoodanig ontmoet, maar de overgang van deze in eene van beide ja zelfs in iedere merkelyk verschillende, mist
zel-

zelden eene oorzaak tot ziekte op te leveren. Geen minder invloed heeft de landstreek op de gezondheid: hooge bergachtige en drooge landen verleen den dieren meer gezondheid, sterkte en vlugheid, dan lage, moerasfige, boschachtige en aan den zeekant gelegene streken; die der eerste plaatsen zijn het meeste aan ontstekings-ziekten en die van de ademhalings-werktuigen onderhevig; in lagere landen zijn ongemakken der voeten, oeggebreken, en ziekten met verminderde levenskracht de heerschende; terwijl de boschachtige streken en zeekusten, door het gure, veranderlijke en vochtige weder eenen bijzonderen aanleg tot zinkingachtige en rheumatieke toevallen te wege brengen.

Door afwijking van de vereischte eigenschappen kunnen de verblijfplaatsen niet alleen dezelfde nadeelen als hierboven vermeld zijn, maar door eenen gebrekkigen aanleg, ook onderscheidene toevallen veroorzaken.

De behandeling die de huisdieren in den getemden staat ondergaan en het gebruik dat in dezen zoo zeer van hunne levenswijze in dien der natuur afwijkt, opent eene ruime bron van vele ziekten, het zij dat men hen door kwalijk geplaatste zorg verteenert, en daardoor tot alle ziekten van ontsteking en gestremde uitwaseming voorbereidt, of hen in tegenoverstelling hiervan, door ver-

waarloozing der zuiverheid, aan huidziekten, zoo als ook door ten onpas baden en schielijke verkouding na verhitting, aan ontstekingsziekten blootstelt.

Even nadeelig is te veel rust en arbeid; De eerste verzwakt de levenswerkzaamheid des dierlijken gestels, waardoor alle ziekten van gebrekkige spijsvertering, gestremden omloop der vochten en der afzonderingen voortgebracht worden.

Te sterke inspanningen en te lang durende vermoeijenissen putten daarentegen de levenskracht te zeer uit en doen het dierlijk en werktuigelijk gestel voor den tijd verslijten; terwijl door deze beide uitersten des te nadeeliger gevolgen voortgebracht worden, naar mate dezelve spoediger onderling afwisselen.

De tot voedsel verstrekkende spijs en drank kunnen zoo door onevenredigheid, soort en eigenschappen, als door hunne toedeeling aanleiding tot onderscheidene ziekten geven.

Overmaat van voedsel ongeëvenredigd aan den ouderdom, gestalte en werkzaamheden van het dier, brengt den aanleg te wege tot alle ziekten die de werktuigen der spijsvertering aandoen; terwijl te weinig daarentegen tot de noodige voeding des ligchaams te kort schiet en tot oorzaak van alle ziekten uitzwakte verstrekt.

Niet

Niet alleen door het ontijdig en overmatig toedeelen, zoo wel van het groene als drooge voeder en water, maar ook door hunne flechte hoedanigheden, worden eene menigte ziekten te weeg gebragt.

Deze oorzaken liggen veelal binnen onzen gezigtsskring, zoo wel als de middelen tot derzelver wegruiming, en dus tot de geneeswijs der door haar aangetaste paarden, weshalve derzelver nasporing van het uiterste belang is.

Niets is uit dien hoofde nuttiger dan die der voorafgaande levenswijs des paards; dezelve leert ons dat bij op stal staande, met droog en genoegzaam voeder onderhoudene paarden, bij eene drooge lucht- en landsgesteldheid, zoo in de garnisoenen als na het verlaten der kantonnementen, in den winter en het voorjaar, de meeste sneleindigende ziekten, van eene verhoogde levenskracht, of een ontstekingsachtig karakter getuigen, en dat daarentegen, vooral na het eindigen van eenen veldtocht, het uitstaan van veel vermoeijenis en gebrek, in het najaar, in vochtig weder en landstreek, de meeste, vooral slepende ziekten van eene verminderde levenskracht, verzeld gaan.

Krachtdadige hulp vereischen de toevallen die door de verhinderde ontlastingen en afzonderingen, of gestremde uitwaseming worden te weeg gebragt, als ook die hunnen oorsprong ontleenen uit de te over-

vloedige uitwaseming, ontlastingen en afzonderingen.

44 Ten eenemaal buiten onze magt is het zonder hulp der genees- of heilkunde, de zoo in als buiten het ligchaam gelegene oorzaken te verwijderen of onschadeijk te maken, welke, het zij scheikunftig of werktuigelijk in hetzelfde vaak de grootste verwoestingen aanregten.

Onder de eerste welke scheikundig eenen nadeeligen invloed op het ligchaam uitende, het dierlijke gestel op eene geweldige en het levensbeginfel aantastende wijze, aandoen, verdient in de eerste plaats, de ziekten smetstof gerekend te worden, als de gewoonlijkste, welke in heerschende (epidemische) ziekten gelijksoortige dieren algemeen aantast, of in besmettelijke slechts enkele treft, die aan hare onmiddelijke mededeeling blootgesteld zijn; het zij dat zulks met of zonder aansteking, door eene zichtbare stoffe, of op eene buiten het bereik der zinnen gelegene wijze geschiedt. Het is aan haar dat alle heerschen- de en besmettelijke ziekten, de droes, de kwa- de droes, de worm, de schurft, enz. hunnen oorsprong verschuldigd zijn.

Sneller en zichtbaarder werken de vergiften op het dierlijk ligchaam, het zij dezelve uit het delfstoffelijk rijk oorspronkelijk zijn,

zoo als het rattekruid, kwik, lood, koper, enz. welke de hevigste ontstekings-toevallen veroorzaken, of dat zij tot het groeistoffelijk behooren, gelijk de kerslaurier, nachtschade, wilde kervel, taxis, enz. die door plotselinge verftoring der aandoenlijkheid, (*sensibilitas*) meestal verdoovend werken, terwijl de dierlijke giften, van welke de dodelle honds- en adderbeet de voornaamste zijn, angst, verlamming, ftuipen of razernij te weeg brengen, die door eenen snellen dood gevolgd worden.

Werktuigelijk veroorzaken in het ligchaam, de darm-, gal- en blaasfteenen, als ook de onderscheidene foorten van wormen, door hunnen prikkel allerhande krampachtige en ontstekings-toevallen; terwijl uitwendig, de beschadigingen, door wonden, kwetfingen en verrekkingen veroorzaakt, als onmiddelijke oorzaken, de ftoring van den ftaat van gezondheid kunnen te wege brengen.

- 45 Te regt kan men als voorbereidende en tot de verwijderde oorzaken behoorende, dien aanleg of vatbaarheid tot ziekte beschouwen, welke te gennatuurlijk door oorspronkelijke of aangeborene gebrekkige vorming voortgebragt wordt, of aan de onderscheidene leeftijden, geflachten en bijzonderheden eigen is, en dezelve eenen bijzonderen

ren. natuurlijken aanleg daartoe mededeelt.

- 46 De gebreken der vorming, (organisatie) zijn of erfelijk van de ouders voortgeplant, of oorspronkelijk aangeboren, en uit de vorming en gestalte des diers ontspruitende; dus brengt een te gebogen hoofd, eenen aanleg tot kolder voort; eene smalle borst, platte ribben en opgetrokken buik: eene belemmerde ademhaling en spijsvertering; dus is eene zwakke spijsvertering de grondoorzaak van het kribbenbijten enz. Voorts kunnen dezelve bestaan uit tegennatuurlijke vergrotingen, aangroeiingen en veranderingen der deelen, die eene oorzaak tot ziekte opleveren; daarenboven kunnen deze gebreken der vorming verworven zijn, wanneer zij na eene ziekte overblijven of aan dezelve hun bestaan te danken hebben, b. v. volvoetigheid die na vervangenheid overblijft, beenuitwassen, als: spat, overhoeven, enz. die vaak na rheumatische toevallen volgen, verstrekken tot oorzaken van kreupelheid; verhardingen en vergroeiingen der long na borstontstekingen, brengen kortademigheid voort; even zoo blijft vaak na eene pas genezene ziekte, de neiging tot instorting in dezelve over. De meeste dezer oorspronkelijke of vormingsgebreken stellen de geneeskunst te leur, of ten minsten op eenen harden proef, wanneer zij hare wegruiming wil beproeven.

b. De

b. De onderscheiding en verdeeling der Ziekten.

47 Niet minder belangrijk dan de algemeene beschouwing van de oorzaken der ziekten is die van hun onderling wezenlijk onderscheid, daarderzelve naauwkeurige herkenning den grootsten invloed op het gelukkig slagen in hunne genezing heeft. Zal echter deze kennis volledig zijn, zoo behoort zij ook met die van het toevallig onderscheid dat plaats zoude kunnen hebben, gepaard te gaan.

Offchoon, zoo wel de minder van den staat der natuur verwijderden toestand des diers, als onze veelal nog duistere kennis van den invloed van sommige toevallige onderscheidingen op deszelfs ziekten, deze in de veeartsenijkunde, binnen eenen naauweren kring beperken, vermag men dezelve echter evenmin geheel over het hoofd te zien als door eene te breedvoerige uitweiding in de kleinste bijzonderheden, zich aan eene ondoelmatige wijdloopigheid schuldig maken.

48 Ten einde in dezen eenen gepasten middelweg te houden, zullen wij ons in de eerste plaats bepalen met die toevallige onderscheidingen op te noemen wier bestaan buiten twijfel is, en in de tweede, om eene voor de algemeene vatbaarheid berekende aanwijzing te geven van de zoodanige, die in de ziektekunde des diers even als in die van den mensch

thans

thans meer ontwikkeld en met nut op dezelve toegepast kunnen worden.

- 49 Tot de eerste wier bijzondere uitwerkingen ons minder bekend zijn, kan men rekenen die onderscheidingen welke uit de verschillende leeftijden, levenswijze, geslachten en jaargetijden ontleend zouden kunnen worden.
- 50 Terwijl men in de tweede plaats de ziekten volgens derzelve toevallig onderscheid kan verdeelen.
- 51 Naar het getal der aan ziekten lijdende voorwerpen: in heerschende (epidemische) ziekten: (*morbi epidemici, epizootici*), wanneer gelijktijdig een aantal dieren door dezelve aangetast worden of dat men dezelve aan eene algemeene oorzaak kan of moet toeschrijven, in afzonderlijk voorkomende (sporadische,) *m. sporadici*), ingeval slechts enkele voorwerpen en niet door algemeene oorzaken aangedaan worden; waartoe nog de tusschenloopen de ziekten (*m. intercurrentes*) kunnen gebragt worden, die offchoon zij op zich zelve staan, echter den invloed der heerschende ziekte gevoelen.
- 52 Ten opzichte van hunnen oorsprong (*ab ari-*

origine) zijn de ziekten erfelijke (*hereditarius m.*) indien zij bij de voortteling en gedurende de dragt op de vrucht overgaan, of wel verkregene (*m. acquisitus*), wanneer zij naderhand op eene of andere wijze verworven worden.

53 Voorts zijn dezelve enkelvoudig (*m. simplex*) of zamengefteld (*m. compositus s. complicatus*), van welke eerste, vele der heekundige gebreken voorbeelden opleveren, terwijl de inwendige ziekten meer der tweede aanbieden.

54 Naar de plaats, zijn zij algemeen (*m. universales*), wanneer zij op het geheele ligchaam gelijktijdig en gelijkvormig werken, of plaatfelijk (*locales*) indien de voornaamste toevallen meer een enkel deel aandoen.

Hiertoe kunnen ook de uitwendige (*externi*) en de inwendige (*interni*) gebragt worden, waarvan de eerste hoofdzakelijk het onderwerp der heekunde laatste die der geneeskunde uitmaken.

55 De toevallen doen hen onderscheiden, in zoodanige waarin de ziekte en hare toevallen eenen zetel hebben, (*m. idiopathici*) en in die, waarin eene ziekte als toeval er zich bij voegt (*symptomatici*).

- 56 Volgens hunne mededeeling in: besmettende (*m. contagiosus*), wanneer zij zich in hetzelfde kenmerk aan andere mededeelen, en in niet besmettende, het zij door middelijke of onmiddellijke gemeenschap.
- 57 Zij worden voorts verdeeld naar den tijd of langdurigheid: in heete of snel eindigende (*m. acuti*), wanneer zij in korten tijd, als in dagen, weken, ten hoogste binnen eene maand eindigen, en in slepende (*m. chronici*) indien dit tijdvak onbepaald blijft.
- 58 Voorts doet de afwisseling de ziekten onderscheiden, in aanhoudende (*m. continui*) welke zonder verandering voortduren; in afgaande (*m. remittentes*) met tusschentijden van beterschap; in wisselende (*m. intermittentes*) met uitblijvende poozen en toevallen, en periodieke (*m. periodici*) waarin dezelve na vaste en bepaalde tijden terugkeeren.
- 59 Naar de werking der levenskracht: in die van vermeerderde (*m. activus, synocha, sthenicus*) en in verminderde (*m. passivus, typhus asthenicus*).
- 60 Eindelijk volgens derzelver uitflag in: geneesbare (*sanabiles*); ongeneesbare (*insanabiles*); terugkomende (*recidivus*) en doodelijke (*lethalis*). Ten

61 Ten laatste besluiten wij de bovenstaande onderscheiding der ziekten, met die der onderscheidene tijdperken die in deze zelve worden waargenomen en ten getale van vijf voorkomen, als:

a) Het begin (*initium*) der ziekte, wanneer derzelver eerste toevallen zich openbaren.

b) Het toenemen (*incrementum*) wanneer deze gedurig toenemen.

c) De stand (*acme*) wanneer zij naar den aard der ziekte den hoogsten trap bereikt hebben.

d) Het verminderen der toevallen (*decrementum*) wanneer zij in dezelfde evenredigheid weder afnemen volgens welke zij toegenomen zijn.

e) Derzelver einde (*finis s. reconvalescentis*), indien niet alleen de ziekte maar ook de staat der zwakte door den vorigen trap van gezondheid vervangen wordt.



E E R S T E H O O F D D E E L .

Ziekten welke bijzonder het gestel der opslorpende vaten aandoen.

De ziekten welke men bijzonder onder deze afdeeling kan rangschikken, zijn: de gewone droes in deszelfs verschillende trappen, de kwade droes en de worm.

E E R S T E A R T I K E L .

De droes.

62 **O**nder de ziekten waaraan het paard onderhevig is, kan men de droes als eene dergene aanmerken welke hetzelfde het menigvuldigste aantasten, en hoezeer dezelve door onderscheid in trappen, zamenvoegingen en toevallen een verschillend karakter schijnt aan te nemen, verdient het gevoelen dier geneeskundigen als het waarschijnlijkste aangemerkt te worden, welke de droes als eene zinkings- (catharrale) ziekte beschouwen, wier verschillende trappen aanleiding gegeven heeft, dezelfde kwaal onderscheidene benamingen te ge-

geven , en ze in verkoudheid , goedaardige , boosaardige , verplaatste en verdachte droes te onderscheiden , welke laatste zeer nabij aan den kwaden droes grenst.

63 De oorzaken aan welke deze kwaal haar aanwezen verschuldigd is , zijn in de eerste plaats : verkoudheid , verandering van weder , flecht voeder , deszelfs verandering en de te schielijke verwisseling van groen en droog voeder , voorts aansteking , flechte stallingen , verwaarloosde oppassing en behandeling.

64 De geringste trap van droes is de verkoudheid (*coryza*) (*morfondure*) kenbaar aan matheid , doffe oogen , ontbrekenden eetlust , en de ontlasting van een waterachtig vocht uit den neus , dat na drie of vier dagen , slijmerig en wit wordt , gepaard met een weinig koorts ; terwijl het neus - slijmvlies zich ontstoken ver- toont.

65 Een hooger trap is de gewone of goedaardige droes , (*morbus glandulosus benignus* (*la gourme*) ; welke gewoonlijk alle paarden moeten doorstaan , bevorens hun vijfde jaar te bereiken , offchoon zij van denzelven ook op alle andere levenstijden aangetast kunnen worden , en welke , wanneer hij geene zamenvoegingen heeft , bij eene doelmatige be-

68 ZIEKTEN DER OPSLORPENDE VATEN ,

handeling , zeldzaam van noodlottige gevolgen is.

66 Deszelfs gewone kenteekenen zijn : dat de kaak-, keel- en fomtijds de oorklieren zwellen , bij welke zwelling , indien zij door eene gepaste behandeling niet verdeeld wordt , de onderkaakklieren in ettering overgaan , en in zes of acht dagen rijp wordende , zich door de kunst of de natuur geopend , van de daarin opgehoopte stof ontlasten ; Deze klieren zijn voorts vlak , week en pijnlijk ; de oogen gezwollen en heet , het slijmvlies is meer ontstoken en de koorts sterker dan in de verkoudheid , terwijl de ontlasting der slijm uit de beide neusgaten geschiedt ; al deze toevallen verminderen met de ettering , met welke de witte ontlasting steeds dunner en waterachtiger wordt , en eindelijk geheel ophoudt.

67 De merkteekenen van den toestand der ziekte zijn : dat hoe lager het hoofd hangt , hoe meer het bewustzijn ontbreekt , hoe sterker de ontfeking der hals en des monds is , en zoo de ontlasting van den neus aschgrauw , groenachtig , en de etter dun en waterachtig wordt , des te zorgelijker is de staat des diers te beschouwen ; daarentegen zijn als gunstige teekenen aan te merken : eene dikke boterachtige vochtigheid in de ooghoeken , welke beterschap

aan-

aankondigt; zoo als ook de dikke reukelooze ontlasting uit de neusgaten, terwijl zelfs de heete pijnlijke dikte der klieren zonder nadeelige beduiding is.

68 Daar het in deze ziekte, tot regeling van derzelver geneeswijs van zeer veel gewigt is hare kenmerken te onderscheiden, zoo dienen de volgende merkteekenen wel opgemerkt te worden, die dezelve aanwijzen:

Ontsteking, kondigt zich aan door een voorafgaand sterk rillen, eenen slependen gang met hangend hoofd, bezwaarde ademhaling, uitademing van heete lucht, grooten dorst, en hitte in den mond, vurige drooge oogen, snellen harden pols, donkerbruine doorschijnende pis, en harde kleine mist.

Het ro t a c h t i g e karakter wordt gekenmerkt door de brandende hitte der huid, door eene donkerroode tong en gehemelte, eenen zeer stinkenden adem, taai, smerig, stinkend speeksel, en de met slijm overtrokkene, in groote ballen gevormde, stinkende mist.

Het z e n u w a c h t i g e (*status nervosus*) door eenen kleinen, snellen, (*frequens*) zwakken pols, benaauwd ademhalen, gevoel- en bewusteloosheid, door bijna geflotene oogen, strakke of opgehoudene pis, koud zweet en klamme huid, kleine huid- en sterkere spiertrekkingen.

Het kenmerk dat uit ongesteldheid

70 ZIEKTEN DER OPSLORPENDE VATEN,

der i n g e w a n d e n deszelfs zamenvoeging ontleent, herkent men aan de ontlastingen, als aan finerig vaak stinkend speeksel, eene vuile tong, eenen opgezette buik, aan winden, slaperig-en loomheid, verstopping of onverteerden afgang, doorloop, ondoorschijnende taaije pis. Terwijl men de r h e u m a t i e k e droestoevallen aan stijfheid der leden, het zwellen der huid, en gezwellen aan de beenen, de teeldeelen en het hoofd herkent.

69 Bijzonder zijn deze en de verdere zamenvoegingen en toevallen eigen, aan den d e r d e n trap vanden droes welke deswegens de b o o s a a r d i g e (*m. gland. malignus*) genaamd wordt, en veelal daardoor ontstaat, dat de goedaardige niet wel behandeld of verzuimd is geworden, alsmede door veranderlijkheid des weters, of eene bijzondere voorafgaande lichaamsgesteldheid.

70 Vaak eindigt dezelve ongunstig, en gaat in long-, keel- en hersenontsteking, klierverhardingen, borstwaterzucht, leggers, mok, rotstraal en kwaden droes over.

Dezelve wordt aangekondigt door meerdere koorts, pijnlijke en meer gezwollene klieren, grotere benaauwdheid in het ademen, dikke hooggele, etterige ontlasting uit den neus, verstopping en langeren duur der ziekte dan twintig dagen, waarmede zich vaak nog andere toevallen paren.

Die

71 Die met ontsteking der long verzeld gaat, kent men aan het uiteen zetten der vóórbeenen, weinige liggen, snel, kort, weinig'en benaauwd inademen, aan den harden pols, de dosse tranende oogen en hevigen dorst, waar bij de mond weinig vochtig, en de neus steeds droog is; voorts aan het bestendig gezwollen blijven der keelklieren, en de ontlasting van dikke en weinige bruine pis.

Bij keelontsteking is het hoofd met den hals iets vooruitgestoken; het ademen benaauwd, het slikken moeilijk of onmogelijk.

De hersenontsteking wordt door zinneloosheid, gevoelloosheid, wildheid, staren-de oogen en andere soortgelijke kenmerken aangewezen.

72 Behalve deze toevallen welke dezelve door verplaatting van den hoofdzetel der ziekte op de levenswerktuigen den naam van verplaatsten droes, (*morbus glandulosus vagus*) heeft doen ontvangen, en welke daardoor gewoonlijk aangekondigd wordt, dat de ontlasting uit de neus eensklaps vermindert of geheel ophoudt, en de gezwollene klieren niet tot rijpheid komen, brengt zelfs de verzuiming van den goedaardigen droes, vaak eene borstwaterzucht voort, die maar al te vaak doodelijke gevolgen heeft.

- 73 Eindelijk bestaat er nog eene soort van droes onder den naam van o m z w e r v e n d e d r o e s, (*rheumatismus asthenicus sive passivus*) bekend, kenbaar behalve andere toevallen aan gezwellen op onderscheidene plaatsen, en welke in de afdeeling van het rheumatismus nader behandeld zal worden.

Gelukt het niet de klieren te verdeelen of tot etteren te brengen, duurt de ziekte een aanmerkelijk langeren tijd dan tot deszelfs gewone beflissing vereischt wordt, en bevordert de luchtsgesteldheid de ontbinding der vochten, zoo wordt de ziekte als eene v e r d a c h t e d r o e s, (*morbis glandulosus suspectus*) beschouwd, welke vaak als de eerste trap van den kwaden droes is aantemerkten.

- 74 Wat de g e n e e s w i j s van den droes betreft, zoo behoort daarbij deszelfs oorzaken, trappen en zamenvoegingen in overweging te worden genomen.

Het eerste dat men te doen heeft, is, dat men even als in alle andere ziekten, indien men de o o r z a k e n kent, deze pogen weg te nemen, om ze in hunne gevolgen onschadelijk te maken, en niet alleen het doordenzelven aangetaste paard van andere afzondere, maar ook alle voorzorgen in het werk stelde om deszelfs verbreiding voor te komen

Ontstaat dezelve uit slecht voeder, vooral hooi,

hooi, zoo geve men stroo, en tot drank melklaauw haverwater.

Is dezelve aan de verandering van voeder te wijten, zoo moet, indien het paard in de wei de gebragt was, hetzelfde weder op stal gezet worden; is de oorzaak aan verkoudheid toe te schrijven, zoo plaatse men het in een warmer stal, en dekke het des winters, hetgene echter des zomers schadelijk is; is bedorvene stallucht de oorzaak der ziekte, zoo doe men het eene betere inademen.

- 75 De eerste trap van den droes of de verkoudheid, en zelfs een ligte droes, vereischt voornamelijk dat men de natúur niet tegenwerkt, maar haar alleen door eene doelmatige behandeling ondersteune in de pogingen welke zij tot ontlasting aanwendt, welke hulpmiddelen vooral in eenen gepasten leefregel bestaan; hiertoe behoort, dat men het paard in een matig getemperde togtvrije stal plaatst, het voor verkouding bewaart, en bij goed warm weder eene matige beweging doe verrigten, zonder het in het minste te verhitten; men wrijve het met stroowisfen en wollen doeken, en doe het warme dampen inademen; men geve in plaats van haver, meeldranken (1) of zemen,
- E 5

(1) De voedende meeldranken kunnen uit haver- of gars-tenmeel, waarop kokend water gegoten wordt, bestaan, welke tevens eene voedende eigenschap bezitten, terwijl men, indien zulks minder noodig is, van tarwe-zemelen tot hetzelfde einde gebruik kan maken.

len en stroo in plaats van hooi, terwijl men als eenen algemeenen regel behoort aan te nemen, om in alle droefige ziekten, het paard nimmer koud water, maar steeds zoodanig tot drank te geven, dat door bijvoeging van een weinig warm zulk eene tempering heeft aangenomen, dat het nimmer door koude, als eenen nadeligen prikkel, werken kan.

Bereikt echter deze ziekte eenen hooger trap, zoo gebruike men de ontstekingswerende middelen, (*antiphlogistica, s. temperans*) bestaande, behalve in de boven aangeprezen dampbaden, in het gebruik van enkelen honig-azijn met salpeter, (of n°. 1.) waarna men tot herstel der verzwakking van het slijmvlies, de uit spiesglans- en staalmiddelen, alantwortel, watervinkel, enz. bestaande middelen (n°. 2, 3 en eindelijk n°. 8.) ingeeft.

76 In den goedaardigen droes moet men in de eerste plaats de gezwollene klieren trachten te verdeelen, en tevens de ontlasting uit den neus te bevorderen: men houde hiertoe het paard matig warm, en bedekke de keel met eene schapenvacht, terwijl men de verdeeling door het inwrijven van zeep- en ammoniak-geest, kwikzalf, (*ung. oxyduli hydrargyri*) en vooral door het zetten van een dragt ter zijde van den hals, zoekt te bewerkstelligen; mislukt zulks, zoo moet men zoo spoedig mogelijk

lijk de klieren tot ettering en rijpheid pogen te brengen, waartoe men ze met reuzel, lijnolie of althea-zalf smeert, en warme omflag en van lijnzaadmeel en melk gekookt, op dezelve legt, vooral wanneer zij zeer pijnlijk en gezwollen zijn.

Tot bevordering van het tweede oogmerk, namelijk dat der neusontlasting, is de inademing van warme dampen, (2) het drinken van laauw haverwater met keukenzout, of honig met 1 of 2 oncen salpeter, gepaard met verzachtende lavementen, (3) ingeval van verstopping, allerheilzaamst; kunnende men, ingeval deze neusontlasting niet behoorlijk volgen mogt, daarbij van de voorschriften n°. 1. en 2. *a. b.* gebruik maken, welke vooral wanneer de droes van een ontstekingsachtig karakter is, dienstig zijn; terwijl ingeval dezelve geenen ongunstigen uitflag voorspelt, men in de lente of den vóór-zomer het paard met vrucht in de weide kan zenden.

In het algemeen ga men spaarzaam en oordeelkundig met aderlatingen en purstatien in den droes te werk, daar dezelve vaak de natuur in hare pogingen tot genezing in den weg staan

(2) Van gekookt hooizaad, vlierbloemen enz. in een emmer met water, die men het paard, een wollen deken omhangende, doet inademen.

(3) Van zemelwater met zeep en keukenzout.

staan, door de heilzame ontlasting te storen, zijnde dan vooral alleen eene kleine lating met veel omzigtigheid aan te raden, wanneer ontstekingstoevallen van edele deelen, met een onmiddelijk levensgevaar dreigen. Wanneer dus de droes eenen hooger trap bereikt, de koorts fierker wordt, en vrees voor ontsteking der longen of andere levenswerktuigen doet geboren worden, zoo moet men dezelve zoodanig behandelen als de aard dezer bijzondere toevallen vereischt: zoo door aderlatingen, dragten, dampbaden, als het inwendig gebruik van n^o. 2. b. en 7., voorts wanneer de klieren nabij het strottenhoofd of die der ooren (de vyvels) sterk gezwollen zijn, deze zoeken te verdeelen door het opleggen van een handvol hennip in goede houtasche gekookt, en zulks zoo vaak herhalen als het middel koud wordt.

- 77 In den boosaardigen droes, komt vooral deszelfs oorzaak en karakter in aanmerking; zijn de toevallen aan ontsteking toe te schrijven, welke haren oorsprong meestal uit koude of het voederen van te veel granen ontleent, is daarbij dezelve hevig, en het gevaar van stikken groot, zoo kan men zich tot het doen eener aderlating verplicht vinden, 'en vooral niet verzuimen een dragt voor de borst te zetten, dat bijna in alle gevallen de verplaatfing der ziekte voorkomt, als ook het gebruik van

van warme omflagen en dampbaden; men geve tot bevordering der neusontlasting n°. 6. a. voorts n°. 2., en is de ontsteking aanmerkelijk n°. 4., vooral in het pisdrijvend afkooksel n°. 5., en daarbij haverwater met keukenzout, of salpeter met honig te drinken, men zette van tijd tot tijd lavementen, met welke men ophoudt, wanneer eenige ontspanning komt, de afgang zich in groote mistballen ontlast, en de oogen en mond minder droog worden, gelijk men alsdan mede de meeldranken zonder zout moet geven, en overgaan kan om het kamfer met lijnzaad-kooksel toe te dienen. (4)

Geeft de droes eene neiging tot ontbinding der vochten te kennen, zoo moet men de middelen tegen rotkoortsen voorgeschreven, met slijmerige gepaard geven.

Bij zenuwachtige medewerkende oorzaken, gebruike men dadelijk specerijachtige vlugge middelen, (n°. 9. of 21. c.) en krachtig haver-nat met wijn of brandewijn vermengd.

Wanneer men eene verzwakte levenskracht en ingewanden bespeurt, zoo moet men volstrekt tegengesteld als bij ontsteking handelen; het

(4) Vooral kan men met vrucht van het zamenvoegsel van kamfer en salpeter gebruik maken, in het tijdstip dat de overgang uit den staat van spanning (*sthenie*) tot dien van zwakte (*asthenie*) nog niet volkomen gekenmerkt zijnde, eene bijzondere omzigtigheid in de behandeling der ziekte vordert.

- het aderlaten, de buikzuiverende middelen, vooral van middelzouten en het gebruik der weiden zijn dan vaak doodlijk, terwijl men in verstopping alleen van lavementen gebruik maken, en bij beterschap geen hooi maar gekookte haver en garst voederen moet.

57 De verplaatste droes welke zich op eenig deel werpt, eischt dezelfde behandeling als de boosaardige, en men moet daartoe, zoodra men de verplaatsing bemerkt of weet, n°. 4. en 5. geven, terwijl in de daardoor veroorzaakte borst-waterzucht, het purper vingerkruid (*herb. digitalis flores purpureæ*) van 4 tot 8 grein dagelijks gegeven, getoond heeft, heilzame gevolgen voort te brengen, wanneer het gepaard met het zetten van dragten bij tijds aangewend wordt

Wanneer de droes deszelfs gewone zetel verlatende, zich op de ledematen verplaatst, en de daardoor veroorzaakte toevallen, zich of als een rheumatismus aankondigen, of hier en daar builen veroorzaken, zoo wordt eene bijna gelijkvormige geneeswijs vereischt, als wegens den boosaardigen droes voorgelchreven is; terwijl men in alle gevallen deze gezwollen door een dragt, gedurende vier of zes weken op derzelver plaats moet trachten te houden, en indezen zoogenaamden omvliegend den droes, n°. 10. ingeven.

Ver-

79 Vermeerderen de toevallen in den droes, en is de uitwerping uit den neus sterk, zoo ga men tot het gebruik van het versterkend middel n°. 8. over, terwijl men naar mate de ziekte en ontsteking vermindert de hoeveelheid haver moet vermeerderen, en deze tot dat het paard volkomen hersteld is, gemalen voederen; gelijk het ook raadzaam is hetzelfde gedurende den geheelen loop der ziekte, matig warm te houden, en indien het van dezelve veel geleden mogt hebben, gedurende eenigen tijd van sterke vermoeijenisfen te verschoonen.

80 Blijft na dezelve een hoest over, zoo beware men het voor koude en togt, geve het inwendig gezwavelde kwik, (*æthiops mineralis*) en bij verzwakking der verteringswerktuigen n°. 3 of 22. b.

T W E E D E A R T I K E L.

De kwade droes.

81 De kwade droes, (*malleus humidus, vitium scrophulosum contagiosum*) *la morve*) is eene aan het geslacht der paarden bijzonder eigene ziekte, welke zoo door hare besmettelijkheid als de weinige hulp welke de geneeskunst tegen dezelve aanbiedt, ten uiterste geducht is, hetgene derzelve kennis, zoo
vol-

volgens deszelfs aard als trappen, ten uiterste belangrijk maakt, op dat men hierdoor geleid geen paard, waarbij dezelve wezenlijk plaats heeft, tot een middel van aansteking voor andere doe verftrekken, en noodeloze onkosten tot deszelfs herftel beftede, en aan de andere zijde, geene naar dezelve zwemende toevallen als den kwaden droes verkondigende, befchouwe, en eene geneesbare ziekte als onheelbaar verwaarlooze.

82 De o o r z a k e n dezer ziekte moeten gezocht worden in befmetting, te fterk voeder, verlies van vochten door ten onpas en overbodig aderlaten en purgeren, door den loop, langdurig etterende ongemakken en huidziekten, zwakte der verteringswerktuigen, belette uitwafeming, verandering van weder, gebrek en flecht voedsel in veldtogten, kwalijk behandelde en verwaarloosde droes, enz. terwijl deszelfs z e t e l in de klieren, en bijzonder in die van het flijmvlies van den neus gelegen is, offchoon het geheele geftel der opflorpende vaten er van aangedaan fchijnt te worden.

83 De k e n t e e k e n e n verfchillen naar de drie trappen of tijdperken die deze kwaal gewoonlijk doorloopt. In de e e r f t e is het flijmvlies vooral aan het middelfchot vurig rood, één der neusgaten ontlast eerst een dun wit, daarna een bleekgeel vocht, te gelijker tijd zwelt een

eene der groote onderkaakklieren aan dezelve zijde, en wordt hard en ongelijk.

In het tweede tijdperk, is de ontsteking van het slijmvlies zeer vermeerderd, hetwelke bij het eene paard vroeger dan bij het andere plaats grijpt; de snot wordt taai, groen of kleverig, en hangt aan de te zamen geringelde neusgaten, de klieren worden hooger, harder en vaster aan de kaak gehecht.

Vaak openbaart zich dus al dadelijk de kwade droes; daarenboven is het slijmvlies bleek, smerig, kaaskleurig of geel-rood; op hetzelfde vertoonen zich blaasjes, welke naderhand zweren worden, die zich steeds meer uitbreiden.

In deze beide tijdvakken schijnen de paarden gezond, fris en vrolijk, terwijl zij hun werk zonder moeite verrigten.

In den derden trap, wordt de ontlasting steeds groener, bruin, aschgrauw, dun, vaak met bloestrepen vermengd, stinkende en bijtende; het slijmvlies is loodkleurig of bruin-rood, de zweren op hetzelfde vormen eene oneffene vlakte met verhoogde, meestal witte randen; de gezwollene klieren zijn vast aan de kaak gehecht; de oogen druipen, het kristallijne vocht is dof, het onderste ooglid slap; alle welke veranderingen het oog aan die zijde treffen waar de neusontlasting plaats heeft, en de gezwollene kaakklier bestaat.

Offchoon men geene merkbare koorts bespeurt

E

is,

82 ZIEKTEN DER OPSLORPENDE VATEN,

is echter thans het paard zeer ongesteld, en heeft deszelfs vrolijkheid en eetlust verloren, de ademhaling is bezwaarlijk, het kucht, de haren staan overeinde, er vertoonen zich watergezwelleu aan het hoofd, de koker, de ballen, de beenen, enz. De mist, de pis, de snot en de adem stinken, koud zweet en doorloop volgt, en daarop de dood.

84 Tot bijzondere onderscheidings-
teekenen dezer ziekte, verstreken: het
uitwerpen van snot en het zwellen der klieren
aan deene zijde, gepaard met schijnbare ge-
zondheid in de twee eerste tijdperken en met
de kankerachtige zweren in den neus in het
laatste; terwijl voorts het aanwezen van den
kwaden droes daardoor verkondigd wordt, dat
de ziekte lang op dezelfde hoogte blijft stand
houden, daar in andere naar dezelve zwellen-
de ziekten, de toevallen gewoonlijk spoedig
verergeren. en dan weder afnemen.

De loop der ziekte is somtijds snel,
(*acut*), somtijds en merendeels slepende en
langdurig; voorts is zij, of plaatselijk, of tast
het geheele ligchaamsgestel (*organismus*) aan,
en gaat vaak met ontsteking der long, hersens,
nieren, of van het rugmerg gepaard, in alle
welke gevallen zij volstrekt ongeneeslijk is.

85 Zij is zeer besmettelijk, en offchoon het
zeer

zeer bezwaarlijk valt juist te bepalen in welk tijdvak der ziekte, en onder welke voorwaardelijke gesteldheid des ligchaams de aansteking het meeste voor andere paarden te vreezen is, (5) raadt echter de voorzigtigheid aan geene voorzorgen te verzuimen, en alle gemeenschap tusfchen een van dezelve aangetast of verdacht paard met andere af te fnyden, en daarenboven die maatregelen tot beteugeling der uitbreiding dezer kwaal, te nemen welke in het 9e. hoofddeel van de handleiding tot de gezondheidsbewaring der paarden zijn opgegeven.

86 Niet slechts alleen dan, wanneer de kenteekenen, die voor den eerften en tweeden trap dezer ziekte opgegeven zijn, zich, offchoon in eenen geringeren graad vertoonen, maar zelfs wanneer eene gewone of boosaardige droes, in plaats van volgens den gewonen loop te eindigen, een aanmerkelijk tijdbestek blijft voortduren, zonder bijzondere beterschap of

F 2

ver-

(5) Ondervinding en proeven hebben doen zien dat de besmetting alleen door onmiddelijke aanraking geschiedt, dat alle vochtigheden des kwaaddroesfigen paards dezelve bewerken, en dat de snelste besmetting en uitbreiding met de hevigste toevallen dan plaats heeft, wanneer dezelve door paarden van een vreemde foortig ras, in eene plaats wordt te weeg gebracht, vooral wanneer dezelve door ongemakken veel geleden hebben.

verergering aan den dag te leggen, of wel, indien zich eenige verschijnselen daarbij opdoen, welke naar de kenteekenen van den kwaden droes zweemen, zoo kan men dezelve als eenen verdachten droes beschouwen, die maar al te vaak een voorlooper of het beginfel van den kwaden is.

87 Deze kan men echter in het begin nog hopen te genezen, daartoe geve men het paard inwendig de middelen n°. 11. *a*, *b*. en 12; gebruike dezelfde berookingen als in den kwaden droes, geve het spaarzaam, doch goed droog voeder, vermijde het groene, poetsc het vlijtig, en doe het eene matige beweging verrigten.

88 De genezing van den eigenlijk kwaden droes is en blijft steeds onzeker, daar er wegens den waren aard en zetel der ziekte zoo veel duisterheid heerscht, dat geene der beste veeartzenijkundige zich op eene volkomene kennis derzelve durft te beroemen; deswegens zal ik mij alleen bepalen tot de opgave der onderscheidene middelen, welke als de beste gevolgen gehad hebbende, door hen aangeprezen zijn, zonder in de beoordeeling derzelve verre uit te weiden.

Alleen bij jonge paarden en in het eerste en
twee-

tweede tijdvak vermag men hoop op genezing koesteren. In het eerste, wanneer het ongemak nog plaatselijk is, gebruike men n°. 11 *a, b, 12, 17*, waarbij men in het tweede de inwrijvingen met kwikzalf, (*ung. murias hydr. oxydulati*) en berookingen van gelijke deelen, oprement, (*auripigmentum*) en harst, (*colophonium*) voegt, die men het paard doet inademen, terwijl men intusfchen versterkende prikkelmiddelen (n°. 18 en 19) geeft.

Men ga voorts zoo veel mogelijk de oorzaken tegen, geve het paard, goed droog doch geen groen voeder, daar hetzelfde verflapt; voorts laauw drinken, en doe het eene dagelijksche zachte beweging verrigten, terwijl men het in eene gematigde luchtige stal plaatst.

De verdunning der snot, de vermindering der kankerachtige zweren, het verkleinen en losser worden der klieren; voorts wanneer het paard levendig, vlug en hongerig blijft, het haar glad, de oogen helder en de adem goed blijven, kunnen hoop doen voeden om in de genezing te slagen; in alle andere gevallen doet men beter het te dooden hetgene steeds behoort te geschieden, wanneer na ten langste gedurende drie weken de middelen aangewend te hebben, er geene bettererschap maar verergering plaats grijpt.

89 ST. PAUL geeft het voorbeeld van twee paarden op, welke door zes maanden lang alleen jeneverfpoeling en stroo, en daarna zes weken eene goede weide te hebben genoten, volkomen hersteld zijn geworden.

Voorts prijst hij het middel 13 en 14 aan, waarvan hij somtijds goede gevolgen heeft ondervonden, met bijvoeging van dampbaden en het zetten van eenen dragt aan den hals aan de aangetaste zijde, welke men zoo lang laat etteren, als het uitwerpen uit den neus duurt, gevende het een ligt verteerbaar, niet verhitend voedsel, zoo als garstenmeel met hakfel, voorts stroo en geen of weinig doch goed hooi.

90 WOLSTEIN de onwaarschijnlijkheid der genezing van andere paarden dan van zes of zeven jaren vaststellende, raadt bij jongere tweemaal daags het geven van een slikbrok van n°. 15 aan, en voorts om goedaardige droesstof met werk, te wederzijde, in eene huidinsnijding achter de ooren, op de medegevoelende (sympathetische) zenuwen in te enten, en wel te laten etteren, en voorts wanneer het voorschrift n°. 15 gebruikt is, dagelijks n°. 16 in te geven, terwijl men de klieren met spaansche vliegzalf. (*ung. vesicatorium*) uit 1 deel

spaan-

Spaansche vliegen, en 2 deelen altheabalsen zamengesteld smeert. (5)

Naar gelang dat de genezing door eene de-

F 4

zer

(5) Onder de geneeswijzen welke tegen den kwaden droes en worm in het werk gesteld zijn, heeft die welke de Heer COLLAINÉ (*) onlangs in Italië tegen deze kwalen beproefd heeft, en waarvan de gunstige uitslag het genootschap van landbouwkunde van het departement der Seine bewogen heeft, zijn verslag door den druk gemeen te maken, en ter beproefing aan te prijzen, bijzondere opmerking verdiend.

Het bijzonder onderscheidende zijner geneeswijze bestond in het geven van spiesglanslever en bloem van zwavel in buitengewoon-groote giften.

Tegen den worm alleen verminderde men de gewone hoeveelheid hooi en vermeerderde die van het stroo, terwijl men onder het voeder, keukenzout vermengde; men brandde de wormbuilen en bestreek de daaruit voortspruitende wonden met bijtmiddelen; voorts verrigtte men kleine aderlatingen van twee pond, en herhaalde dezelve met twee dagen tusschentijd van twee tot vijf malen, men gaf aan de gene waarbij de worm met opzwellings der ledematen verzeld ging, mijnstofsleijke kermes, (waterstoffig verzuurde spiesglans, (*kermes mineralis*) *hydro-sulphuretum oxyduli sibi*) tot 2 oncen daags, beginnende met kleine giften, doch aan de andere, bij welke de ziekte eene mindere hoogte bereikte, wegens de duurte van dit middel,

(*) *Compte rendu à la société d'agriculture du département de la Seine, d'une expérience tentée et des succès obtenus contre la morve et le farcin qui infectoient, depuis dix huit mois le 23^e rég^t. de dragons, par M. COLLAINÉ, suivi du rapport de M. M. Desplas, Hussard et Tessier. Paris 1810.*

zer voorschriften bewerkstelligd wordt, vermeerderde men de hoeveelheid der haver en gebruike n°. 18 en 19 als nakuur tot versterking.

DER-

del, vergenoegde men zich met hun alleen bloem van zwavel tot 6 oncen daags te geven, insgelijks met kleine giften beginnende.

De van den kwaden droes aangetaste paarden, het zij dezelve al of niet met den worm verzeld was, wierden aan denzelfden leefregel onderworpen. en gelijkf ortige aderlatingen met twee daren tusschenijld gedaan, gevende hen voorts dagelijks in slikbrokken met konig, 6 oncen spiesglans lever, (e-zwavelde spiesglans bevattende potasch,) (*hepar antim.*) *fulphuretum potassæ sibiutum*) en van 12 tot 18 oncen bloem van zwavel, beginnende met kleine hoeveelheden; terwijl men bij zoodanige, waar bij zweeren in den neus aanwezig waren, deze brandde, of met vitriool olie bestreek.

De uitlag daarvan was, dat alle paarden, bij welke deze ziekte geene tot het leven of gezondheid verischte deelen verwoest had, noch al te oud of te zeer uitgeput waren, volkomen hersteld zijn geworden, niettegenstaande de meeste verscheidene, ja sommige zelfs 18 maanden aan deze kwalen geleden hadden, zoo, dat na 45 dagen, de paarden welke alleen den worm hadden, geheel hersteld zijn geworden; terwijl zulks met de kwaad droefige, na verloop van 2, 3 of 4 maanden insgelijks plaats greep, hebbende men zoo omtrent de eene als andere, gelegenheid gehad op te merken, dat de weide de genezing vertraagde.

Ten gevolge der aanbeveling van den minister van oorlog tot het in het werk stellen dezer middelen, werdte deze geneeswijs, in het jaar 1811, bij het uit Holland gekomene

DERDE ARTIKEL.

De worm.

91 Zeer nabij met den kwaden droes vermaag-
 fchapt, vaak met ~~dezelve~~ gepaard of er in
 F 5 over-

mene 11. regiment hufaren, in het garnifoen te Arras be-
 proefd bij, het welke zich tusfchen de 60 en 70 paarden bevon-
 den, alle door deze kwaal in eenen hooger en of mindere
 trap aangetast; edoch, nietteftaande de voorfchrif-
 ten, onder toezigt eens bekwamen veearts, op de aanw-
 keurlyke wijze gevolgd wierden, beantwoordde de uitflag
 geenzints aan de hooggefpannene verwachting, aangezien
 alle deze paarden, of onder de geneeswijfs ftorven, of zoo
 weinig gunftige verandering vertoonden, dat, uit hoofde
 der verbazende kosten die dezelve veroorzaakte, en tot
 vernijling van verdere aanfteking, men eindelijk befluiten
 moest hen alle dood te fchieten.

Hieruit fchijnt te blijken, dat indien de Heer COLLAIN
 geflaard is, de kwade droes en worm door deze behan-
 deling te genezen, plaasfelijke medewerkende oorzaken, als
 lucht efteldheid, aard van het voedsel, en meer andere
 miffehien onopmerkte redenen, dezelve waarfchijnlijk
 grootelijks bevordert hebben, en dat eene andere land-
 en luchtftreek haar welligt ten eenemaal derzelver doel
 zoude doen misfen, uit welken hoofde men ook dit mid-
 del geene onvoorwaardelijke zekerheid kan toekennen, zoo
 lang geene nadere welgeflaagde proeven het bevestigd heb-
 ben.

Even min zoude men het volgende middel als zekerder
 durven aanprijzen, dat mij, gedurende mijn verblijf in Oost-
 pruisen in 1812, toevallig door eene gedrukte aankondi-
 ging

overgaande, is de worm, (*malleus farcinosus*, *scrophula farcinum*) *le farcin*) en als eene gelijkaardige ziekte aan te merken, welke insgelijks bijzonder het opflorpende vatenstelsel aantast; Deszelfs zetel is vooral in de oppervlakte des ligchaams bekleedende huiden en klieren gevestigd, en is in deszelfs hoogen en waren trap bijna ongeneesbaar en ten hoogste befmettelijk.

92 Deszelfs oorzaken zijn, boven en behalve die welke den kwaden droes voortbrengen, een kwalijk behandeld rheumatismus, te veel sterk voeder, langdurig en hebbelijk gewordenen kwalen, zoo als de loop, enz.

93 Tot kenteekenen van deszelfs aanwezig, verstrekken ronde als aan eene koord geregene knobbels, aan het hoofd, den hals, tus-

zing in een der tijdschriften bekend is geworden, welk het gelukkig slagen in het genezen van den kwaden droes, in onderscheidene gevallen, door behoorlijke procesverbaalen en getuigschriften gestaafd, bekend maakte, ware het niet dat de onkostbaarheid dier geneeswijze te uitlokkend was, om de beproeving derzelve achterwege te laten, bestaande dezelve alleen in houtskolen tot een ontastbaar poeder gestoten, in eenen mondzak, het paard tusschen de voedertijden, gedurende eenige uren daags aan het hoofd te hangen, zoodanig dat het als verplicht is hetzelfde bij de inademing op te fluiven.

tusfchen de voorbeenen , aande zijde des buiks , tusfchen de binnenzijde der achterbeenen , enz.

Het paard wordt traag , de oogen dof , de beenen zwellen en worden kreupel ; hoest , rilling , koorts , het overeinde ftaan van het haar zijn voorboden dezer kwaal ; vervolgens verfchijnen de builen met welke de ziekte toeneemt ; dezelve worden weeker , breken door en ontlasten een ftinkend vocht , er wast wild vleesch in dezelve , zij fteken de aangrenzende deelen aan , vervolgens vertoonen zich de kenmerken van den kwaden droes , welke den dood ten gevolge heeft. Zoodanig is de gewone loop des eigenlijken worms en van den hoogften trap dezer ziekte.

- 94 Meer hoop tot genezing geeft de on e i g e n l i j k e worm , daar dezelve eigenlijk uit rheumatieke gezwollen bestaat ; bij dezelve vertoonen zich builen aan de zijde der bovenlip , welke tot de grootte eener hazennoot toemen , doorbreken , en breede drooge zweeren vormen , wier etter niet ftinkt maar eene gladde dunne korst vormt.

Ontftaan er diergelijke grootere onder de huid der kaken enz. , welke uit een klein , rond gaatje , witte gele etter ontlasten ; wanneer aan andere deelen , als aan de vóór- en achterbeenen en knien , grootere builen en
zwee-

zweren te voorschijn komen, die eene taaije, slijmerige, geelwitte vochtigheid ontlasten, en het paard blijft daarbij gezond, zoo kan men hoop op herstel voden.

In het algemeen dient tot genezing het zetten van dragten, terwijl door sommige het branden der wormbuilen aangeprezen wordt, welke men met laauw water, en daarna met zeepgeest eenige malen daags moet wasschen, en volgens den raad van PILGER uitwendig op dezelve n°. 20 gebruiken: voorts eene matige beweging, een goede leefregel, goed voeder, zuivere lucht, een zindelijke stal en vlijtig poetsen. Inwendig geve men spicsglanslever, zevenboom, anijs, mostert- en venkelzaad of n°. 20 *b, c, d.*



TWEEDE HOOFDDEEL.

RHEUMATIEKE EN KRAMPACHTIGE
TOEVALLEN.

EERSTE ARTIKEL.

De rheumatieke of zinkingachtige toevallen.

95 De meeste dezer die, schoon zij in uitwerking en gevolgen verschillen, echter veelal in hoofdkenmerken overeen komen, zijn onder den algemeenen, doch veelal ongepasten naam van v e r v a n g e n h e i d bekend, en worden zoo door eene overspannene als verzwakte levenskracht voortgebracht, welk karakter men wel in het oog behoort te houden.

De oorzaken der eerste zijn overdrevene inspanning en snelle verkouding, door koud drinken of schielijke rust in koud weder, enz.

96 Deszelfs kenmerken zijn, treurigheid, gebrek aan eetlust, een hangend hoofd, het schielijk uitademen van heete lucht met geopende, drooge, brandende neusgaten en huid, het sterk kloppen der zijden, en drooge, met witte slijm overtrokkene mist; onaangezien alle smerten legt het paard zich niet neder, tot het door vermoeidheid nedervalt, en de beenen uitstrekt; vaak is met deze toevallen, eene ontsteking der long gepaard, terwijl ge-
meen.

meenlijk in alle deelen pijn bepeurd wordt.

Wat den uitflag der ziekte betreft , zoo kan men deszelfs genezing niet buiten hoop ftellen , iudien de koorts en longontfteking geenen te hoogen trap bereikt heeft , en de laafte noch niet in verfterf overgegaan is.

97 De geneeswijs is in het begin ontteking werende of bedarende (*m. antiphlogistica* , *s. temperans*) , beftaande in latingen die men herhaalt , wanneer de pols niet langzamer wordt , in verzachtende openende lavementen , laauw drinken , dampbaden , waschen met laauw water , een matig warme ftal , goed legftroo , eene luchtige bedekking , en het herhaalde ingeven van eene kleine hoeveelheid falpeter , bij v. $\frac{1}{2}$ ons met lijnzaad afkookfel.

98 Het rheumatismus dat met verzwakte levenskracht gepaard gaat , en dat men onder de droesziekten , onder den naam van v a l f c h e of omz w e r v e n d e droes rangfchikt , is aldaar reeds met een woord aangehaald geworden.

99 De oorzaken zijn dezelfde als bij den droes ; de kenteekenen : dofte oogen , matheid der leden , pijn bij het roffen , brandende hitte , een snelle pols , benaauwd kugchend , door hoesten vaak afgebroken adem-
ha-

halen, een drooge tong, spaarzame ontlasting van bruine pis, verstoptheid, vaak spier-trekkingen. De zetel der pijn is, voornamelijk in de spieren der ledematen, deze zijn vaak stijf en niet zonder smert beweegbaar; dikwijls wordt deze ziekte door een heet gezwel op de oppervlakte der spieren verzeld.

De gevolgen zijn dikwijls verlamming, stijfheid, gezwollen, mok, enz. De beoordeeling van derzelver uitgang, is dat men herstel kan hopen, wanneer in haar begin spoedige hulp wordt toegebracht, het dier niet te zwak is, en het kenmerk der ziekte meer ontsteking dan verzwakking aankondigt.

100 De genezing bestaat in de opwekking der levenskracht door opium en geest van kamfer, (n°. 10.) het zij afzonderlijk of met salpeter vermengd (n°. 10. a.) terwijl de verbinding van kamfer met mijnstoffelijke kermes, (*kermes mineralis*) (n°. 10. b.) en van deze met ruwe spiesglans, (*antimonium crudum*,) (n°. 10. c.) een en ander in slijmachtige afkookfels van lijnzaad- of garstenmeel, vooral in de voorkomende longontsteking, bijzonder dienstig is, het zetten van dragten aan de borst, den hals en de billen, en het openen der gezwollen, bij verdere beterschap versterkende bittere middelen (n°. 8. en 9.), krachtig voeder en eene goede oppassing.

Reu-

a. Rheumatismus, gewoonlijk vervangenheid genaamd en jicht.

101 Dit soort van rheumatismus dat men vervangenheid noemt, is vooral door langeren duur en zonder met aanhoudende koorts gepaard te gaan, van de vorige trappen van hetzelfde onderscheiden, en is of als eene kraap van het werktuig (orgaan) der huid, of als eenen prikkel, welke bijzonder de peescheden aandoet, aan te merken.

102 De volgende kenteekenen vertoonen zich gewoonlijk: vaak zijn het de gewrichten der voorvoeten en de laburige pezen, welke het eerste dit ongemak aankondigen, dat meer de voor- dan de achterbeenen, somtijds doch zamen een en andere aandoet; de voeten trillen in het gaan, hetwelke stijf geschiedt, en waarbij het paard de hielen mijdende, meest op den voorhoef treedt, of het lijdende been nasleept; de beenen zijn stijf, de gewrichten bijna onbewegelijk; vaak zet het paard eenen voet vooruit, en meermalen dezelve bij een; het teruggaan is zeer moeilijk, waarbij het de achterbeenen onder zich laat staan, de voorbeenen vooruitzet of ze als nasleept: voorts zijn de spieren hard en pijnlijk wanneer men tegen het overeinde staande haar strijkt.

De

De pols is hard en snel, gepaard met algemeene hitte, eene drooge huid, verlorene eetlust en weinig ontlasting, terwijl voorts de pijn en koorts zoo lang duren tot een gezwel zich op de pijnlijke plaats vertoont, de ziekte afneemt of slepende wordt.

In eenen hooger trap, worden alle lichaamsdeelen door pijn aangetast, het paard ligt meer dan dat het staat, en kan als lan bezwaarlijk opstaan, men ontdekt stijfheid in de voet- en kniegewrichten, aan den hals, alsmede in de lendenen en heupen.

103 De uitflagende gevolgen dezes toevuls zijn: dat bij eene doelmatige en spoedige hulp, de deelen vaak derzelver beweegbaarheid terug krijgen, doch somtijds echter een waterachtig gezwel in het gewricht nalaten, en voorts het paard langzamerhand herstelt. Somtijds zwellen de achterbeenen, er ontstaan uitslagen, terwijl maar al te veel verhardingen der gezwollen, beenuitwasfen, volvoeten, hoornkloven en verzweringen des hoefs de gevolgen van een kwalijk behandeld of hardnekkig rheumatismus zijn; zijnde het aan diergelijke oorzaken dat men volgens de gevoelens der bestehedendaagsche veeartsenijkundige, de meeste ziekten der beenderen, als de schevelbeenen, spatten, overhoeven, volvoetigheid door uitzetting van het voetbeen veroorzaakt, enz.

G

moet

moet toeschrijven; terwijl niet alleen vele ziekten aan rheumatieke oorzaken zijn te wijten, maar deze vereenigen zich vaak met verscheidene uitwendige toevallen, wier genezing zonder acht te geven, op het zich daar medeparende rheumatismus zeer bezwaarlijk valt, dus is b.v. de boeg- en kruisammigheid, ofschoon uit verrekking ontstaande, veelal oorzaak dat rheumatieke toevallen zich bij dezelve voegen, waardoor men zeldzaam in de genezing slagen zal indien men dezelve alleen als een uitwendig toeval behandelt, terwijl daarentegen het zetten van dragten, zelfs dan wanneer men van de uitwendige beschadiging zeker is, bijna nimmer misfen zal heilzame gevolgen voort te brengen.

104 De oorzaken kunnen dus zoo wel in- als uitwendige zijn; in het eerste geval zijn het die welke de verteringswerktuigen verzwakken, en door de werkzaamheid van het werktuig, (orgaan) der huid te beperken, de natuurlijke afzonderingen des ligchaams hinderen, zoo als: onverteerbaar zwaar voedsel van zeer verhittende granen en vooral op ongepaste tijden, te langdurige werkeloosheid, bijzonder de snelle overgang van buitengewone en aanhoudende vermoeijenisfen tot aanhoudende rust; daarenboven kan de aanleiding hier toe gegeven worden, door vorige ziekten, de af-

afwisseling van de tempering der lucht, verkoudheid, te groote vermoeijenis, het verballen of ontfleken der voeten, hunne gebrekkige vorming, het zij zulks door het te dun uitvegen derzelve, het gaan over harde steenachtige wegen, of slecht gevormde ijzers veroorzaakt wordt, welk alles eenen te grooten toevloed van sappen naar het lijdende deel veroorzaakt, terwijl hetzelfde met de boegen kruislammigheid plaats heeft.

105 In de geneeswijjs moet men volstrekt de oorzaak niet uit het oog verliezen, ten einde haar volgens deze te wijzigen: ontstaat dezelve uit te veel rust en voedsel en daardoor tevens verzwakte spijsvertering, zoo moet men de middelijk versterkende (negatieve) geneeswijjs aanwenden, door eene verkoelende behandeling; men bevordere de ontlasting door braakwijnsteen en dubbelzout, en gebruike die middelen, welke naar de huid werken en de spijsverterings-werktuigen versterken, zoo als ammoniak-zout, delfstoffelijke moor, gentiaan, enz., (n°. 48. b.); men doe voorts het paard eenen strengeren leefregel houden, en van trap tot trap meer beweging verrigten.

106 Zijn daarentegen de oorzaken aan vorige ziekten, vermoeijensfen en andere welke uit zwakte ontstaan toeteschrijven, zoo onder-

steune men de lichaamskrachten door rust, goed voedsel en oppassug; men versterke de huid en de gewrichten door inwrijven en waschen met zeepsap en spoeling, van welke laatste men ook baden kan toebereiden; door omslagen van houtaschloog, het inwrijven van kamfer, enz.; in groote hitte der gewrichten verrigte men zulks met kalkwater; voorts doe men het paard vlijtig wrijven met stroo, warm toedekken en matige beweging verrigten, en geve inwendig n^o. 2, of 4, of 10 en 48 *a.*, met bijvoeging van 2 oncen gember, en in groote zwakte, van vlug loogzout, aether enz.

De uitwendige hulpmiddelen die men er verder tegen in het werk stelt, bestaan daarin dat wanneer de ziekte slechts eenen geringen trap bereikt, dezelve somtijds weggenomen kan worden, door het paard warm te rijden, en het te wrijven tot het droog is; kan men niet zeker hopen dat dit alleen voldoende zal wezen, zoo doe men (des noods dezelve herhalende,) eene aderlating aan de hals- of de boegader, hetgene men echter, wanneer de vervangenheid terstond op het eten volgt, moet vermijden; geve het inwendig 1 ons duivelsdrek in $\frac{1}{2}$ pint warme wijn, of 1 drachma hartshoorngest en 2 oncen wijngest met kamfer in een pint warm bier, of n^o. 48 *a.*; behange het twee à drie minuten lang met in zeer koud water gedoopte kleeden, wrijf de
ver-

vervolgens droog, rijde het warm, stel het voorts in eenen warmen stal, wel gedekt op een overvloedig legstroo, en late het op de mist staan; gevende het tevens lavementen van kamillenbloemen-water met 2 drachma's duivelsdrek, welke kuur men iedere zes oftwaalf uren herhalen moet.

Bespeurt men niet spoedig eene gunstige verandering, zoo is het raadzaam dat men zonder lang te aarzelen, overga tot het zetten van dragten aan de beide, zelfs naar omstandigheden aan de vier beenen, of wel van eene fontenel aan de borst, hetgene eene der zekerste en nimmer schadende middelen oplevert in de meeste uit verkouding, en bijzonder uit uitwendige oorzaken ontstaande, of zich bij dezelve voegende rheumatische kreupelheid.

107 Is de oorzaak aan slechte ijzers, het dun uitvegen der voeten en het gaan over harde wegen toe te schrijven, zoo neme men de ijzers af, verkoele de voeten met koud water, zette het paard op eenen zachten grond, doe omflagen van leem, waarbij men zelfs wat zout en azijn kan voegen, en ga, indien zulks geen beterschap schenkt, tot het zetten van een dragt over, terwijl men, indien er verzamelde vochten of etter in den hoef aanwezig mogt zijn, de zool met het hoefmes, of eene

trephine, (eene daartoe gefchikte boor) op de witte lijn moet openen, en zoo hierdoor als door het plaatfen der voeten in natte klei, de daarin opgehoopte vochten ontlasting en afloop bezorgen, welke anders de grootfte verwoestingen in den voet zouden aanrigten, voorts behandle men dit ongemak zoo als bij het vernagelen voorgeschreven wordt; terwijl men daarenboven met vrucht van warme baden uit verzachtende kruiden, als vlierbloemen, kamilien, hooizaad, enz. bestaande, gebruik kan maken.

Is men van alle andere hulpmiddelen verstoken, zoo is het doen eener kleine aderlating, het wrijven der lijdende deelen met eene stroo-wisch, die men in een emmer koud water, waarbij men een pint azijn en $\frac{1}{2}$ pint brandewijn gevoegd heeft, bevochtigt, en het achtervolgens ingeven van eenige fleschen water met een hand vol zout, of 2 fleschen water met een fles azijn, het beste dat voor de eerste oogenblikken gedaan kan worden, terwijl men hierbij voorts de andere, wegens deszelfs behandeling gegevene voorschriften, volgt.

108 De verwaarloozing dezer vervangenheid doet haar van eenen langdurigen (chronischen) aard worden, en terwijl de koorts weg blijft, tast zij, of de geledingen of de huid

aan, welke beide zeer bezwaarlijk te genezen zijn; voor de eerste dezer toevallen geve men n°. 4. en 8. *a.*, en make gebruik van warme omslagen en baden; terwijl men voor de tweede, aangewezen door eene algemeene stijfheid der huid en eenen fijnen huiduitslag met overeinde staande haren, en die, behalve aan verzuim, aan slecht voeder, zwaren arbeid en verwaarloosd poetsen is toe te schrijven, n°. 6. *a* en *b.* ingeeft, het paard met zeepfap en aluin wast, het mout en goede haver geeft, voorts het vlijtig reinigt, eene zuivere lucht en matige beweging doet genieten, en bij beterschap zoo lang rijdt tot zich een zacht zweet vertoont, waar na men het droog wrijft; terwijl eindelijk in foortgelijke langdurige jichtige toevallen, die maar al te vaak alle geneeskundige pogingen te leur ftellen, het algemeene koude bad in het warme jaargetijde in het werk gesteld, fomtijds nog het eenige middel tot herftel heeft opgeleverd.

T W E E D E A R T I K E L.

De krampachtige toevallen.

109 Verscheidene ziekten waaraan het paard onderhevig is, zijn van eenen krampachtigen aard. men kan onder dezelve de klem, de vallende ziekte en duizelghid, de kortademigheid, hoest, hartkloppingen, het buikwee, de verhinderde waterlozing, de kramp der beenen en meer andere rangschikken, waarvan de eerste en laatste alleen in dit artikel verhandeld, en de andere hunne plaats aangewezen zullen worden bij de beschouwing van de ziekten der onderscheidene stelsels, die zij bijzonder aandoen.

a. De klem.

110 De klem, (*trismus*) *contraction spasmodique de la bouche*) is een toeval welk algemeen het geheele ligchaam, en bijzonder de kaauwspieren door eene krampachtige zamentrekking aandoet, zoo dat eerst de kaakbeenderen onbewegelijke op elkander fluiten, en eindelijk het geheele ligchaam stijf wordt, terwijl voorts eene toenemende koorts en volkomene verstopping hierop volgt, de benaauwdheid toeneemt, en het paard stuiptrekkende sterft.

Der-

III Derzelver oorzaken zijn verkouding, pijn, wonden bij welke de zenuwen gedrukt of half doorgesneden zijn, of die een zwaar verlies van bloed veroorzaakt hebben, de blootstelling van sommige wonden aan de zon of koude; het ophouden van derzelver ettering, enz.

II2 De geneeswijjs moet zich naar de oorzaken rigten, en daar deze ziekte eenen snellen loop heeft, de hulp spoedig en krachtig wezen; zijn de zenuwen half doorgesneden, zoo doorsnijde men ze geheel, doe derzelver drukking ophouden door verwijdering der wond en het wegnemen der lichamen die zulks veroorzaken; terwijl men de ettering poge te herstellen door spaansche vliegenzalf, terebinthijn, enz., men zette lavementen met braakwijnsteen, (gespiesglansde wijnsteenzure potasch, (*tart. emet.*) voorts dragten aan de borst en te wederzijde van den hals, welke men zoo prikkelend moet maken als mogelijk is, door in de fontanel voor de borst, terebinthijn- en steenolie in gelijke deelen te gieten, en de dragten met sterke spaansche-vliegenzalf te bestrijken, men omhange het paard met dekens, welke in scherpe loog van potasch gedoopt zijn, en indien men er gelegenheid toe heeft, zoo begrave men het geheel in warme mist. In-

wendig zijn als de werkzaamste middelen, indien het mogelijk is, het ingeven van wijnige hartshoorngest, (*liquor ammonii pyreolosi*) met opium; wijnachtige geest van ammoniakzout (*lig. amm. vinosus*) aanteraden; voorts, indien het paard nog vol kracht is, doe men eene ruime aderlating, zette het lavementen van tabak, baldriaan, duivelsdrek, en opium, wrijf de deszelfs kaken met n°. 49 c. en geve het n°. 49 a. en b., terwijl door VIBURG als een laatst middel het inspuiten van het afkookfel van witte nieswortel (*radix veratr. alb.*) in de halsbloedaderen aangeraden wordt; zoo als ook door PILGER met goeden uitflag is aangewend, het steken van een stuk van denzelfden wortel op de beide zijden der kaken, op de buitenste kaauwspier, bij wijze van een dragt, gepaard met lavementen van 6 oncen theriac. thebaica, $\frac{1}{2}$ ons alkali met 2 kannen sterk afkookfel van baldriaan-wortel, in welks plaats men ook lavementen van 2 drachma opium, $\frac{1}{2}$ ons duivelsdrek in een kan bovengemeld afkookfel van baldriaan zoude kunnen beproeven.

b. De kramp der beenen.

113 Dit toeval waaraan het paard somtijds onderworpen is, en door eenen pijnlijken prikkel

kel die de pezen krampachtig aandoet, te weeg gebragt wordt, behoort men wel van de vervangenheid te onderscheiden, daar dezelve eene geheel verschillende geneeswijze vordert.

114 Eene der hoofdoorzaken van dit toeval is gestremde uitwaseming in koude, die bijzonder de achterbeenen treft, waardoor het zich voornamelijk van de vervangenheid onderscheidt, welke meestal het eerste de voorbeenen aandoet.

In dit wordt het paard stijf aan één, somtijds aan beide de achterbeenen, zoodanig dat het geen deel van dezelve bewegen kan, het gaat kreupel of sleept het been stijf na, het teruggaan is bijna onmogelijk, en niet alleen in het gaan, maar zelfs vaak stilstaande, is het onderste gedeelte van het lijdende been zoo tegennatuurlijk getrokken dat de koot bijna den grond aanraakt.

115 Met vermindering van alle verzwakkende middelen vinden sterke geestige prikkelmiddelen, uitwendig hier hunne regte plaats, bijzonder datgene wat in n°. 97 voorgeschreven is, met welke het geheele been drie of viermaal daags sterk gewaschen moet worden.

Indien het paard eenigzins in staat is te gaan, moet men trachten het in beweging te

te brengen, en eenigen tijd omleiden, het herhaald en langdurig met stroo wrijven, en een overvloedig legstroo geven.

Is deze behandeling niet toereikende tot wegneming van het ongemak, zoo kan men overgaan om door het zetten van een dragt aan de dij een tegenprikkel te weeg te brengen, en tevens een of ander krampstillend en zweetdrijvend middel te geven.

- 116 De uitgang van dit toeval is dat somtijds zelfs bij de doelmatigste behandeling, hetzelfde na eenigen tijd terug keert, doch op gelijke wijs weggenomen wordt, en eindelijk geheel ophoudt. Somtijds blijft bij verzuim eene hebbelijkheid over, waardoor het paard, wanneer het eerst van de stal komt, de beenen krampachtig opheft, dat echter langzamerhand verdwijnt, naar mate het warm wordt, of wel het vertoont steeds eene krampachtige beweging, die echter vaak uit eene aangeborene gesteldheid ontspruit, en die beweging voortbrengt, welke onder den naam van hansen spat bekend, en in het buitengewoon hoog en krampachtig opheffen van een of beide achterbeenen bestaat.



DERDE HOOFDDEEL.

ZIEKTEN DER LEVENSWERKTUIGEN.

EERSTE ARTIKEL.

*Ziekten der hersenen.**a. De ontsteking der hersenen.*

117 De hersenontsteking, (*phrenitis*) veeltijds door het branden der heete zonnestralen op het hoofd, somtijds door uitwendige beschadigingen veroorzaakt, kenmerkt zich door alle teekenen van ontsteking, als door koorts, hitte, vooral des hoofds, razernij, wildheid, die met matte gevoelloosheid afwisselt, enz.; terwijl zij zich van den kolder door de hevigheid der toevallen en spoediger uitslag, welke gewoonlijk doodelijk is, onderscheidt. Zeldzaam levert de kunst veel hulp tegen dezelve op, die het meeste van de natuur zelve verwacht moet worden, aangezien men een zoodanig dier, uit hoofde van deszelfs wildheid, bezwaarlijk naderen kan; Is het mogelijk zoo doe men bovenal een of meer ruime aderlatingen, bijzonder aan de slapen; legge omslagen op het hoofd van klei met ammoniakzout, met water bevochtigd; begiete het hoofd met koud water, en trachte het n°. 7. *b.* met water in te geven. Som-

118 Som tijds wordt een paard door de hitte bevangen, en stort door dezelve als bedwelmnd neder; dit toeval dat bij spoedige hulp geene gevaarlijke gevolgen dreigt, vereischt dat men de neusgaten, slapen, het voorhoofd, de ribben en de kroon herhaald met azijn wasche; men geve het voorts van tijd tot tijd een fles water in, waarin $\frac{1}{2}$ ons salpeter ontbonden is, is zulks niet voldoende, zoo moet men het lavementen van laauw water en een handvol keukenzout zetten, een of twee kleine aderlatingen verrigten, en voorts hetzelfde in alle gevallen frische lucht doen inademen.

b. De kolder.

119 Dit toeval of deze ziekte, welke men als volkomen met de zinneloosheid overeenstemmende, beschouwen kan, verschilt even als deze in uitwerkfelen en trappen, welke de onderscheiding in stille, razende en slapende kolder heeft doen geboren worden.

120 De oorzaken en aanleiding is bijzonder in een zwak, teder, of zeer droog lichaamsgeftel te zoeken; vette dikke paarden, en vooral ruins, zijn daaraan het meeste blootgefteld, gelijk men mede opgemerkt heeft, dat de holsteinsche paarden met zeer gebogene hoofden, eenen bijzonderen aanleg, vooral tot den stillen kol-

kolder bezitten, hetwelke men niet zonder grond aan de buitengewone terugbuiging van het voorhoofd toefchrijft, waardoor de invendige holte der herfenen te zeer beperkt wordt; voorts kan vochtig, mistig, koud weder, te sterke inspanning in groote koude of hitte, te heete zonnestralen, eene ongezonde stallucht, onverteerbaar verhittend voedsel, bedwelmen- de flaapmiddelen en gevolgen van andere ziek- ten, dezelve voortbrengen.

De zetel der ziekte is in de hersens, het zij door verzweringen, verdroogingen of water- zucht; merendeels is zij ongeneeslijk, ja vaak doodelijk.

21 Verschillende zijn de kenteekenen wel- ke de onderscheidene trappen aanwijzen, die van den stillen kolder zijn: het paard staat als in gedachten, het eet liever van den grond dan uit de ruif, het neemt een mondvul hooi, houdt het half gekaauwd in dezelve, zoo dat het ter wederzijde uit de lippen komt, en wacht eenige minuten om het verder te kaauwen, ten ware men aan de halmten trekt, wanneer het zulks vroeger verrigt; na het eten leunt het met geweld in den halfter, met het hoofd op de krib, of laat hetzelve om laag hangen, met starrende oogen vooruit ziende; het laat de ooren hangen, of houdt ze eenen geruimen tijd, het eene vooruit, het andere te-

112 ZIEKTEN DER LEVENSWERKTUIGEN ,

terug , en toont geene de minste aandoening wanneer het bij dezelve aangevat wordt ; het is ongevoelig voor alles wat het omringt ; wanneer men het op den voet treedt trekt het deze niet terug ; zet men den eenen op den anderen , of de voorbeenen kruiswijs overeen zoo blijft het verſcheiden minuten , en zoo het lang in deze ſtelling tot het deszelfs evenwigt verliest ; voorts wil het niet ter zijde treden . Buiten den ſtal heft het de beenen zoo hoog op als of het door water baadde , en loopt regtuit door en tegen alles aan . In het rijden leunt het op de hand , en is voor hulpen en ſtraffen ongevoelig .

122 Zeer veel overeenkomst in gevoelloosheid heeft hiermede de ſlapende kolder , waar in het paard daarenboven meest altijd ſtaat te ſlapen .

123 De dulle of razende kolder wordt gekenmerkt door de buitenſporigſte wildheid , daar het paard in denzelven , zoo op ſtal ſtaande als bereden wordende , ſpringt , ſlaat en tegen alles aanloopt zoo lang den aanval duurt , of tot de toevallen der ziekte ophouden , wanneer het zoo lang tot bedaardheid terug keert , tot het door eenen nieuwen aanval aangetast wordt , aan welke ſommige paarden telkens onderhevig zijn , wanneer zij aan de zonnehitte blootgeſteld of warm worden .

Zal

24. Zal men met eenige grond hoop op genezing voeden, zoo moet men in de eerste plaats de oorzaken der kwaal pogen op te sporen, ten einde dezelve weg te nemen, en voorts de werkzaamheid der hersenen, middelijk en onmiddelijk door opwekking van het geheel werktuigelijk gestel (organismus) trachten te herstellen.

Hiertoe doe men , in de eerste plaats , het paard zoo veel mogelijk eene zuivere frische lucht inademen , begiete het hoofd verscheidenmaal daags met koud water , zette het een dragt aan de borst of voor het hoofd , en doe eene ruime aderlating verrigten , indien men de oorzaak der toevallen aan aandrang des bloeds naar het hoofd , kan toeschrijven : terwijl men het tot buikzuivering , (purgatie) dagelijks n°. 28. *a.* of *b.* ingeeft , en daarenboven prikkelende lavementen van water en zout zet ; blijft het herstel achterwege zoo geve men n°. 29. , en herhale na twee of drie weken de aderlating , terwijl men het voorts groen voeder op stal , en gemalene haver of garst geven moet.

T W E E D E A R T I K E L.

De keelontsteking.

25 De keelziekte of keelontsteking (*angina*) veelal door den naam van de vijfvel aangeduid,
 II tast,

tast, het zij alleen de uitwendige deelen van den hals, doch vaak ook den geheelen flokdarm, de luchtpijp, de keel en oorklieren aan, waarna zij de onderscheiding in uit- of inwendige keelontsteking ontvangt; hare oorzaken zijn vooral aan verkouding, bijzonder door koud drinken toe te schrijven, somtijds paart zij zich met andere ziekten, zoo als met den droes, met koortsen, enz.

126 Bij de eerste heeft alleen eene uitwendige zwelling plaats, welke echter het paard eene vrije ademhaling en slikken vergunt, die bij de inwendige keelontstekingen belemmerd zijn, hetgene men duidelijk aan de pijn en moeilijkheid in het slikken bespeuren kan, hetwelke vaak zoo groot is dat het water onder een gedurig hoesten door den neus wederuitgedreven wordt; de oogen zijn rood, vaak is de tong ontstoken en gezwollen, de ademhaling hoorbaar, de pols hard en koortsig.

127 Bijzonder wordt tot genezing der inwendige keelziekte eene spoedige hulp vereischt, bestaande in eene overvloedige aderlating van twee tot vier ponden, welke men des noods in de hoeveelheid van één tot twee ponden herhaald, voorts het zettē van dragten te wederzijde van den hals, welke met eene sterke spaansche-vliegenzalf
n°.

n°. 32. moeten bestreken worden, daarenboven make men omslagen van laauw water en garst; doe het de warme dampen van hooizaad en water inademen, zette het lavementen van laauw water en keukenzout, verzuime niet het vlijtig met stroo te wrijven, en geve, bijaldien het nog sliken kan, inwendig n°. 27 en 30 in, terwijl, indien het zulks niet kan doen, men het salpeter in lijnzaad- of garstenwater ontbonden, met bijvoeging van genoegzaam honig in de keel moet spuiten.

128 Is dezelve alleen uitwendig, zoo po-ge men het gezwel te verdeelen zoo lang er hoop toe is, door het gebruik van dampbaden en het inwrijven van een verdeelend middel of kwikzalf, terwijl men door het inwendig gebruik van n°. 31 de uitwaseming tracht te herstellen.

De leefregel en het voedsel moet in warme meeldranken bestaan, edoch wanneer de kwaal tot ettering overgaat, moet het voeder matig versterkende gegeven worden; als dan opene men het gezwel zoodra het week wordt, voorzigtig aan deszelfs benedenste zijde, en behandelde het voorts als eene gewone wond.

Ziekten der ademhalings-werktuigen.

129 De werktuigen der ademhaling zijn bij het paard bijzonder onderhevig om door de hevigste toevallen aangetast te worden, die het met een snel doodsgevaar dreigen, of door overblijvende gevolgen, deszelfs gezondheid ondermijnen, ten minste het tot verderen dienst onbruikbaar maken.

a. De ontsteking der long.

130 De long-ontsteking (*pleuritis. s. pneumonica consensualis*,) *la pleurésie, perypneumonie*) is eene der ziekten waaraan het paard bijzonder blootgesteld is, en welke niet alleen andere ziekten dikwijls als bijkomend toeval (symptomatisch) verzelt, maar ook vaak zonder dezelve het paard als eene eigene ziekte (*pl. s. pn. idiopathica*) aantast, het zij afzonderlijk, (*sporadici*) of algemeen als eene heerschende ongesteldheid, (*epidemi-ci*). Het is met de beschouwing der afzonderlijke dat wij ons hier voornamelijk zullen bezig houden, en die der heerschende (epidemische) longontsteking, onder de benaming van het longenvuur bekend, breedvoeriger onder de koortsen gewagen, daar geachte vee-

veeërtsenijkundigen haar als eene koorts met borstkramp gepaard, aanmerken, in welke dus de longontsteking als een bijkomend toeval plaats heeft.

131 Gansch niet onbelangrijk is de in latere jaren gemaakte onderscheiding der longontsteking, in eene met vermeerderde levenskracht, die de ware (*pl. s. pn. vera, activa s. sthenica*) genaamd wordt, en in de zulke, welke zich door verminderde levenswerkzaamheid kenmerkt, en den naam van valsche (*pl. s. pn. spuria, passiva, s. asthenica*) ontvangen heeft.

Men zoude den lateren tijd onregt doen, wilde men haar de verdienste betwisten, door deze verdeeling een duidelijker gezigtspunt, met opzigt tot deze ziekte te hebben aangewezen, offchoon dezelve ook den ouden niet onbekend is geweest, waarvan zoo al niet hunne woorden, echter hunne behandeling duidelijke sporen opleveren.

132 Van hoe veel gewigt dezelve ook moge wezen, vermag men echter haar niet geheel en zonder eenige bepaling aannemen, en de volgende zamenvoegingen (*complicatien*) uit het oog verliezen, zonder wier bijkoming zeldzaam eene longontsteking bestaat die geheel en onvermengd het kenmerk eener de-

zer beide hoofdverdeelingen aan den dag legt, en die ieder naar hunnen aard eene wijziging in de geneeswijs vorderen; tot dezelve kan men als de voornaamste de zinkingachtige, rheumatieke en slijmachtige longontstekingen (*pl. s. pn. catharralis, rheumatica, &c.*) brengen, om van andere minder gewichtige zamenvoegingen niet te gewagen.

Ieder dezer zamenvoegingen bezit het eigenaardige dat gewoonlijk de eene zich meer door wezenlijk vermeerderde levenswerkzaamheid of aanleg tot derzelve vermeerdering, de andere door verminderde levenskracht of strekking tot hare vermindering kenfchetst, dus zal men b. v. bij eene zinkingachtige longontsteking meer ontstekingachtige toevallen, en daarentegen bij eene slijmachtige meer die eener verminderde levenskracht te wachten hebben.

Even belangrijk als wenschenswaardig zoude het zijn indien zekere en onveranderlijke kenteekenen den waren aard der ziekte aan den dag leiden, edoch daar deswegens steeds zoo veel duisterheid overig blijft, dat de beoordeelingskracht des ervarendsten geneesheers niet vermogend is, dezelve volkomen te doorgronden, en de ondervinding hierin alleen eene zekere trap van juistheid kan doen verkrijgen, zoo zal het den minder geoeffenden niet anders dan voordeelig zijn, eenige korte en voorname regels ter algemeene behandeling de-

dezer ziekte medegedeeld te worden.

Slechts weinige longontstekingen zijn in den aanvang niet van eenen ontstekingsachtigen aard, en voegen zij zich al bij eene met verzwakking gepaarde ziekte, zoo verlieze men echter niet uit het oog dat de longen door ophooping van bloed zich in eenen toestand kunnen bevinden, die aan den ontstekingsachtigen grenst, en wegens de belangrijkheid dezer edele deelen eene snelle hulp tot verligting vordert.

Men overwege naauwkeurig de oorzaken, bijaldien dezelve niet buiten het bereik der nasporing leggen, en onderzoek opletten het gestel des voorwerps; waarbij men in aanmerking moet nemen dat verzwakkende oorzaken niet altijd verzwakking in een sterk voorwerp te wege brengen.

Daarbij verlieze men nimmer uit het oog het gewigtige deel dat de longen in de dierlijke huishouding nemen, waardoor hunne verrigtingen zonder het grootste gevaar nimmer een oogenblik afgebroken kunnen worden, hieruit vloeit voort dat men in den beginne der longontsteking, nimmer prikkelende of verhittende middelen moet aanwenden, aangezien de gevallen waarin zulks dienstig kan wezen, ten uiterste zeldzaam zijn, en alleen door den geleerden veeërts onderscheiden kunnen worden. Indien men dus deswegens in de onzekerheid verkeert,

zoo poge men tijd te winnen tot duidelijke onderscheiding, door het toedienen van verzachtende en ligte verkoelende middelen, zoo als slijmachtige afkookfels met honig, enz.

Bestaan er teekenen die de aderlating vorderen, zoo behoort zulks onverwijld, ruim en zelfs herhaald te geschieden, indien de toevallen zulks schijnen te vereischen.

Wanneer teekenen van ophooping van bloed in de longen bestaan, zoo late men niet na dit laatste middel spoedig in het werk te stellen, even min als eene kleine aderlating zoo nabij mogelijk aan de lijdende plaats te doen, zelfs dan wanneer eene algemeene verzwaking plaats greep, daar hiervan vaak de eenige en onmiddellijke redding afhangt.

Vereischt de ziekte opwekkende middelen, zoo is het veiligste middel om niet te dwalen, dat men met de zachtste beginne, om trapswijze te kunnen opklimmen, terwijl men daarenboven steeds heeft waar te nemen, om de heviger prikkelende middelen met slijmachtige ter doorzwelging te verzachten, uit hoofde van de groote gevoeligheid der longen; deswegens moet de drank ook steeds verzachtende zijn, en door bijvoeging van slijmachtige middelen de scherpte der prikkelende weggenomen en omzwachteld worden.

Ten

133 Ten einde nu met eenige zekerheid de geneeswijze te bepalen, is de kennis der teekenen noodig, zoo dergene die den verschillende aard der longontsteking kenmerken als die den staat van verminderde levenswerkzaamheid aankondigen.

De eerste aanwijzing ontvangt men uit den staat van kracht en de voorafgaande levenswijze van het door de ziekte aangetaste dier: dus kan men bij afgematte, slecht gevoedde en zwakke paarden, vooral bij vochtig weder en jaargetijde niet wel anders dan eene longontsteking met verzwakking veronderstellen, terwijl dezelve bij sterke welgevoede paarden, na langdurige droogte, ten minste in den aanvang steeds het kenmerk van vermeerderde levenskracht aan den dag legt.

134 De oorzaken der laast genoemde zijn gewoonlijk hevige bewegingen, verhitte en getremde uitwaseming door daar op volgende verkouding en koud drinken: terwijl voorts door te veel krachtig voedsel en weinige beweging deze ziekte, zoo al niet voortgebracht, ten minste zeer voorbereid wordt.

135 In tegenoverstelling hiervan zijn de oorzaken der longontsteking met verminderde levenskracht, al diegene welke deze te wege brengen, als: te veel, te weinig of

flecht voedsel; te weinige beweging; te sterke en aanhoudende vermoeijenissen; veranderlijk, koud en vochtig weder, vochtige doffe en vuile stallen, enz.

136 De algemeene kenmerken dezer ziekte in beide deze staten, zijn: dat de ademhaling, welke het paard zeer moeilijk valt, snel met geopende neusgaten en sterke beweging der ribben en zijden geschiedt, en gedurig met eenen korten droogen hoest verzeld wordt; het paard drinkt weinig, ofschoon het hevige dorst te kennen geeft en eet genoegzaam niet; het legt zich weinig neder en wankelt in het gaan; de uitwendige warmte is merkelyk vermēerderd, heet en als het ware brandend, de afgang vaak onnatuurlijk, droog of nat.

137 Die welke bijzonder de ware longontsteking of den toestand van verhoogde levenskracht aankondigen, zijn: dat in dezelfde de pols, groot, vol, hard, ras, (*celer*) en matig sneller is dan in den gezonden staat, en dan eerst zwak, klein en snel (*frequens*) wordt, wanneer door verwaarloozing, den staat van verzwakking voort gebragt is; de adem is veel heeter dan in den staat van gezondheid; het hoesten is in het begin krachtig en helder; de vermeer-

meerderde warmte is gelijkvormig over het geheele ligchaam verbreid, terwijl eindelijk de dikte der ontstekingsachtige korst, welke zich op het afgetapte bloed vertoont, in verband met de overige toevallen, eene aanleiding tot bepaling van de hevigheid der ontsteking kan geven.

138 De valsche longontsteking of die met verzwakte levenskracht, (*passiva*), het zij dat dezelve zich dadelijk onder dit karakter te kennen geeft, of dat het verzuim in het gebruik van gepaste, of het aanwenden van verkeerde, b. v. prikkelmiddelen, de ware (*active*) longontsteking in deze doet overgaan, onderscheidt zich van haar, daardoor, dat wanneer men de hand aan de linkerzijde op de ribben naast het schouderblad legt, men het hart buitengewoon sterk voelt kloppen, terwijl de pols snel (*frequens*), zwak, klein, krampachtig en somtijds tuschenpoózende is.

De ademhaling is snel en moeilijk, doch de adem overtreft in hitte weinig die van den gezonden staat; het daardoor veroorzaakte kloppen der zijden is echter veel sterker dan in de ware ontsteking, zoodanig dat men het paard dampig zoude achten; de hoest is van den beginne af aan reeds dof en afmattende, terwijl de hitte steeds

ongelijk over het ligchaam verspreid is, zoodanig, dat bij afwisseling de ooren, lippen, voeten, heet of koud zijn, eindelijk zijn het knarsen der tanden en gevoellooze stompheid, toevallen die alleen de gedaalde levenskracht vergezellen.

- 139 De ziekte welke somtijds heerschende (epidemisch) de grootste verwoestingen onder de paarden aanrigt, en na hare gevolgen en zetel het longenvuur genaamd wordt, schijnt niet zonder grond als eene valsche longontsteking beschouwd te kunnen worden, die symptomatisch met eene heerschende koorts-ziekte gepaard gaat, en bij de meeste van eene verzwakte levenskracht getuigt, of ten minste spoedig in dezelve overgaat.

Wanneer dezelve sterke welgevoede paarden treft, is zij echter in den aanvang ontstekingsachtig, (6) en voor deze bijna altijd

(6) In alle ontstekingsziekten is het eerste tijdperk dat van vermeerderde levenswerkzaamheid welk door overspanning altijd het daarop volgende van verzwaking voortbrengt, welke in die evenredigheid grooter is als de eerste trap van verhoogde levenskracht boven den natuurlijken staat was gestegen, het zij dat zulks door de uitwerking van een ziektenprikkel op een sterk gestel was veroorzaakt, of dat een ten onpas gebruik van prikkelmiddelen, de overspanning nog meer heeft doen toenemen.

tijd doodelijk, wanneer men dezelve volgens haren waren aard niet naar de gesteldheid des paards weet te wijzigen, en dus haar in den aanvang als eene valsche ontsteking door prikkelmiddelen behandelt, of de ontstekingswerende middelen aanwendt, wanneer de staat van verzwakking reeds aanvang heeft genomen.

40 De hevigheid dezer ziekte welke zoo spoedig den hoogsten trap van levenswerkzaamheid (*sthenie inflamm. activa*) bereikt, dat zij den arts geen tijd verleent om de overspanning te beteugelen, welke door eene plotselinge diepe zinking der levenskracht, en overgang tot den staat der grootste zwakte en versterf gevolgd wordt, die alle opwekking door prikkelmiddelen vruchteloos maakt, kan bij zoodanige paarden tot voorbehoedmiddel, eene aderlating als raadzaam doen beschouwen, als het beste middel om de te sterke overspanning en daaruit voortvloeiende zwakte een perk te stellen. (7)

De

(7) De ondervinding schijnt de gepastheid van dit middel te bevestigen; bij eene heerschende borstontsteking onder de paarden van het regiment hussaren der garde, in 1807, werden diegene welke men tot voorbehoeding had adergelaten, minder hevig door dezelve aangetast, en kwamen haar het ligtste te boven, terwijl de andere aan wie men in den beginne zulks had achterwege gelaten, meestal er het slachtoffer van werden.

141 De geneeswijs der longontstekingen moet dus zoo wél na derzelve verschillend karakter en onderscheidene staten onderscheiden ingerigt en gewijzigd worden.

142 De longontsteking met vermeerderde levenskracht, (*pl. s. peripn. activa*,) waaraan gezonde, sterke, welgevoede paarden vooral bloot staan, vereischt eene spoedige hulp, tot vermindering der ontsteking door eene onverwijldte aderlating van omtrent drie ponden, die men na omstandigheden in meer of minder hoeveelheid herhaalt, wanneer de toestand der ziekte niet spoedig gunstig veranderd; ook kan het doen inademen van vochtige warme dampen, het dikwijls herhaald wrijven met stroo, en het aanwenden van verkoelende en verzachtende lavementen als gepast aangemerkt worden, gelijk ook het zetten van dragten voor de borst. Als leefregel behoort men het paard matig koel in de stal te houden; het in den aanvang der ziekte met dranken van garst of havermeel, met gele wortelen enz. in plaats van met haver te voeden, en indien de omstandigheden en het jaargetijde zulks toelaten, het op het einde der ziekte, gedurende den dag eenigen tijd in de weide zenden.

Met deze uitwendige behandeling paren men

men het inwendig gebruik van zachte buikzuiverende, verkoelende en slijmerige middelen, zoo als de wijnsteenroom, de salpeter, het wonderzout enz. in afkooksel van feneflaaden en lijnzaad of n°. 21. *a.*, en 7. *a.* waarmede men echter ophouden moet zoodra de ontsteking genoegzaam geheel verdwenen is; terwijl men wanneer de staat van verzwakking aanvangt die middelen moet toedienen, welke de oplossing der in de longen en luchtpijpen verdikte vochten kunnen bevorderen en deze versterken, zoo als n°. 1. 21. *aa.*, eindelijk besluite men de genceeswijze met n°. 22. *a. b.* dat echter niet moet toegediend worden, bevorens dat de hoest losser en ruimer, de tong en neus vochtiger geworden, en de overige toevallen van ontsteking verdwenen zijn, wanneer het voeder ook versterkende kan gegeven worden.

Ingeval uit deze ziekte een droogen hoest mogt overblijven, zoo worden tot wegneming derzelver de slijmerige middelen op gelijke wijs aangewend, als hieronder tegen den hoest voorgeschreven zullen worden.

143 Geheel tegenovergesteld aan de behandeling welke men in het tijdperk der ontsteking, bij de ware longontsteking moet waarnemen, is die, welke zoo wel in dat van het daarop volgende van verzwakking, als bij-

bijzonder in de valsche longontsteking (*passiva*) moet plaats grijpen; aderlatingen en buikzuiverende middelen zijn in dezelve doodelijk, daarentegen kunnen de dragten somtijds van nut zijn, (8) terwijl men de verstopping alleen door lavementen moet pogen weg te nemen; heeft daarentegen eene boosaardige loop plaats, zoo make men van zoodanige gebruik welke uit kamillen met bijvoeging van kamfer bestaan. Het is door vlugtige prikkelmiddelen dat men in den aanvang de levenswerkzaamheid moet trachten te vermeerderen, en te dien einde n^o. 21. c, ingeven, en herhaald met stroo wrijven.

In

(8) Zoude men ingeval deze ziekte met rede beduchtigheid inboezemde, dat de longen in versterf zullen overgaan, niet de proef kunnen nemen, om door eenen sterken tegenprikkel het gevaar van deze edele deelen af te wenden, welke daarin bestaat om met een gloeiend ijzer wederzijds van de rugwervels, achter het schouderblad den rug in de uitgestrektheid van 2 à 3 duim vrij sterk te branden; voorts door eene prikkelende etterbevorderende zalf, overdekt met eene weekmakende pap eene sterke ettering voort te brengen; of indien men zulks al niet wilde doen alhier sterkwerkende dragten te zetten.

Deze prikkeling in de nabijheid des rugmergs kan niet misfen zeer veel aandoening aan hetzelfde te veroorzaken, en zoude van de gelukkigste gevolgen kunnen zijn, door de aandoening welke door hetzelfde aan het geheele dierlijke gestel (organismus) medegedeeld wordt.

Indien de hartkloppingen verminderen, de pols langzamer en voller, de ademhaling gemakkelijker en trager wordt, zoo mag men hoop op herstel voeden. Wanneer daarbij de prikkelbaarheid vermeerdert, en de ziekte eenigzins eenen gunstigen keer neemt, zoo verwisfele men de vlugtige prikkelmiddelende tegen aanhoudende, als wilgen- of eikenbast, kalmus enz., terwijl men voorts bij aanhoudende beterfchap, toenemenden eetlust, natuurlijk ademen en weinig hoesten, no. 22. b. om de volkomene herftelling te bewerken, en voorts goed hooi en haver behoort te geven.

44 De uitflag der longontfteking, welke, wanneer deze zich als eene ware (*activa*) kenmerkt, bij eene doelmatige behandeling meestal fpoedig en gunftig eindigt, is alsdan eene volkomene verdeeling der ontfteking en daarop volgende genezing; in het tegenover geftelde geval heeft dezelve verfterf en eenen fnellen dood ten gevolge, of laat verhardingen en daaruit ontfpruitende dampigheid achter, of verftrekt ten oorzaak aan borstwaterzucht, verëttering, verzwering der long of tering, die alle als ongeneeslijke kwalen het paard vroeger of later weg-flepen.

b. De aamborstigheid of dampigheid.

145 Eene der meest gewone gevolgen eener kwalijk verdeelde longontsteking is, de uit de verhardingen in de long ontstaande aamborstigheid (*asthma*), bekend onder den naam van dampigheid (*la pousse*), en welke slechts dan eenige hoop op herstel overlaat, wanneer dezelve slechts eenen geringen trap bereikt heeft en niet verouderd is.

146 De oorzaken dezer kwaal, voor welke vette, korthalzige paarden van zekeren ouderdom het meeste vatbaar zijn, bestaan in verkouding, schielijke verandering van voeder, het gebruik van nieuw of slecht hooi, en te veel voeder bij te weinige beweging; voorts groot verlies van bloed, voorafgaande ziekten: als borst- en long-ontsteking, de droes, te schielijk opgedroogde of kwalijk genezene zweren, verkeerd behandelde en teruggedrevene huidziekten, loop enz.

147 De kenteekenen die dezelve oplevert, bestaan in eene verminderde levendigheid, eenen doffen korten herhaalden hoest, vooral des morgens; het paard ademt met opgesperde neusgaten in en met gedruisch weder uit, waarbij de zijden slaan, de ribben en buik krampachtig ingetrokken worden, terwijl het met dit al eene schijnbare ge-

gezondheid en eenen goeden eetlust bezit; al deze toevallen nemen toe wanneer men zulk een paard eenigzins sterk doet bewegen, of het in eenen warmen stal plaatst, vooral wanneer het veel hooi heeft gegeten, doch verminderen wanneer het in de weide of op stal groen voeder geniet.

148 In de geneeswijze moet men zich naar de oorzaken rigten, en in de geheele ziekte het hooi volstrekt onthoudende, alleen stroo en haver in eene mindere hoeveelheid geven; voorts het paard warm dekken; met brandewijn en zeep wassen en slechts eenen matigen arbeid doen verrigten.

Allerheilzaamst is in het begin dezer ziekte het dagelijks voederen van twee of drie oncen ijslandsche mos, het ingeven van ontlastende middelen: als braakwijnsteen en dubbelzout, hierbij voegende indien de ziekte van eenen krampachtigen aard is, n^o. 23 *a*, *b* en *c*. en zette vooral een dragt vóór de borst.

c De hoest.

149 De hoest (*tussis*) (*la toux*), welke zonder eene andere ziekte te verzellen of te volgen, zich als eene bijzondere ongesteldheid van de werktuigen der ademhaling openbaart, (*tussis*

idiopathica), kan men onderscheiden in eenen droogen en in eenen vochtigen hoest, bij welke laatste eene of andere vochtigheid uitgeworpen wordt, en die zich vooral ontdekt wanneer het paard bereden is.

150 De oorzaken van dezen hoest kunnen voortgebracht worden, door verandering van jaargetijde, verkouding, ingeademd stof, te sterke inspanning, slechte vochtige duffe stallen en vorige ziekten.

151 Een korte drooge hoest uit de beide eerste oorzaken ontstaande, kenmerkt of dreigt meestal het begin eener ontsteking der long en vereischt bijna eene gelijke behandeling, waartoe behoort dat men zoo wel in dit als alle andere diergelijke gevallen, waarin paarden door hoest aangetast worden, dezelve in zuivere, luchtige, gematigde en togtvrije stallen plaatst; hun warme dampen doet inademen, zuiver voeder zonder stof, doch geen of weinig hooi geeft, slijmerige middelen als heemst- (*althæa*) en graswortel, arabische- of draganthgom doet gebruiken; het driemaal daags een slixbrok of drank van $\frac{1}{2}$ ons wonderzout (zwavelzure soda) en 2 dr. salpeter met honig of lijnzaadwater, no. 24 of 25 geeft, doende daarbij in hooger trap van ziekte of uitblijvende beterschap

fchap eene aderlating en zette des noods bij eene hardnekkige drooge hoest dragten aan de dijen.

Ontstaat dezelve door ingeademd stof zoo make men van dampbaden, en het ingeven van garst- of lijnzaadwater gebruik.

Daar de oorzaak welke slecht hooi oplevert in de eerste wegen gelegen is, zoo geve men het paard buikzuiverende middelen met bijvoeging van braakwijnsteen (gespiesglansde wijnsteenzure potasch) en wonderzout, voorts slijmerige dranken en lijnkoekwater.

Is de oorsprong der kwaal aan eenen kwalijk genezenen of verplaatsten droes, verzuimde verkoudheid of longontsteking toe te schrijven, zoo is dezelve vaak met het volkomenste gevolg genezen, door het purper vingerkruid (*herb. digit. flor. purpurea*) waarbij men van 2 tot 8 en 10 grein dagelijks opklimt, en te dien zelfden einde 2 schrapels bij n°. 25 voegt.

52 Eene zwakke vochtige hoest vereischt goede haver- en meeldranken, en het ingeven van n°. 26 a.

Ontstaat dezelve door zwaren arbeid, zoo late men het eerst rusten en daarna zich slechts matig in de opene lucht bewegen.

Is de hoest krampachtig zoo geve men n°. 26 b.

*Ziekten der ingewanden.**a. Het kolijk of buikwee.*

153 Het kolijk of buikwee (*colica*) *la colique*, *les tranchées*), wordt na deszelfs oorzaken in wind- kramp- worm- en zoogenaamd lood- kolijk of datgene het welke door vergiftiging veroorzaakt wordt, onderscheiden.

154 De algemeene toevallen en ken- teekenen zijn; verstopping of doorloop, grove flecht verteerde, vaak met slijm be- dekte mist; herhaalde pogingen van het paard om deszelfs water te lozen; het geeft voorts deszelfs smert door krabben met de voorvoe- ten te kennen, draait het hoofd weemoedig naar den buik, werpt zich neder, wentelt zich en springt weder op. Bereikt het toe- val eenen hoogen trap zoo gaat het als ra- zende te werk, waarbij het echter deszelfs meester en oppasser kent, hetgene bij de kolder geen plaats heeft.

155 Het wind-kolijk kenbaar aan eenen opgeblazen buik en zijden en het romme- len der winden, wordt veroorzaakt, door overvoederen vooral van opblazende kruiden, als jonge natte klaver, nieuw ongebroeid hooi, enz.

enz. door fcherpe lichamen, bijzonder door vergiften, door verftopping van den aarsdarm, door harde mist enz.

156 In de genezing moet men even als in alle ziekten de oorzaken zoo veel mogelijk trachten op te fporen ten einde deze naar dezelve te wijzigen. Men zoek zoo fpoedig mogelijk de winden te doen ontlasten door lavementen, welke in het algemeen in alle kolijken meer dienst verleenen dan inwendige middelen, en waarbij men steeds van de zachtste tot de meer prikkelende moet opklimmen: dus geve men eerst n°. 39, *a*, dan *b*, en éindelijk *c*; men wrijve het paard met ftroowiften, giete het koud water fchielijk en met geweld op het lijf en wrijve het droog; doe het eene matige beweging in den ftap verrigten, doch rijde het nimmer fterk, en zorg het een goed legftroo heeft; men trachte, indien men de oorzaak aan verftopping toefchrijft, de mist af te halen, en vooral indien de hevigheid der pijnen eene ontfteking dreigt of aankondigt, deze door ééne of des noods herhaalde kleine aderlatingen weg te nemen of voor te komen; voegen zich krampen bij het windkolijk zoo menge men in de lavementen 1 drachma opium of 2 dr. duivelsdrek, terwijl men inwendig n°. 33, *a* en vervolgens

33, *b.* geeft, wanneer het kolijk opgehouden is om de ingewanden te versterken, tot welk einde men het tevens ijzerwater kan doen drinken.

- 157 Ontstaat het kolijk door verkouding, zoo moet men in de eerste plaats door n°. 33 *a.*, en de lavementen van n°. 39. ontlasting pogen te bewerken, en voorts daarbij door eene matige beweging het wel toege-
dekte paard uitwafeming trachten te bezorgen en de huidkramp weg te nemen, waartoe men het n°. 38 ingeeft.

Openbaart zich het kolijk na het schielijk drinken van koud water, zoo geve men het paard eene flesch warm bier in, doe het leiden, met stroo wrijven en warm toedekken.

- 158 Het kramp-kolijk hetwelk door verschillende oorzaken ontstaan kan: als door ontsteking der ingewanden of werktuigen der spijsvertering, door onverduwelijheid (indigestie), verstoppingen, verkouding, onzuiverheden, vergiften, wormen, enz. vereischt dat men, indien zulks mogelijk is, in de eerste plaats de naaste oorzaak uit den weg ruime en de door haar veroorzaakte gevolgen te keer ga.

- 159 Deze is de ontsteking der ingewanden
wel-

welke of deze kolijken voorafgaande, dezelve veroorzaakt of opvolgt, kenbaar aan de vermeerderde toevallen, toenemende pijn en harde kleine pols, verdienende des te meer opmerkzaamheid wijl indien dezelve niet verdeeld kan worden, zij het toeval in versterking en den dood, of in uitterende kwalen doet eindigen.

160 Men poge dus dezelve weg te nemen door aderlatingen, welke men bij het minste vermoeden van ontsteking nimmer verzuimen moet, zelfs dan, wanneer de bij de ontsteking der buiks-ingewanden vaak bedriegelijk, klein en snel zijnde pols, zulks niet schijnt te vorderen; voorts door lavementen, het gebruik van stortbaden, van koud water; dat van warm zemelwater met malva- (kaasjes) en glaskruid; het ingeven van n°. 35 *a*, *b* of 36. Men vermijde alle verhittende middelen en zouten, waarom ingeval men bemerkt dat de laatste te sterk prikkelen, men n°. 37 zoo wel tot ingeven als tot lavementen bezigen moet.

Houden de toevallen op, zoo geve men een zacht buikzuiverend middel als van 6 oncen wonderzout met 4 oncen honig in een pint lijnzaadwater opgelost, voorts, geen hooi maar weinig en ligt verteerbaar voedsel, als zemelen, haver- of garsten-
 I 5 meel,

meel, enz. en vare hiermede eenige dagen van aanhoudende beterichap voort, welke men aan het ophouden der toevallen en het terugkeeren van den eerlust herkent, als wanneer men het langzamerhand weder aan het gewone voeder gewent en de kuur met n°. 33, b. of 34 befluit, en voorts waarneemt om na alle kolijken, het groene voeder, koud water, en baden te vermijden, maar daarentegen het paard olieachtige zaden en meeldranken te doen gebruiken.

- 161 Het door onverteerbaarheid (indigestie) voortgebragte kolijk, een zeer veel plaats hebbend toeval, ontstaat, of door de zwakte der ingewanden om het voedsel te verteren, of uit het genot van opzwellend de maag overladend voeder, als rogge, klaver, enz. of uit deszelfs overmatige hoeveelheid, die dikwijls door het bersten der maag gevolgd wordt, alsmede door den plotselingen overgang van lang genoten zacht en week voeder, b. v. gras, meel, enz. dat de ingewanden verslapt heeft, tot zeer hard, als erwten, boonen, rogge, enz., of wel door sterke beweging kort na of vóór het voeder, waarvan het eerste de spijsvertering floort, en deze in het laatste geval de vereischte kracht er toe doet misfen.

Dit alles geeft aanleiding tot dit toeval,
dat

dat vooral in eene maagkramp bestaat, en waarvan de kenteekenen genoegzaam met die der andere kolijken overeenstemmen; echter moet men om de oorzaken te kennen, de levenswijs en behandeling van het paard onderzoeken, hetgene als eenen algemeenen regel ter beoordeeling van den aard des toevals aangemerkt dient te worden.

In het algemeen hebben de door deze ongesteldheid aangetaste paarden dikwijls, doch weinig ontlasting, waarop, indien de natuur of kunst geene gunstige verandering te weeg brengt, eene volkomene verstopping met ontsteking gepaard, of door deze gevolgd, te wachten is.

162 Tot genezing beginne men even als in alle andere hevige kolijken, met het doen eener naar omstandigheden geëvenredigde aderlating, voorts zette men alle vieren-deel uurs een lavement, zoo als hiervoor in n°. 39. *b.* is voorgeschreven, waarvan de warmte des waters bijzonder tot de ontspanning toebrengt, terwijl men inwendig n°. 33. *a.* ingeeft.

163 Maar al te vaak wordt zoo wel dit, als het krampkolijk door verstopping gevolgd, moctende men om deze gevolgen te doen ophouden, de oorzaken tegenwerken, tot
wier

wier ontdekking de volgende kenmerken zich aanbieden, dat indien dezelve uit overeeten of uit opblazende voedsels bestaan, het paard van de krib terug treedt, deszelfs lijf zwelt, de adem wordt benomen, en alle toevallen van kolijken vertoonen zich, waarvan men het paard moet pogen te genezen, door het op de boven beschrevene wijs te behandelen, even als bij het uit verstopping ontstane kolijk opgegeven is.

b. De loop.

164 Men kan deze kwaal naar deszelfs trappen en oorzaken in een gewone buikloop (*diarrhœa*) *cours de ventre*) en pers- of bloedloop (*dyssenteria*) *dissenterie*) onderscheiden, terwijl zij daarenboven naar de ingewanden, welke meer bijzonder door de ziekte aangedaan worden, onderscheidene kenmerken oplevert.

165 De oorzaken zijn meest te zoeken in verkouding, ongezond water, flecht voedsel, verandering van droog en groen voeder, te zwaren arbeid, vooral in de hitte; te veel rust, besmetting en te sterke buikzuiverende middelen; terwijl de gewone buikloop dikwijls ook andere ziekten als een toeval verzelt.

166 Allergewigtigst is het de onderscheidingen-kenteekeenen gade te slaan, die de verschillende soorten en trappen dezer ziekte aanduiden, ten einde deze volgens haren aard te behandelen.

167 Ontstaat de loop uit eene gebrekkige afscheiding der gal, (de zoogenaamde leverloop) zoo is de afgang groen of geelachtig en wordt met pijn ontlast.

Door opgehoopte slijm voortgebragt, is deze met veel slijm en somtijds met wormen vermengd.

168 In die welke uit zwakte der verteringswerktuigen ontstaat, (*lienterie*) is de mist slechts weeker, niet te zamenhangende en met onverteerd voeder vermengd; de minst bedenkelijkste is die wanneer de afgang slechts dunner en menigvuldiger dan gewoonlijk is; doch in aard met den gezonden overeenstemt, terwijl het paard geene zwakte vertoont.

169 In den buikloop, welke men oneigenaardig met den naam van vet smelten bestempelt, en die alleen eenen hooger trap van loop is, die door langdurigheid gewoon (*habitueel*) geworden is, is de mist vast, doch met een slijm bekleed welke deze het voorkomen van gesmolten vet doet verkrijgen.

De

- 170 De hoogſte trap van den loop (*dyſſenterie*) wordt gekenmerkt door het plaatſelijk lijdèn der darmen, door ſterke en pijnlijke perſing, gevolgd door weinig afgang van onderſcheidene geſteldheid, beſtaande in kleine, met witte ſlijm overtrokkene keutels, terwijl het overige eene geelachtige of bloedige vochtigheid uitmaakt.
- 171 Bij de genezing dezer ziekte behoort men het karakter en de oorzaken derzelve op te ſporen, daar hierna de behandeling gewijzigd moet worden.
- 172 Heeft de loop een ontſtekend karakter, en is dezelve met waarſchijnlijkheid aan verkoudheid toe te ſchrijven, zoo geven men in den beginne n°. 40. daarna opium, n°. 44. en 45. lijnzaad en meeldranken, ſlijmerige lavementen, dampbaden en een warmer ſtal dan gewoonlijk, ten einde de uitwaſeming te herſtellen, en de door verkeerde afſcheiding veroorzaakte prikkeling der ingewanden weg te nemen, waarbij men als lavement n°. 39. *e.* voegt, voorts na eenige beterſchap zachte middelen, terwijl men om de voortdurende hebbelijkheid des afgangs te matigen, ſterke herſtellende middelen, zoo als n°. 44. met aluin en een weinig opium bij n°. 41 geven kan.

In

173 In de galachtige of leverloop geven men eerst n°. 40, en lavementen van zemelwater met wat wijnsteenroom, vervolgens n°. 42 en eindelijk n°. 44 met meel- en lijnzaaddranken.

74 Kondigt het karakter der loop zwakte en geneigdheid tot ontbinding der vochten aan, zoo moet deze als eene rotkoorts behandeld worden, terwijl tegen eenen geringen trap van den loop, een flap afkookfel van eikenbast met opium, in lijnzaadwater, en in eenen hooger trap derzelve indien de omstandigheden zulks vereischen aluin, kamfer en wijn in slijmachtige afkookfels ingegeven moet worden. Op gelijke wijze moet diegene welke uit eene ongesteldheid der zenuwen ontspruit, als eene zenuwkoorts behandeld en voorts n°. 45 ingegeven worden; voorts herstelt men de zwakte der verterings-werktuigen door bittere middelen n°. 34, *a.* eene matige beweging in de opene lucht, goed droog voeder, frischen drank en bewaring voor koude.

Ontstaat de loop uit te veel rust, gebrek-kige afzondering of opgehoopte vuiligheden in de ingewanden zoo geven men n°. 40.

75 Is dezelve alleen aan de eigenschap of verandering van het voedsel toe te schrijven,
of

of als eené poging der natuur te befchouwen, om fchadelijkheden te verwijderen, zoo is in het eerfte geval voldoende om het voeder te veranderen, terwijl men in het tweede, zich wel hebbe te wachten om door opftopping de natuur tegen te werken, daarentegen is het zeer heilzaam in eene hebbelijk gewordene loop, door het zetten van een dragt voor de borst, den prikkel weg te nemen die de ziekte te weeg brengt, en daarbij n°. 44 te geven.

Voegt zich de loop bij eene andere ziekte, zoo geve men n°. 44, en vervolgens n°. 41, welk laafte middel mede zeer dienftig is, wanneer de oorzaken in zûren in de maag gelegen zijn.

- 176 In alle toevallen welke het darmkanaal aandoen, geve men alle geneesmiddelen in kleine hoeveelheden maar dikwerf in een of ander flijmerig middel, om de ingewanden des te minder te prikkelen; terwijl men vooral van lavementen veel verwachten kan; daar en boven zijn inwrijvingen van fpaanfche vliegengalf fomtijds zeer dienftig, en in alle buikloopen bij gedaalde levenskracht, met eene drooge huid, groote pijn, perfingen en krampachtige toevallen is de opium en duivelsdrek als een hoofdmiddel aan te merken.

177 Het tegenover gestelde van den loop is verstoptheid welke veelal op kolijken volgt en tot wier wegneming aldaar de middelen opgegeven zijn, waartoe men zeer ten onpas buikzuiverende middelen zoude aanwenden; de beste daartegen zijn in het geven van groen voeder des zomers en meel- of zemelwater des winters gelegen. In het algemeen zijn de buikopenende middelen in de meeste gevallen als onzeker en gevaarlijk aan te merken, en slechts in eenige weinige ontstekingsziekten als gepast te beschouwen, kunnende men alsdan zonder gevaar ook het volgende zeker en goedkoop middel gebruiken, bestaande in een pond rozijnen in een kan water tot op de helft te doen verkooken en in eens in te geven, daar anders in de meeste ziekten de lavementen verreden voorrang verdienen.

c. De verlorene eetlust.

178 Hoe zeer de natuur zich niet ongestraft door de kunst tot eene sterkere spijsvertering laat dwingen, en dus alle door bedrog en onkunde uitgevondene middelen welke men aanwendt om het paard tot een meerder genot van voedsel aan te prikkelen dan het tot instandhouding der gezondheid noodig heeft, als de eerste oorzaken van derzelve

storing zijn aan te merken, kunnen echter ongesteldheden der ingewanden en vergaderde slijm in de maag, of deszelfs zwakte de werkzaamheid der verteringswerktuigen stremmen, welke alleen door eene aanprikkeling hersteld kan worden; hiertoe geve men als voeder, radijs, ramenias en peperwortel, en op ieder havervoeder een lepel vol van n°. 46. *a.* of *b.*; gewoonlijk is een lepel vol mosterdzaad en keukenzout, zelfs alleen het laatstgenoemde, wanneer men van andere middelen verftoken is, in de meeste gevallen toereikende om den eetlust te herstellen, terwijl men de hoeveelheid van het hooi en haver vermindert, en naar evenredigheid der terugkeerende graagte weder langzaam vergroot.

Men lette voorts of het paard al of niet naar deszelfs voeder tracht, in het eerste geval heeft eenig plaatselijk gebrek plaats, het zij in den mond, aan de tong of in de keel, of wel eene kwade smaak in den mond, welke men meermalen met azijn en zout moet uitwaschen; edoch men vermijde de te regt afgekeurde gewoonte om den mond door het afslaan van de punten der kiezen, zoo als men het noemt, te doen schoon maken; weigert het daarentegen het voeder, zoo onderzoekte men of dit ook bedorven of de krib vuil is, moettende men
in

indien geen van beide plaats heeft, het 24 uren doen vasten: welk middel insgelijks met vrucht kan worden aangewend, wanneer de oorzaak in het overladen der maag door de op eens gegevene te groote hoeveelheid voeders is te wege gebragt.

d. Wormen.

179 Onder de toevallen welke de ingewanden treffen, kunnen er verscheidene aan eene onmatige hoeveelheid wormen, van verschillende foorten worden toegeschreven; die zich, het zij de maag of ook de darmen ten woonplaats uitgekozen hebben, zijnde het dus deze van welke men het paard moet trachten te bevrijden, waartoe een zeer gemakkelijk middel zich aanbiedt, in 4 of 6 oncen glinsterend schoorsteenroet in een pint melk ontbonden in te geven, waarmede men eenige dagen voortgaat, en vervolgens n°. 28. c. ingeeft, terwijl daar zwakte der ingewanden gewoonlijk met wormen verzeld gaat, zoo geve men daarna n°. 8. en 9, na het ophouden der kenteekenen van het aanzijn der wormen.

Als eenvoudige hulpmiddelen wordt het geven van een handvol rijnvaren-kruid (*herb. santonici*), zelfs dat van een handvol gemeene tabak, op het eerste voeder, als een middel

aangeprezen, dat dikwerf krachtdadig tot hunne verdrijving medewerkt.

V I J F D E A R T I K E L.

Ziekten van de werktuigen der pisonlasting.

De opstopping van het water.

180 De opstopping van het water, een niet zeldzaam toeval, hetwelk eene spoedige en krachtdadige hulp vereischt, ontleent deszelfs aanzijn uit verschillende oorzaken, als uit verkouding, winden, verstopping, kwetsing, voorafgaande ontsteking, verharding der voorstaanklieren, verlamming der blaas, taaije slijm of zand in dezelve: terwijl de door deze veroorzaakte toevallen merendeels van eenen krampachtigen aard zijn.

181 Men ontdekt hetzelfde aan de volgende kentekenen: het paard is benaauwd, ziet angstig naar de zijden; doet gedurig pogingen om het water te lozen, het stampet en krabt met de voorvoeten, terwijl deszelfs ademhaling onregelmatig is.

182 De oorzaken geven de geneeswijze aan de hand, welke vooral daarheen moet strekken om door bewerking van ontspanning de
kramp-

krampachtige toevallen te doen ophouden, door warmte, lavementen, en des noods door aderlatingen; men gebruike als lavement n°. 39. *f.* en geve inwendig n°. 47. *a.* en *b.*

Eene geringe opstopping kan men dikwijls door plaatsing in eenen warmen schapenstal, het leggen van warme omflagen op de lendenen, het inbrengen van zeep of tabak in de schede of van eene pissebed in den koker, gepaard met eene zachte beweging, doen ophouden.

Ontstaat dezelve door ontsteking van de blaas of der nieren, zoo moeten aderlatingen en lavementen in het werk gesteld en slijmerige en verzachtende middelen ingegeven worden.

183 Tegen de zoogenaamde koude pis, of louterstal, die uit verkouding ontstaat, zijn slijmerige middelen, verkoelende dranken en aderlatingen als raadzaam aan te merken.



VIERDE HOOFDDEEL

DE TOEVALLLEN DOOR UITWENDIGE OORZAKEN VOORTGEEBRACHT, OF DIE ZICH UITWENDIG AAN HET LIGCHAAM VERTOONEN.

EERSTE ARTIKEL.

De vergiftigingen.

184 Hoe zeer in oorsprong en uitwerkingen onderscheiden, stemmen echter de vergiftigingen daarin overeen, onverschillig of zij hunnen oorsprong uit het delfstoffelijk, groeistoffelijk of dierenrijk ontleenen, dat zij het levensbeginfel op de verwoestendste wijze aantasten en indien geene onverwilde en gepaste hulp hunnen voortgang stuit, de hevigste toevallen met eenen snellen dood doen besluiten.

Vele vergiften uiten hunne schadelijkheid door hunne overmaat of verkeerde aanwending, terwijl zij in eene juist berekende gave toegedeeld tot de heilzaamste geneesmiddelen verstrekken; dezelve doen zich dus door hunne verderfelijke uitwerkingen kennen wanneer deze evenredigheid overtreden wordt, welke de ondervinding leert dat bij de onderschei-

de-

dene diersoorten aan groote wijzigingen onderhevig is; of ook, wanneer onkunde of achteloosheid oorzaak zijn dat giften binnen in het ligchaam gebragt worden, die alleen uitwendig hunne werking hadden moeten verrigten.

a. De delfstoffelijke vergiften.

185 De delfstoffelijke zijn degene die zich het eerst aan onzen aandacht aanbieden, en bestaan uit die welke uit het kwikzilver, rattenkruid, koper, lood, spiesglans en derzelver bereidingen, de delfstoffelijke zuren enz. hunnen oorsprong ontleenen, terwijl men daaronder ook de nadeelige gevolgen kan rekenen welke door het overmatig en ongepast gebruik van sommige middelzouten veroorzaakt wordt.

Met uitzondering van die welke door de loodgiften voortgebragt worden, welke zamentrekkend en langzamer doch niet minder nadeelig werken, brengen de andere delfstoffelijke giften, zoo als het rattenkruid, het spaanschgroen, de kwik- en spiesglansbereidingen door den hun eigen scherpen prikkel, de hevigste ontstekingen der ingewanden te weeg, gelijk mede dit door de zwavelzout- en salpeterzuren veroorzaakt wordt.

186 De eerste vordering tot redding is onverwijde hulp ter beteugeling van den voortgang der werking dezer vergiften, zoo door hunne scherpte te omzwachtelen als hen te ontbinden. Men bewerkt zulks bij alle door het ingeven eener ruime hoeveelheid vette zelfstandigheden zoo als olie, ongezoutene boter enz.; terwijl men tevens tot ontbinding van deze alle, (met uitzondering van die uit lood,) loogzoutige bereidingen, vooral van zeep in eene aanmerkelijke gift, met veel zoete melk ingeeft, en bij de loodgiften 1 a 2 drachma aluin met 2 a 4 drachma opium toedient; zijnde voorts in de mijnstoffelijke zuren, alleen verdunnende en met dezelve in verwantschap staande middelen in staat derzelve schadelijkheid te verminderen.

b. De groeistoffelijke vergiften.

187 De groeistoffelijke vergiften werken meestal verdoovend op het gevoel, zoo als de opium, scheerling, de nachtschade, kraan-oogen, de taxis en meer andere, of wel bijtende zoo als de witte nieswortel, de wolfs-melk enz.

Van de eerste doet eene geringe hoeveelheid weinig nadeel aan het paard, terwijl men diegene welke door grootere te weeg gebragt worden, het beste door groeistoffelijke zu-

zuren als azijn, alsmede door melk en olie tegengaat. Schadelijker dan deze is de taxis welke zelfs in kleine hoeveelheid als doodelijk voor het paard wordt opgegeven.

188 Het tweede foort van plantgiften die door hare bijtende eigenschappen, die zich zelfs bij het uitwendige gebruik aan den dag leggen, en dus zoo veel te meer inwendig de hevigste ontstekingen veroorzaken, vereischen dat men deze door het ingeven van slijmerige en olicachtige middelen, zoo als olie, lijnzaad-drank, melk enz. onschadelijk pogen te maken.

189 Behalve deze zijn er nog eene menigte plantgewassen zelfs onder de gewone voederkruiden vermengd, welke zoo al geene doodelijke, ten minste eene zeer nadeelige uitwerking op de gezondheid te weeg brengen, welke nog grooter zoude zijn, ware het niet dat plantëtende dieren dezelve in veel grooter hoeveelheid kunnen verdragen dan de vleeschëtende; des niettegenstaande blijft het allerraadzaamst, zoodra men bij het genot van eenig nieuw voeder of weide, verscheidene paarden aan eene gelijkvormige ongesteldheid ziet lijden, hetzelfde te onderzoeken, in allen gevalle het te veranderen

en des noods de vereischte tegengmiddelen in het werk te stellen.

c. De dierlijke vergiften.

190 De dierlijke vergiften zijn tweeledig, namelijk die welke door den beet of de steek van eenig dier, en die welke door besmetting aan het ligchaam medegedeeld worden.

Tot de eerste behooren bovenal de beet van dolle honden, die der adders, en de steek van gekorvene diertjes, zoo als van wespen en hofels; Van welke eerste als het gewoonlijkste en gevaarlijkste, alleen hier kortelijk melding zal geschieden, en van de andere hier slechts ter loops met weinige woorden gewag behoeft te worden gemaakt, daar de beet der adders slechts in die landen te duchten is, waar dezelve door menigvuldigheid en warme luchtstreek het paard aan de doodelijke gevolgen van dit toeval blootstelt, terwijl de steken van infekten wel van pijnlijken doch niet dan door hunne menigte van gevaarlijken aard zijn en men dezelve door inwrijven van warme olie spoedig kan doen verdwijnen.

a. *De dolle hondsbeet.*

191 Bij deze is het meeste van uitwendige
mid-

middelen te verwachten; men brandt of snijdt de wond zoo ver mogelijk is uit, kerft en bestrijkt ze met spiesglansboter, na ze in het eerste oogenblik met zout en azijn of scherpe zeepzieders loog uitgewaschen te hebben, moetende men, indien de plaats zulks niet toelaat, de wond met zoutzuur bevochtigen en met poeder van spaansche vliegen bestrooijen, terwijl men als inwendig middel n°. 50., of om den anderen dag 3 drachmas nachtschade-wortel (*r. bella-donna*) kan geven.

d. De vergiftigingen door besmetting.

192 Onder de dierlijke vergiften kan men ook die ziekten rangschikken, welke zich door mededeeling voortplanten, en tot naaste oorzaak van ziekte verstreken kunnen, zoodanig is de droes, de kwade droes, de worm, de schurft, in een woord al die kwalen welke men door den naam van besmettelijke (*contagiosa*) gekenmerkt heeft, wier aard en geneeswijs op onderscheidene plaatsen afgehandeld is, en waaromtrent alhier alleen als eenen algemeenen regel voorgeschreven wordt: dat men de zorgvuldigste afzondering tusschen de gezonde en de door eenige zoodanige ziekte aangetaste paarden moet daarstellen, en alle middelen tot derzelver voortplanting wegnemen.

De huidziekten.

193 Bijzonder komen diegene alhier in de eerste plaats in aanmerking, wier oorzaak men aan besmetting moet toeschrijven, zoo als de verschillende soorten van schurft enz.

α. De schurft.

194 De schurft, (*scabies la gale*) is eigenlijk eene huidziekte, wier oorzaken aan onzuiverheid der huid, besmetting, nat en warm weder, gepaard met ongenoegzaam en slecht voedsel kunnen toegeschreven worden; weshalve paarden die groote vermoeijensissen en gebrek uitgestaan hebben, zoo als in veldtogten, vooral voor deze kwaal vatbaar zijn, die vaak onder dezelve de grootste verwoestingen aanrigt.

195 Men onderscheidt dezelve in twee soorten, namelijk: in de vochtige of natte, (*scabies sicca*) en in de drooge, (*scabies humida*) *les dartres*), waarvan de eerste uit blaasjes bestaat, die een scherp vocht ontlasten, dat ten laatste roven en pijnlijke gaten veroorzaakt; terwijl de drooge uit meelachtige schubbige korsten bestaat, die

die verouderd zijnde, vele kleine vleeschachtige uitwassen bedekken en voortbrengen.

Beide soorten zijn ten hoogste aanstekende, en breiden zich trapswijs meer en meer uit, indien geene gepaste middelen daartegen in het werk worden gesteld. In den aanvang zijn het slechts kleine plaatsen die er door aangetast worden, de haren verliezen aldaar hunnen glans, de jeukte doet het paard dezelve wrijven, hetgene hen doet uitvallen en de scharftuitflag vertoont zich; bij verderen voortgang en verwaarloozing dezer ziekte, verspreidt zich niet alleen dezelve meer en meer over de oppervlakte des ligchaams, maar de ziektestof zelve wordt in het ligchaam opgeslorpt, zulks doet deze kwaal hebbelijk worden, en eenen voortgang bekomen, die niet alleen de hulpmiddelen den hardnekkigsten tegenstand biedt, maar niet zelden den dood des diers ten gevolge heeft.

196 Hoe moeilijk ook deze ziekte in haren hoogsten trap te genezen moge zijn, zoo gemakkelijk is dezelve echter in derzelver aanvang weg te nemen.

Tot derzelver voorkoming staan in de eerste plaats de voorschriften van zindelijkheid boven aan; vlijtig poetsen en wasschen tot zuiver houden der huid, luchtige stallen en zuiver legstroo met genoegzaam goed
vee-

voeder, waarbij men, ingeval zich dezelve onder de paarden openbaart, de strengste afzondering tusſchen de gezonde en befmette voegen moet, zijn de beste voorbehoedmiddelen.

Deze zelfde middelen behooren ook de eerste te zijn die men bij de genezing aanwenden en nimmer verzuimen moet: men wasche voorts het geheele paard dagelijks met ſterk zeepſap, potaſch of houtaſch-loog, of om den anderen dag hiermede, late het dus ſtaan, en poetſe het den volgenden, terwijl men de aangedane zichtbare plaatſen met aluin en tabakswater en zoo dezelve onttoken zijn met kalkwater waſcht, terwijl men voorts tegen de natte ſchurft, het middel van profefſor DUPUITREN, dat door het geneeskundig beſtuur tegen de ſchurft bij den menſch aangeprezen is, met vrucht zoude kunnen beproeven. (9)

De-

(9) Hetzelve beſtaat daarin dat men 4 oncen zwavel-lever, (gezwavelde potaſch,) *sulphuricum potassæ*) oploſt in 2 ponden water in eene aarden pan van genoegzame grootte, en voorts $\frac{1}{2}$ drachma vitriool-olie (zwavelzuur,) (*acidum sulphuricum*) bijvoegt, onder geſtadig roeren met een ſtokje, hetgene eene opbruifing veroorzaakt, na welks einde men dit mengſel in eene welgeſtopte glazen fleſch bewaart.

Zoo veel mogelijk bereide men hiervan dagelijks de vereiſchte hoeveelheid, ten einde het deſzelfs kracht niet verlie-

Deze uitwendige behandeling is in de meeste gevallen toereikende om eene eerstbeginnende schurft weg te nemen. Is dezelve reeds van eene zekere uitgebreidheid, is zij verzuimd of vindt men deze uitwendige middelen niet toereikende, zoo geve men inwendig n°. 69. *a. c.*, vervolgens n°. 69. *b. d.* en bij verouderde algemeene schurft n°. 69. *e.*

197 In de drooge schurft heeft de ondervinding geleerd, dat inwendig het gebruik van 69. *a.* en het bestrijken driemaal daags der vlekken met n°. 69. *g.*, gepaard met eenen zacht voedenden leefregel, bestaande uit goed hooi, $\frac{1}{3}$ haver en $\frac{2}{3}$ zemelen, de beste gevolgen heeft gehad.

Is de ziekte zeer geworteld en uitgebreid, zoo bestaat het middel waarvan men het meeste verwachten kan, daarin, dat men het paard naar evenredigheid van deszelfs krachten aan twee of zelfs aan de vier beenen dragten zet.

Het voedsel moet in het algemeen goed en krachtig zijn, en is het mogelijk in eene
goe-

lieze; men wasche met hetzelfde tweemaal daags de aangeraste plaatsen, late eenigen tijd daarna verloop en wasche vervolgens dezelve met schoon water af, of doe het paard baden, waarvan vooral in zeewater veel goeds te wachten is.

goede voorjaarsweide, of uit goed gras en distels bestaan, welke laatste getoond hebben allerheilzaamst te zijn, niet alleen in alle huidziekten, maar ook in alle die der opflorpemde vaten, daar dezelve de spijsvertering bevorderen, en tevens eene zachte ontlastende eigenschap bezitten.

- 198 De manenfchurft en zoogenaamde staartworm, waarvan de eerste meestal paarden met vette zware halzen overkomt, zijn slechts mindere en plaatselijke trappen dezer kwaal, en vereischen tot hunne wegneming eene voortgelijke geneeswijze.

b. Het verharren.

- 199 Het uitvallen der haren dat dikwijls de huidziekten verzelt, of op dezelve, zoo als ook op andere ziekten volgt, heeft zelfs in den gezonden staat op vaste tijdperken plaats, en wordt door eene wijze werking der natuur te wege gebragt, ten einde het paard eene aan de tempering der jaargetijden geëvenredigde bedekking te geven.

Wij zien dus dat in het najaar tegen het naderen van den winter, als ook wanneer de paarden aan de guurheid des weders blootgesteld zijn, derzelver huidharen dikker, grover en langer worden, bijzonder die,
wel-

welke gevoelige en meest aan koude blootgestelde deelen moeten dekken, gelijk de ooren, onder de kaken, den buik en de beenen; minder heeft zulks echter bij paarden plaats, die uit warme dan die uit koude landen afkomstig zijn, en in dezelve leven.

Zoo lange de strengheid des jaarsgetij's deze warmere bedekking nuttig en noodzakelijk maakt, behoudt het paard dezelve, edoch met de aankomst der lente, wanneer eene zachtere lucht haar niet alleen overtoellig maar zelfs lastig zoude doen worden, ontflaat de steeds wijze natuur het dier trapswijs van dezen warmen winterrok, de grove haren sterven, vallen uit en worden achterevolgens door zachtere en kortere vervangen, die in het najaar weder voor deze plaats maken.

200 Wij maken alleen van dit natuurverschijnsel gewag, om tegen de misbruiken te waarschuwen, voortgebragt door een onzinnig denkbeeld van schoonheid, welke alles doet aanwenden om de paarden ten allen tijde even glad van haar te doen blijven, wijl zulks niet bewerkt kan worden zonder de natuur geweld aan te doen, en den grond tot een aantal ziekten te leggen, wier ware oorzaak door de kortzigtigheid niet bespeurd wordt.

Overbodig zoude het zijn wijdloopig te be-
toogen, dat de pogingen der natuur tot eene
nieuwe huidbedekking, eene vermeerderde
levenswerkzaamheid vordert, die niet anders
dan ten koste van andere werkzaamheden
des dierlijken gestels volbragt kan worden,
waardoor in dat tijdperk steeds een staat van
meerdere of mindere zwakte plaats grijpt,
waarvan een duidelijk bewijs gevonden wordt
in de matheid, flapheid en vermeerderde
uitwaseming des diers bij deszelfs gewone
werkzaamheden, die eerst een volkomen
einde neemt wanneer deze verrigting der na-
tuur afgeloopen is.

Hoe onzinnig is het dus, deze tot
bespoediging dezer werking aan te prikkelen,
gelijk maar al te dikwerf plaats heeft, het
zij door het voorbrengen eener kunstwarm-
te, door zeer warme stallen, of de bedek-
king met wollen dekens, het zij door het
gebruik van prikkelende, en op het werk-
tuig der huid werkende, of verflappende
middelen, zoo als het toedeelen van zout,
het geven van lijnkoekdranken enz.

Een en ander doet wel de bedoeling be-
reiken om het paard veel vroeger doch te-
vens ontijdig van haar te doen verwisfelen,
hetgene echter ten gevolge heeft, dat in-
dien het al niet door het misfen der nood-
zakelijkste bescherming, door onderscheidene
ziek-

ziekten van gestremde uitwaseming aangestast wordt, ten minste, wanneer het den invloed der koude ondervindt, deszelfs haren op nieuw dikker worden, en het deze na eenigen tijd andermaal verliest, waardoor eene onnoodige kunstige zwakte des dierlijken gestels wordt veroorzaakt.

201 Dit alles zal genoegzaam zijn tot betoog der schadelijkheid dezer behandeling, terwijl alleen nog overblijft hierbij te voegen, dat het alzins raadzaam is, de paarden die gedurende dit tijdperk steeds in eenen staat van zwakte verkeeren, zoo veel mogelijk van zware vermoeijensissen te verschoonen.

202 Wat het uitvallen der haren ten gevolge eener uitgestane ziekte betreft, daar zulks een natuurlijk gevolg derzelve is, zoo behoeft men geene hulpmiddelen daartegen aan te wenden.

Alleenlijk dan, wanneer een paard buiten den gewonen tijd van haar mogt verwiselen, hetgene steeds een kenmerk van zwakte, bijzonder van de versterkingswerktuigen is, kan men hetzelfde door versterkende middelen te hulp komen, waaronder de bittere prikkelmiddelen, als gentiaan- en alantswortel, de staal- en ijzerbereidingen, met vrucht gebezigd kunnen worden.

203 Groote vermocijenissen, ongemakken en slecht voedsel, gepaard met verwaarloozing der zuiverheid, verleenen het paard eene vatbaarheid om door luizen bedekt te worden, die zich tot in het ongeloofelijke bij hetzelfde vermenigvuldigen en op andere uitbreiden, indien men geene krachtdadige tegenmiddelen aanwendt, ja zelfs in eene luisziekte ontaarden.

204 Tot wegruiming derzelve behoort in de eerste plaats, het zorgvuldig poetsen en waschen met scherpe loog, afkooksel van zwarte tabak, en zelfs het inwrijven in de manen en staart met gewone kwikzalf, waarmede men een goed overvloedig voeder moet paren, daar de ondervinding leert dat welgevoede en gezuiverde paarden weinig vatbaarheid bezitten om dit ongedierte te ontvangen.



V I J F D E H O O F D D E E L.

OVER DE KOORTSEN.

E E R S T E A R T I K E L.

Over de koortsen in het algemeen.

205 Weinig toevallen verstoren den staat van gezondheid zonder met koortsen gepaard te gaan, zoo als men in alle ontstekingen ontwaar wordt, terwijl daarentegen genoegzaam geene koortsen bestaan waardoor niet eenig gedeelte of stelsel des ligchaams bijzonder wordt aangedaan, offchoon de hoofdzaak der ziekte eigenlijk in de koorts gelegen is; het is deze welke wij in deze afdeeling bijzonder in aanmerking behooren te nemen, zonder ons met de nasporing van het wezen, de verschijnselen en de ziektekundige beschrijving derzelve bezig te houden, daar zulks tot het door mij voorgestelde oogmerk overbodig zoude zijn.

206 Men onderscheidt de koortsen in twee hoofdtoorten, volgens de gesteldheid der levenskracht, te weten:

1. In die waarin het vaatgestel deszelfs

volkomene bewerktuiging te veel op deszelfs vochten, en deze weder op de vaten doet werken, waarvan dus de gevolgen eene vermeerderde terugwerking en prikkeling met een volkomen vermogen tot werkzaamheid zijn; welke soort van koorts in de kunstspraak een ontstekingskoorts (*febris inflammatoria*) *sahenict*, *synocha*,) genaamd wordt.

2. In die welke eene regtstreeksche (direkte) of middellijke (indirekte) zwakheid aankondigen, en gekenschetst worden door verminderde levenskracht, vermeerderde prikkelbaar- en gevoeligheid der levenswerktuigen, gepaard met een verzwakt werkingsvermogen en eene dadelijke neiging tot ontbinding der vochten; welke gesteldheid met de benaming van tijphus of asthenie bestempeld, en voorts onderscheiden wordt:

a.) In die, waarin eene sterke werking van het bloedadergestel, groote zwakte en neiging tot ontbinding der vochten plaats heeft. (de rotkoorts) *febris putrida*).

b.) In koortsen met bijzondere aandoening van het zenuwgestel, en daaruit ontspruitende verzwakking der levenswerktuigen. (de zenuwkoorts) *febris nervosa*).

c.) Voorts de uit beide zamengestelde, rotachtige zenuwkoorts, en zenuw-rotkoorts.

T W E E D E A R T I K E L.

De koortsen met verhoogde levenskracht.

(de heete of ontstekingskoortsen.)

207 Deze of de zoogenaamde ontstekingskoorts (*febris inflammatoria*) is nimmer volkomen en ongemengd aanwezig, en bestaat uit dat oogpunt beschouwd dus alleen denkbeeldig (ideaal), echter verleent derzelver beschouwing, het voordeel van haar te onderscheiden en de geneeswijs volgens hare onderscheidene trappen te leeren wijzigen.

208 Om deze koorts te vormen, welke hare oorzaak van verhitting, sterke beweging, zonnehitte, verkouding, koud drinken, enz. ontleent, en waaraan jonge sterke en welgevoede paarden bijzonder blootgesteld zijn, moet het opflorpemde vaatgestel zich in eenen verzwakten lijdenden staat bevinden, terwijl het bloedaderlijke gestel door dat der zenuwen ondersteund, eene verhoogde levenskracht uit, en dan eerst beterschap volgt, wanneer met de terugkeering van dit laatste tot deszelfs juiste werkingskracht, die van het eerstgenoemde weder rijst, en voorts de beslissende (critische) ontlastingen door het water, het zweet enz., door eene schei-

natuurkundige werking van opheffing, neerploffing enz. voortbrengt.

209 Deze staat van verhoogde werking der levenskracht, (*status activus s. sthenicus*) gaat in dien van verzwakte (*status passivus, s. asthenicus*) over, welke gevaarlijker wordt, naar mate de eerste heviger was en niet bij tijds tegengegaan is geworden, zijnde het nimmer de eerste maar wel de overgang in den laatsten (*typhus*) welke doodelijk kan worden, kunnende men des te meer genezing verwachten, naar mate de trap den eersten geringer is, en de beslissende ontlastingen spoediger plaats grijpen.

210 De kenteekenen dezer koorts zijn: eene harde snelle pols, roode oogen, schielijke adembaling, eene heete drooge huid, een hevige dorst, eene verlorene eetlust, langzame afzonderingen en ontlastingen, terwijl het afgetapte bloed met eene zoogenaamde ontstekingshuid bedekt wordt, wier dikte steeds met de hevigheid der ziekte in evenredigheid staat.

211 De beslissende teekenen (crisen) van bettererschap, zijn: dat de pols langzamer en weeker, de oogen en huid vochtiger worden. Er verschijnt alsdan een warm zweet, de pis wordt

wordt troebel, de mist grooter, en de eetlust keert weder terug; doch de ziekte wordt gevaarlijker indien zij in zwakte overgaat, dit geschiedt wanneer de pis en het zweet geene beflissing (*crisis*) te weeg brengen, of wanneer een overbodig gebruik van verzwakkende of een ontijdig van prikkelmiddelen gemaakt wordt.

212 Tot beoordeeling der genezing behoort men in de eerste plaats de lucht en landstreck, de ouderdom, het ras, de levenswijs, het gebruik, verblijf en voedsel op te merken, daar men bij jeugdige welgevoede, weinig vermoeide paarden, in drooge luchts- en landsgestellheid eenen meerderen aanleg tot ontsteking dan bij oude, uitgemergelde of afgematte paarden en vochtig weder moet veronderstellen.

Voorts verwijlere men alle schadelijke oorzaken, verminder de te groote werkzaamheid der bloedvaten van het zenuwgestel, en ondersteune dat der opflorpende vaten, bevordere voorts de heilzame ontlastingen, en biede bij het herstel eene doelmatige hulp aan de natuur.

Men vermindert de werkzaamheid der vaten en zenuwen door eenen schralen leefregel, vermindering der warmte, en van de hoeveelheid des bloeds door ontlastingen en ader-

latingen. Een ligte trap van ontstekingskoorts vereischt alleen tot herstel eene zachte verkoelende of ontstekingswerende (antiphlogistische) geneeswijs, als rust, onthouding van krachtig voeder, verkoelende en zeldzamen dranken en eene koele lucht; een hoogere trap vordert daarentegen eene spoediger en volkomener verkoelende behandeling, door aderlatingen, dragten, vooral door het ingeven van salpeter in ruime en herhaalde giften van eene ons telkens, of van n°. 7. *b.* 51.

Men vermeerderd de werking van het opflorpemde vaatgestel, door matige warmte, laauwe dranken, warme dampen en het wrijven van stroo; terwijl de beste geneesmiddelen uit ammoniakzout, spiesglans, zwavelbloemen en soortgelijke middelen bestaan, welke de uitwaseming bevorderen.

Ontdekt zich verzwakking, zoo late men alle verzwakkende middelen achterwege, en gebruike tegen den buikloop, bedarende, en tegen te veel zweet, bittere specerijachtige middelen (n°. 8. *a.*, 9.,) terwijl men bij overblijvende zwakte, balsemachtige bittere of zuiver bittere middelen moet toedienen.

DERDE ARTIKEL.

De koortsen met verminderde levenskracht.

13 Men onderscheidt deze koortsen volgens de hoofdverdeelingen waartoe zij aanleiding geven, in rot- en zenuwkoortsen.

a. De rotkoortsen.

Over dezelve in het algemeen.

14 Dezen naam geeft men aan die koortsen waarbij zich eene overhellende neiging tot ontbinding der vochten, vooral des bloeds, uit, en de hevigheid der koortsbewegingen, vooral in het hart en de bloedvaten, aand den dag gelegd worden.

15 De oorzaken zijn in de eerste plaats in den aanleg te zoeken, daar zwakke gestellen er het meeste voor bloot leggen; voorts bestaan dezelve in eenen hoogen trap van ontsteking, welke overspanning te weeg heeft gebracht, voorts in weerhoudene ontlastingen, ongemakken, gebrek, ongezond voedsel, onzuivere lucht, besmetting, enz. welke alle eenen schadelijken prikkel op het bloedaderlijk- en zenuwgestel vormen.

16 De toevallen en kenmerken zijn:
ver-

verlorene eetlust, terwijl de dorst niet aan de hitte geëvenredigd is; koude door brandende prikkelende hitte gevolgd; het kloppen des harts is sterk voelbaar, de pols die in het begin der ziekte wel eens sterk, hard en snel kan zijn, wordt echter al spoedig klein, ingetrokken, ongelijk en veranderlijk, welk laatste met het toenemende gevaar ook vermeerderd; terwijl de ademhaling schielijk met eene sterke beweging der ribben en zijden geschiedt.

De binnenzijde der oogleden is blaauwachtig en bloedig, het zamenvoegende oogvlies meer geel dan rood; de oogen zijn dof en tranende; de tong is smerig met taai speeksel, de tanden en neus met taaije, bruine en zwartachtige slijm bedekt, welke zich niet zelden als korsten verdikt; het slijmvlies is wit, het tandvleesch slap, de adem stinkende.

De pis is troebel, dik, donkerbruin, slijmerig en eindelijk zwartachtig; de mist bestaat in het begin in groote slijmerige kuiltels, wordt vervolgens dunner, en eindelijk in eenen buikloop ontwaardende, stinkende als varkensdrek; alsdan wordt de buik trommelzuchtig, het paard vervalt in eene slaapzucht en gevoelloosheid; de uiteinden der leden en vaak de geheele huid wordt door rilling aangedaan, een overvloedig koud zweet breekt uit, hetwelke met de opgetelde verschijn-

schijnsels een voorbode des doods is.

Niet zeldzaam is in deze ziekte na eenige dagen de verschijning van eenen uitflag, of van koude gezwollen, welke openbrekende het paard aan den worm doen sterven; somtijds ook vertoonen zich na een of twee dagen, aan de beenen, de borst of den buik gezwollen, die onpijnlijk zijn, vaak echter goede etter geven.

17 De beslissende werkingen (crisen) welke de gezondheid terug brengen, bestaan daarin, dat langzamerhand de ziekelijke ontlastingen ophouden en de toevallen verminderen, of dat zweet, eene veranderde pis, buikloop, eenen speekselvloed of gezwollen, den schadelijken prikkel verwijderen. Wanneer echter de natuur en kunst hiertoe onvermogen zijn, zoo zijn de gevolgen somtijds gezwollen, waterzucht, dampigheid, tering enz.

18 Na dat deze koortsen heerschende, (epidemisch) in den aanvang een ontskeud, galachtig of zenuwkoortfig karakter aan den dag leggen, en naar mate zij een of ander levenswerktuig bijzonder aandoen, worden zij door de schrijvers met bijzondere benamingen onderscheiden, als in het miltvuur, longvuur enz.; eigenlijk kan men ze onderscheiden in die: 1e. waarin zich alle op-

opgegevene toevallen vereenigen en die zoo snel toenemen dat de ziekte schielijk beëlist wordt, zoo als b. v. in pest- en heerschen- de rotziekten plaats heeft; ten 2^e. in meerdere trappen, waarbij deze zich slechts achtervolgens vertoonende, meer tijd tot aanwending van middelen tot genezing vergunnen, die zelfs zonder eenige hulp somtijds plaats heeft, daar de loop der ziekte verscheidene weken duurt.

- 219 De algemeene regels tot genezing van dit soort van ziekten gebieden, de wegneming van derzelver oorzaken; het opwekken der levenskracht en de vermindering van de koortfge bewegingen; het voorkomen van zamenvoegingen, (complicatiën) het tegengaan der toevallen, het bevorderen der beslissende ontlastingen en het herstellen der krachten.

Wat het verwijderen der oorzaken betreft, zoo kan men, indien de ziekte een gevolg van ontstekingkoort en of toevallen in derzelver begin is, door eene doelmatige ontstekingwerende behandeling, de overspanning merkelyk voorkomen, waarom door sommige als een voorbehoedmiddel, (preservatief,) in heerschende ontstekingachtige rotkoortsen, het doen van aderlatingen en het geven van verkoelende middelen aangeprezen is; men ver-

vermijde stinkende besmette lucht en verbeter de der stallen door zure berookingen, wake tegen onmiddellijke aanraking en mededeeling der smetstof; vermijde alle schadelijk voedsel, en geve als voorzorgsmiddel in heerschende rotkoortsen, wijn of brandewijn met de haver.

Tot opwekking der levenskrachten en vermindering der werking van de koortsen, dienen in de eerste plaats: eene zuivere koele lucht, groei- en delfstoffelijke zuren: als azijn-, wijnsteen-, zwavel- en zoutzuur;— vlugtige artsenijmiddelen: als de baldriaanflangen- en angelikawortel, het bilsenkruid, de opium, (10) kamfer, enz. — vaste prikkelmiddelen, als laurier- wilgen- paardenkastanje- én eikenschors, enz.

Bijzondere beschrijving dezer koortsen.

220 Volgens PILGER, welke deswegens door de ondervinding geleid, de zorgvuldigste op-
let-

(10) Men geve de opium echter met groote omzigtigheid in, alleen waar de plaatshebbende verschijfels, als: een sterke buikloop, hevige krampen enz. die vorderen, en dan geve men ze in genoegzame hoeveelheid, altijd bedenkende dat eene te kleine gift even nadeelig werkt als eene te groote. In de hand van den bekwamen veearts, even als bij den geneesheer, blijft het een vermogend en heilzaam middel, terwijl de onkunde met dezelve hare schadelijke middelen vermeerdert.

lettendheid op deze gevestigd en de naauwkeurigste beschrijving er van geleverd heeft, kan men de koortfen bij welke zich eene neiging tot ontbinding der vochten aankondigt, in twee foorten onderscheiden, namelijk in goedaardige en kwaadaardige.

De goedaardige.

221 De goedaardige heeft de volgende kentekenen, welke volgens den loop der ziekte zich in vier trappen vertoonen: 1^e. in den aanvang heeft het paard eene vastleggende huid, en afwisseling van hitte en koude; 2^e. vervolgens verstoptheid; 3^e. de eetlust verdwijnt, het rommelt in den buik des paards, hetgene op de beenen wankelt; 4^e. het hangt in den halfter, drukt met de borst en den mond tegen de kribbe; het knarstandt, de hitte en roodheid des monds vermindert, het jaagt vliegen, heeft stille ijlingen, waarbij zich een buikloop voegt.

222 Het eerste foort dezer ziekte bestaat in eene kleine ongesteldheid, welke slechts eenige dagen duurt, en onmerkbaar, vaak zonder eenige aangewende hulp weder overgaat, men geve hiertegen wat minder voeder, en des noods n^o. 51. b., terwijl men het

het van sterke bewegingen verschoont.

223 Het tweede foort is alleen door sterker toevallen van het vorige onderscheiden, gedurende welke de paarden niet eten, enoch na dezelve in de tuschenpoozen weder gezond schijnen; de geneeswijs komt met die der vorige overeen, enoch de middelen moeten in eene grootere hoeveelheid gegeven worden, en de schralere leefregel alleen in meeldranken en stroo bestaan.

224 Het derde foort, hetwelke sommige veeartsen de koude koorts noemen, en waarin de ziekte eenen hooger trap bereikt, kondigt zich aan door traagheid met verzwaking, duidelijke afwisseling van hitte en koude; de koortskrampen tasten de blaas aan, zoo dat het waterloozen alsmede de afgang moeilijk wordt; de haren rijzen om hoog, de paarden leggen zich neder en zweeten sterk na iederen aanval.

Tot geneeswijs wordt eenen foortgelijken leefregel, als voornamelijk goed oud hooi, meeldranken, doch geen groen voeder, en het gebruik van koortskeerende middelen, zoo als n°. 52. vereischt.

225 Het vierde foort of het zoogenaamde miltvuur, kenbaar aan ten eenemaal

M

ver-

verlorenen eetlust, zacht toenemende stekende hitte; volstrekte verstopping en verhindring van waterloozen, waarbij zich alle merkteekenen voegen welke boven opgegeven zijn, als den vierden trap dezer ziekte uitmakende.

- 226 Tot deszelfs genezing in den aanvang en in eenen geringen trap, wordt het gebruik van n°. 51. *b.* en 52. in eenen hooger n°. 53. *a.* en *b.* beurtelings om de twee uur, verdischt, terwijl men om ontlasting te bekomen, lavementen van tabakswater met keukenzout zet, voorafgegaan door die met olie, en voorts na de genezing het geven van te veel voeder en het vergen van te sterke inspanning vermijdt.

De boosaardige trothoortsen of de longziekte.

- 227 Het andere soort dezer ziekte, welke door de veeartsenijkundige den naam van de longziekte of longvuur gegeven wordt, heeft in haren loop drie tijdperken, welke de volgende kenmerken opleveren.

- 228 In het eerste is het paard treurig en mat, het weigert te eten, hoest en deszelfs zijden kloppen; de ooren zijn heet, de pols is ongelijk en hard, de keelklieren zijn eenigzins

zins gezwollen doch week en zonder pijn, het paard staat met de vier beenen bijeen, en heeft opstopping van water.

De toevallen nemen in het tweede tijdvak toe; de oogen staan wild en tranende, het slijmvlies, de mond en tong is hoogrood; de adem heet; ooren en ledematen zijn in tegenover stelling beurtelings warm en koud; de warmte is toenemende heet en prikkelende in de hand; het paard buigt den rug door, wanneer men met de hand over denzelven strijkt; het laat het hoofd hangen, legt zich zeldzaam en slechts kortstondig neder, en wankelt op de achterbeenen, het kan, onaangezien den sterken dorst niet drinken; de neusontlasting is slijmerig en somtijds bloedig; terwijl zich vlakke gezwollen aan den buik vertoonen, welke geheel verdwijnende, doodelijke teekens zijn.

In het derde tijdvak verdwijnen de toevallen van ontsteking, de oogen worden bleek en dof, het slijmvlies en de mond bleek, de adem stinkend, de neusontlasting wankleurig, de pols klein en ras, de warmte is alleen wanneer men de hand oplegt, flauw merkbaar, en laat eene onaangename prikkeling achterna; terwijl somtijds de omtrek der ooren en de zijden een smerig, stinkend, koud zweet voortbrengen; het paard wordt ongevoelig voor uitwendige in-

drukken, het ligt of leunt tegen de kribbe, steunt en zucht; de zeer scherpe ontlasting uit den neus neemt toe, vaak heeft eene dunne stinkende buikloop plaats, en de toestand van het paard wordt allerbedenkelijkst.

229 Wat de geneeswijjs aangaat, zoo moet men, wanneer de huidkramp tusfchen de koortsaanvallen ophoudt, de koortsmiddelen n^o. 53. *a.* en *b.* en voorts indien de hitte groot is n^o. 54. geven. Zijn de toevallen zoo hevig dat men koortsmiddelen moet geven zonder de tusfchenpoozingen te kunnen afwachten, en is de tong even min vochtig als dat de aanvallen met zweeten eindigen, zoo geve men n^o. 58. *a.* terwijl men n^o. 58. *b.* in alle tijdstippen geven kan.

230 Vele toevallen welke zich in deze ziekte vertoonen, eifchen eene bijzondere behandeling, namelijk, eene verzwakte fpijsvertering, verftopping, gedaalde levenskracht, vlakke gezwollen, kanker- en fponsachtige zweren in den mond.

De zwakke fpijsvertering kome men door bittere middelen, als gentiaan- en kalmuswortel, oranjefchillen enz. (n^o. 52. *a.* en *b.*) te hulp; de gezonkene levenskracht, door heete prikkelmiddelen, als baldriaan, kaskaril,

ril, mosterd, kamfer, (n°. 56. b.) die men echter niet bij eenen vollen weeken pols en vochtige tong. maar wel bij eenen kleinen snellen pols en drooge huid geven moet. Verstoppling poge men door lavementen van olie en tabakswater met zout, te doen ophouden. de spons- en kankerachtige tonggezwellen, die eene valsche beslissing (*crisis*) maken, moeten met keukenzout en azijn, en n°. 57 bevochtigd worden; terwijl men de vlakke gezwellen door dragten het inslaan belet; daar eindelijk de verkeerde afzondering en afscheiding der ingewanden bijzondere opletendheid verdient, zoo geve men tegen de-
 zelve n°. 55.

31 In de behandeling behoort het vaak wrijven met stroo en het luchten der stal niet vergeten te worden, terwijl het voedsel gedurende de ziekte uit dun meelwater en stroo, met vermindering van groen voeder en weiden dient te bestaan, als natuur gegeven men het langzamerhand aan hooi en havervoeder, waarover men vaak gentiaan, mosterd, jeneverbezien enz. strooit; eindelijk is het als eenen gewigtigen regel aan te raden, om in deze ziekte nimmer aderlatingen of buikontlastende middelen aan te wenden, en alleen tegen de vlakke gezwellen, dragten te zetten.

b. De zenuwkoortfen.

232 Iedere koorts wier uitingen meer eene ongergelde wijziging der zenuwen, dan van het stelsel der bloedvaten aan den dag legt, waarbij dit dus meer als lijdelijk is aan te merken, terwijl de ongesteidheid door het zenuwgestel voortgebracht wordt, die zich dus door geene verhoogde maar wel eene gedaalde ongelijke werking der levenskracht kenmerkt, en waarbij eene dadelijk in het oog vallende verzwakking van alle verrigtingen bescpend wordt, draagt het kenteeken der zenuwkoorts, (*typhus nervosus*) welke echter even min als de rotkoorts ooit geheel zuiver en onvermengd plaats grijpt, en in dien zin slechts als denkbeeldig (ideaal) te beschouwen is; want ofschoon de zenuwkoorts meestal met verzwakking der levenskrachten gepaard gaat, kan het echter niet onder de onmogelijkheden gerekend worden, dat er eene zenuwkoorts, vooral in het begin der ziekte met ontstekingschtege toevallen aanwezig kan zijn, terwijl nog veele zamenvoegingen hare beschouwing voor verschillende wijzingen vatbaar maakt.

233 De oorzaken dezer ziekte zijn in den verzwakten toestand des ligchaams, in eene scha-

schaddlijke lucht en voedsel, smctstof, aansteking en andere verzwakkende oorzaken te zoeken; Het onderscheid tuschen deze en de rotkoorts bestaat daarin, dat de spieren slapper zijn, de blik matter, de pis helderer zonder bezinkfel, de mond blecker en kouder, en de hitte minder is, terwijl er geene tuschenpoozingen bestaan die merkbaar zijn. Bij groote zwakte en spiertrekkingen is in deze ziekte weinig, bij loop en sterke ijhoofdigheid niets goeds te hopen; terwijl in de meeste gevallen dezelve zonder eene merkbare beffissing (*crisis*) eindigt.

234 Men onderscheidt in deze ziekte verscheidene zamenvoegingen en trappen, welke de veeartsen door de benamingen van goeddaardige en boosaardige zenuwkoorts, spaansche hoofdziekte enz. aangewezen hebben, waarvan de algemeene schildering door de volgende kenmerken en toevallen daargesteld wordt, terwijl de zuivere zenuwkoorts alleen in trappen van sterkte verschilt.

235 De voorboden dezer ziekte zijn buitengewone matheid, loom- en gevoelloosheid, vaak alle teekenen van stille kolder opleverende.

236 De kenteekenen zijn: afwisseling van

koude, hitte en zweet, op onregelmatige tijden; eene ongelijke kleine, zwakke, weeke pols, en korte ongeregelde beweging der zijden; de oogen welke dof en treurig staan, zijn ongevoelig voor het licht, zoo als de ooren voor het geluid; de zinnen zijn gevoelloos, het paard laat het hoofd en hals hangen, heeft de vier beenen onder het lijf gezet, en trekt de rug sterk in voor den druk der hand. Soms is de tong zuiver en vochtig, doch vaak bleek, smerig, vuil, bevende en teruggetrokken; menigmaal is de mond en neus heet en droog, soms vochtig en zuiver, gelijk mede het slijmvlies geel en bleek; de haren staan omhoog, dikwerf is de huid droog en vastliggende, soms met zweet bedekt.

Soms drinkt het paard bij afwezendheid der koortshitte, en weigert zulks gedurende dezelve; de pis is weinig, soms helder, dikwerf troebel als melk, bruin, rood of vurig; de mist is hard, stinkende, zwart en met gele slijm bekleed.

- 237 Gewoonlijk duurt dit eerste tijdperk eenige dagen, waarna de afwisseling van hitte en koude toeneemt, de hitte is niet buitengewoon sterk maar onaangenaam; de ooren en voeten zijn koud, de eerste zijn aan derzelfver wortel zeer heet en met kleverig
klam

klam zweet bedekt; de spieren zijn slap en hangende, die der huid trillen onder de hand, de ontlastingen van water en afgang zijn verstopt, terwijl in den buik rommelingen plaats hebben, het paard wankelt sterker op de beenen, trekt de lendenen steunende in op de aanraking der hand; deszelfs kaakklieren zwellen, het zet het hoofd en den mond in de kribbe en houdt zich dus staande, terwijl, indien men het wil doen omtreden, zoo wankelt het als of het dreigde neder te vallen; het heeft stille ijlhoofdigheid, en ziet dikwijls in de linker zijde, leidt men het uit de stal zoo gaat het met een hangend hoofd en hoog opgeligte voeten, tegen alles aanloopende. In dit tweede tijdperk hetwelke met voortdurende aanhoudende koorts zes of acht dagen duurt, liggen de meeste dezer paarden, en vele sterven in hetzelve.

238 In het derde nemen alle beschrevene toevallen steeds toe, de paarden liggen of hangen in den halfter; de mond wordt inwendig rood, het tandvleesch bleek, de tong droog en donkerrood gestreept, waar nevens men vaak sponsachtige zweren ontdekt; de ontlasting uit den neus wordt stinkende, de ijlhoofdigheid neemt toe; dikwijls zwellen de achterbeenen en somtijds ver-

tooncn zich krakende gezwcllen op de lendenen, aan de borst en onder den buik, waarop een stinkende buikloop volgt, en op dezen meestal in dit tijdperk den dood. Bij openingen vindt men vaak geene merkbare inwendige veranderingen.

239 De geneeswijs vordert het wegnemen der oorzaken, het opwekken der krachten, het verligten van den lijdenden staat der vaten; het herstellen van de werkzaamheid des zenuwgestels, en dat men de vöchten naar de huid drijve en de uitwaseming bewerke, door vlugge prikkelmiddelen, terwijl men voorts de ontbinding der uitgestorte vöchten moet pogen voor te komen.

Hiertoe wrijve men veel met stroowisfen en wek de werkzaamheid der huid op door het wasfchen met zeep en brandewijn, voorts bezige men het lavement n°. 39. g. geve inwendig rooden wijn met n°. 59. of alleen; voorts n°. 60. in verband met n°. 54. *b.*; terwijl eene der voornaamfte middelen in n°. 61 *a.* en *b.* bestaat; ontftaat er een ontstekings prikkel, zoo geve men n°. 7. of 51. *a.* terwijl indien men dragten door de gezwcllen moet fteken, zoo bevochtige men deze met terebinthijnolie.

240 De leefregel is dezelfde als bij rotkoortfen,

fen; tot nakuur geve men n°. 62., voorts zuiver hooi, gekookte haver met bier; doe het paard eene zuivere drooge lucht inademen en eene matige beweging verrigten.

De hoofdzwellling.

241 Deze ziekte die onder den naam van *mal d'espagne* bekend, aanstekende en eenen hoogeren trap van zenuwkoorts is, verschijnt meest postaadig en belooft dan alleen redding wanneer de hulp aller spoedigst toegebracht wordt.

242 In den aanvang zijn de toevallen gelijkvormig aan die eener gematigde zenuwkoorts; bij de aanvallen der koorts ontwaart men weinig koude, doch sterke en langdurige hitte, het paard eet weinig, drinkt niet, wankelt op de achterbeenen, het raast, hangt met het hoofd in den halfter en stoot van hetzelfde het vel af; na drie dagen zwellen de bekleedfelen des hoofds, de oogen ontfleken, zwellen en tranen, uit den neus vloeit gelen etter, en de onderkaakklieren veretteren.

243 Deze ziekte welke zich onderscheidt van den droes door eenen veel snelleren loop en van de waterzucht, doordien daarbij alleen de

de mond tot aan den neus zwelt, vereischt dezelfde geneeswijze als de zenuwkoorts, edoch eene veel spoedigere hulp; hiertoe geve men n°. 63. of 64. inwendig, en wasche het hoo dgezwel met n°. 65. 66. met afkookfel van eikenbast, of aluinwater, waarbij men wat kamfer kan voegen, terwijl men voorts de kaakklieren met lijnzaadmoes moet pappen, en dragten aan den hals en vóór de borst zetten.

De boosaardige zenuwachtige slijmkoorts.

244 Vaak heerscht in de legers volgens PILGER, deze ziekte, welke sommige een schielijk voortgaanden kwaden droes noemen, en die, indien men nu de toevallen verdeelt als eene zinking- of rotachtige zenuwkoorts aangemerkt moet worden, die meestal doodelijk is.

245 Zij onderscheidt zich van den kwaden droes door het zwellen der beide kaakklieren, en van den droes, door dat die meest jonge paarden, deze die van allen ouderdom aantast, door eenen waterachtigen etter, loodkleurig slijmvlies, het gemis van ontstekings toevallen, en door eenen merkbaaren staat van zwakte.

De

246 De kenteekenen zijn: aanhoudende tegen den avond toenemende aanvallen van koorts, eene smerige slijmerige tong, doffe tranende oogen, de kaakklieren zijn wederzijds sterk gezwollen en week, de neus ontlast eene vuile vochtigheid, de haren staan overeinde, het paard wankelt op de achterbeenen, het zweet ligt, het is sterk ingevallen van lijf, en zweemt sterk naar een dampig paard; de adem is kort en door hoesten afgebroken, de afgang ontaard ligt in loop, de pis is dik en troebel.

247 De geneeswijs is als in de andere aanstekende koortsen, uitgenomen, dat men bijzonder de verzwakkende neusontlasting moet tegengaan; men geve daar tegen in den aanvang n°. 67. *a.*, en als nakuur n°. 67. *b.*, en behandelc voorts het paard als in de andere koortsen, terwijl men alles vermijden moet wat verzwakt, als adcr laten, buikontlastende middelen, groen voeder en sterke beweging.

248 De zamengeftelde rot- slijmkoortsen moeten als eenen hooger en trap der eerste behandeld, en daarbij tevens op de zenuwtoevallen acht geflagen worden.

c. De

6. De koortfen uit verkeerde afscheiding
der ingewanden.

De gal koortfen.

249 Deze welke aan slecht voedsel, deszelfs overmaat, gebrek der hulpwerktuigen, en misbruik van ontlastende middelen hunnen oorzaak verschuldigd zijn: worden gekenmerkt door de gele kleur der oogen en huid, eene vuile gele tong, eenen stinkenden adem, geelbruin neusslijm en speeksel, dikke bruine pis, rommelingen in het lijf, enz.

250 De geneeswijs moet gewijzigd worden naar mate de ziekte een bijzonder karakter toont te bezitten.

Is dit ontstekend zoo moet men in deszelfs aanvang verkoelende middelen, als n°. 7., en vervolgens die geven, welke hunne leiding naar de huid en tot ontlasting hebben als n°. 68.

Toont het eene neiging tot ontbinding der vochten te bezitten, zoo behandel men ze als eene rotkoorts, gevende daarbij de rhabarber als een middel dat eigenlijk meer de werkzaamheid der verterings-werktuigen opwekt, dan wel dat het buikontlastende is; waarbij men specerijachtige ontlastende midde-

delen, als aloë, voegen kan, en voorts van kalnus, baldriaan, kamfer enz. gebruik maken (n°. 43.)

De slijmkoortsen.

251 Deze welke door slecht voedsel, verkeerde behandeling, vochtig verflappend weder, moerasfige streken en slechte stallen veroorzaakt worden, en eene te groote afzondering van slijm te wege brengen: ontdekken zich door loomheid in alle deelen en lichaamsverrigtingen; de tong en mond zijn met bleek vuil slijm bedekt, terwijl eene dunne-
re slijm zich uit de laatste, vaak ook uit de oogen en den neus ontlust; de pols is langzaam, het kloppen van het hart is voelbaar, de huid is los, opgezet, en vaak met koude builen bedekt, de pis is bleek en melkachtig, de afgang los en slijmerig.

252 De geneeswijze wordt bepaalt naar mate de ziekte naar eene zenuw- of rotkoortfige zamenvoeging overhelt; in het eerste geve men spiesglans en zwavelzuur, voorts zwavelgeest met bittere middelen.

253 In langzame slijmkoortsen geve men middelen die de spijsvertering bevorderen, en
de

de afscheiding der slijm tegengaan, als aloë, rhabarber, harst van jalappe, (n°. 28. b. en c.) terwijl men voorts terebinthijn daarbij met het uitwendig gebruik van spaansche vliegenzalf, en dragten voegen kan.



DERDE AFDEELING.

De uitwendige toevallen.

254 **D**e uitwendige toevallen welke het paard overkomen, kan men het gevoeligste in wonden, kneuzingen, verrekkingen en gezwellen onderscheiden.

EERSTE HOOFDDEEL.

DE WONDEN.

EERSTE ARTIKEL.

Over de wonden in het algemeen.

255 Men verstaat door wonden, die beschadigingen, welke de uitwendige oppervlakte des ligchaams in diervoege beledigen, dat deszelfs bekleedfelen van een gefcheiden, en die door eene uitftorting van bloed of andere vochten gevolgd worden.

De daarop volgende toevallen zijn: uitftorting van bloed, pijn, hitte, zwelling, ont-

N

fte-

stekking, wondkoorts, en indien geene spoedige zamenvoeging plaats heeft, de daarop volgende ettering welke zich eerst in de gedaante van een uitvloeiend geelachtig water vertoont, en tot de sluiting der wond voortduurt.

Een aanmerkelijk verschil heeft in het soort van wonden plaats, welke men wel dient te onderscheiden, daar zulks in de geneeswijs onderscheidene wijzigingen noodzakelijk maakt.

256 Dus onderscheidt men ze volgens derzelver oorzaak: in gehouwene of gesnedenene, in gestokene of geschotene wonden; — in eenvoudige en vlakke, waarin alleen de oppervlakte der huid en van het vleesch beschadigd is, en in zamengestelde, waarin pezen, zenuwen, groote bloedvaten, gewrichten, beenderen of zelfs ingewanden beleedigd zijn. — In ligte, zware en ongeneesbare: waarvan de eerste uit eenvoudige, de zware uit zamengestelde en verouderde, de ongeneesbare uit diegene bestaan, welke door kwetsing der levenswerktuigen, of van die der beweging, geene hoop op herstel vergunnen.

257 Het eerste dat men dus bij eene wond
te

te verrigten heeft, is, dat men deszelfs aard onderzoekt, ten einde hierna de behandeling in te rigten, en geen tijd of kosten aan volstrekt ongeneeslijke te verkwisten, waartoe men behoort te onderzoeken welke deelen beschadigd zijn geworden.

De wonden welke in de holligheden des ligchaams indringen, het zij door steken of schieten, zijn allergevaarlijkst en meestal doodelijk, wanneer zij de daarin bevatte ingewanden treffen, hetwelke de volgende ken teekenen aan den dag leggen.

Steken, houwen of schoten welke een hoofdtak der zenuwen verscheuren, brengen vaak in het geheele lid eene verlamming en gevoelloosheid te wege, — zoo als die welke pezen en banden doorbooren, veelal eene onheerbare verlamming voortbrengen, terwijl de kwetsing van het hart der hersenen, en van het rugmerg door eenen spoedigen dood gevolgd wordt.

Die der long- en luchtpijpen worden gekenmerkt door diep, schielijk en kort ademen, terwijl schuimend bloed uit de wond vloeit, eenige tijd daarna volgt een windgezwel in de inwendige ligchaamsdeelen, dat zich vaak over het geheele ligchaam uitbreidt.

Bij kwetsing der lever smaakt het bloed uit de wond bitter. Bij die der maag

fpalkt het paard den mond op, werpt het voeder door den neus uit, en geeft alle teekenen van buikwee (kolijk).

De darmwonden kent men aan de uit de wond te voorfchijn komende mist, de afgang houdt op, het lijf zwelt, en het paard fchijnt aan het buikwee te lijden.

Indien de nieren gekwetst zijn, zoo is de pis bloedig, het paard kan niet ftaan en poogt gedurig water te lozen; heeft dit bij de baarmoeder plaats, zoo openbaart zich bloed in de fcheede, en het paard heeft barensweën.

Daar de borst- en buikwonden zonder kwetfing der ingewanden, of fchoon gevaarlijk, echter niet volftrekt hopeloos zijn, zoo verdienen dezelve dat men hare genezing beproeve, en daarbij de volgende voorzorgen waarneme: Die der borst moeten zorgvuldig voor den indruk der lucht bewaard, en voorts als eene andere wond door ettering genezen worden. Bij die des buiks moeten de ingewanden met eene fpons met lauwe melk afgewafchen, voorzigtig ingebragt en de wond zoo lanig toegenaaid worden, dat de fteken door de vleefchdeelen gaan.

258 Het eerfte dat men bij iedere wond te doen heeft, is het fluiten der bloedftor-

storting, hetwelke bij kleine van zels geschiedt, terwijl bij deze en middelmatige het plukfel van werk en hernip het meestgeschikt is om zulks door eene werktuigelijke drukking te weeg te brengen, kunnende men ingeval zulks ontoereikende geacht mogt worden, zoo wel dit als de wonden met n°. 73. of 54. *a.* bevochtigen of in kleine bloedstortingen, het drooge poeder van harst, kijno-gom, zwam, tondel enz. in dezelve strooijen; de bloedstorting uit grootere bloeden vooral slagaderen, kan alleen door onderbinden of toeschroeijing gestuit worden, welk laatste door middel van een roodgloeiend ijzer met eenen peervormigen knop verrigt wordt.

59 De genezing van alle wonden geschiedt door spoedige vereeniging of door ettering; waarvan de eerste het spoedigste en gemakkelijkste zijnde in alle gevallen de voorkeur zoude verdienen, ware het niet dat dezelve alleen aangewend kan worden bij eenvoudige, gehouwene of gesnedenen versche vleeschwonden, zonder aanmerkelijke kneuzingen, en dadelijk na het toebrengen derzelve, welke daarenboven zonder de minste onreinigheid of stof moeten zijn; (11)

N 3

kun-

(11) De spoedige vereeniging heeft zoo veel in haar voordeel, dat men ze nog beproeven moet bij wonden
die

kunnende alle andere wonden zonder onderscheid alleen door ettering geheeld worden.

260 De zamenvoeging geschiedt door verbanden of door naden, waarvan de eerste door de onrustigheid der dieren zeldzaam anders dan aan de benedeneinden der beenen, zonder gevaar van verschuiven, bevestigd kunnen worden.

261 Dus moet men zich in de meeste gevallen van naden bedienen, welke voornamelijk op de volgende wijzen gevormd worden, waartoe men zoogenaamde wondnaalden gebruikt, door welke men van het sterkste garen vier- zes of meervoudig doorsteekt, en met was bestrijkt, zoo dat zij maar eenen draad schijnen te zijn.

1^{re}. Men steekt ieder einde van zulk eenen draad door eene wondnaald, en ieder dezer van de binnen naar de buitenzijde der wond zoodanig door, dat zij op eenen zekeren afstand van derzelver rand door de opperhuid te voorschijn komen, waarop men de

die reeds eenigen tijd geduurd hebben, zoo er maar geene der hier opgetelde beletfels aanwezig zijn; kan men de wondranden ook niet geheel bijeen brengen, men verkrijgt altijd aanmerkelijk voordeel, indien men ze zoo veel mogelijk tot elkander doet naderen, waardoor de etterende oppervlakte verminderd, en de genezing bespoedigd wordt.

de naalden uittrekt en op eenen halven of drierierendeel duim afftands een diergelijke draad doorfteekt, en zulks naar gelang van de grootte der wond herhaalt, terwijl, wanneer een genoegzaam getal draden doorgetrokken zijn, zoo worden de lippen der wond, met de vingers zacht te zamen gedrukt, en de draden wederzijds te zamen getrokken, waarna men plukfel van werk op de wond legt, en de verdeelde draden met eenen dubbelen knoop over hetzelfde bevestigt, voorts neme men waar, ten einde de draden niet doorscheuren, om ze op eenen genoegzamen afftand van de wondlippen door te steken, en niet sterker dan noodig is aan te halen.

2^e. Men gebruikt op gelijke wijs twee regte wondnaalden, en deze wederzijds doorstekende, naait men de wond op dezelfde wijs toe als de schoenmakers gewoon zijn.

3^e. Men steekt des noods stalen naalden of groote spelden door de lippen der wond en omwikkelt ze in de gedaante eener acht met eenen zoodanigen draad.

262 Gewoonlijk kleeft de wond na vier dagen te zamen en is in acht dagen gesloten, indien het dier gezond is: gedurende welken tijd men dezelve vlijtig met koude om-

flagen bevochtigt, het zij van koud water alleen, het zij, vooral bij ontsteking met n°. 71., terwijl men naar mate de wonden aan een kleven, de dra en doorsnijdt en voorzigtig uittrekt, ten einde deze oorzaken van ontsteking weg te nemen.

Ontstaat eene sterke zwelling en ontsteking, die blijft voortduren of toeneemt, of vertoont na eenige dagen zich etter, terwijl er teekens zijn van vergaderde etter in de wonde, zoo moet men de hoop laten varen, de wond door vereeniging te heelen, waarom men insgelijks dadelijk de draden moet uittrekken, de wond openen en met etterbevorderende middelen behandelen.

263 De ontsteking en ettering zijn twee tot genezing van iedere wond volstrekt noodige vereischten, mits de eerste niet te sterk is, noch van te groote pijn verzeld ga, terwijl eenen goeden etter welke dik, geelachtig en zonder reuk is, de heilzaamste balsam uitmaakt, die het meeste tot genezing toebrengt; Deze, welke zich bij eenvoudige vleeschwonden; gewoonlijk den vijfden of zesden dag, bij zamengeitelde iets later vertoont, bedekt en heelt dezelve, waarom het zeer verkeerd zoude zijn dezelve af te vegen, om ze door andere vette, prikkelende, zoogenaamde balsemachtige midde-

delen te vervangen ; echter daar de naburige deelen er door zouden kunnen lijden , zoo moet men niet de wonden maar wel derzelver omtrek er van zuiveren , en voorts zorgen , dat hij in diepe wonden steeds eenen vrijen afloop heeft , daar dezelve anders fcherp wordende , haar zoude kunnen doorknagen of ten minste holligheden en verzweringen veroorzaken , tot wier vermijding men zoodanige wonden opening moet geven.

264 De pijn is de oorzaak der zwelling en ontsteking , terwijl een en ander onafcheidsbaar van wonden en in eenen zekeren trap tot voortbrenging der ettering en genezing noodzakelijk zijn , en alleen derzelver overmaat tegengegaan moet worden , het zij dezelve uit vette of fcherpe zalven , uit opdrooging door de zonnehitte enz. ontstaat ; wasschende men hiertoe in het eerste geval met zeepwater en voorts zoo wel als in het tweede met n^o. 74.

Men kome voorts , indien de ettering niet goed is , de natuur door middelen te hulp , die deze bevorderen , welke hieronder aange-
wezen zullen worden ,

265 Volgens den loop der natuur wordt hiertoe eene koortfge beweging vereischt , welke met de verschijning van den etter ophou-

den moet, edoch wanneer deze wondkoorts te hevig of te langdurig is, de pijn en de daarmede gepaarde toevallen van zwelling en ontsteking tocnemen in plaats van te verminderen, zoo moet men dezelve tegengaan, en de oorzaken er van trachten weg te nemen, merendeels zijn zulks vreemde ligchamen, beenplinters, scherpe zalven, opgehouden en etter of te vaste verbanden, welke in de eerste plaats weggenomen moeten worden,

266 Voorts beoordeelc men de gesteldheid des ligchaams om de genezing hierna in te rigten: is het paard sterk, welgevoed, en heeft de wond weinig gebloed, zoo kan men met vrucht eene aderlating doen, en inwendig verkoelende middelen, als: salpeter, wonderzout en room van wijnsteen, van ieder ééne ons, in een pond water opgelost, ingegeven, en lavementen van lijnzaadwater en zout zetten.

Is daarentegen het paard oud, zwak en afgemat, heeft de wond sterk gebloed of is dezelve geschoten, zoo moet men volstrekt de aderlating vermijden, en in tegen over stelling versterkende inwendige middelen en uitwendige omslagen bezigen, waarbij zeer koud water groote diensten verleent, terwijl men inwendig dranken van wijn of bier en brood geeft. In-

267 Indien de ontsteking eenen al te hoogen trap bereikt, zoo gaat de wond in versterking (*gangraena s. phacelus*) over, waarvan de gevaarlijke gevolgen alleen door het verwekken eener kunstige ontsteking a geleid kunnen worden, bestaande in het kerven, (*scarificeren*) wegbijten, (*cauteriseren*) of branden der wond, zoo dat men het doode of afgestorvene met een gloeiende ijzer in eene kool verandert, of in hetzelfde insnijdingen make, op dat de opgehoopte rotachtige stoffen zich ontlasten kunnen, bestrooiende men voorts dit zoo behandelde afgestorvene, met in terebinthijnolie geweekt poeder van kina, (koortsbast); de plaats waar zich afzondering en nieuwe ontsteking begint te vertoonen, bedekke men met verzachtende ettermakende pappen om de afscheiding des verstorvenen deels te bevorderen, terwijl men de afgestorvene deelen, met rottingwerende middelen, als kina, eikenbast enz. blijft verbinden, en welke nieuwe wonden door het opleveren van eenen goeden etter beterschap voorspellen.

268 Het zoogenaamde wilde vleesch, is een gevolg van lang etterende, kwalijk behandelde wonden, kenbaar aan eenen sponsachtigen over de wondranden uitstekenden vorm, rood-

roodachtige loodkleuren eenen onaangenamen reuk, hetwelke een volstrekte hinderpaal tegen de genezing zijnde, hiertoe weggenomen moet worden, het zij door zachte bijtmiddelen als zuiker, gebrande aluin, enz. welke men tweemaal daags op dezelve strooit, het zij door het even dikwerf met helchen steen (salpeterzuur zilver) aan te roeren, of met n°. 70. b. of 82. te bevochtigen.

269 Daar eene goede juist geëvenredigde ettering het voornaamste heelmiddel en de beste zelf is, zoo moet men die middelen aanwenden, welke dit doel het meeste bevorderen kunnen, en welke men in de ettering- bevorderende- verbeterende- of verminderende onderscheidt.

270 De ettering bevorderende middelen kunnen dus degene zijn, welke de te groote prikkelbaarheid en werkzaamheid verminderen, als: lijnzaad, lijnolie en andere olien en vettigheden, waarbij men echter toezie dat zij door ouderdom of anderzins geene ranfge hoedanigheid hebben; of die welke de werkzaamheid van het vaatgestel vermeerderen, als de terebinthijn en andere natuurlijke harsten, gommen en balfems, benevens alle balfemachtige kruiden, die de prikkelbaarheid opwekken, gelijk rosemarijn,
fa-

falie, enz.; dus is in het eerste geval in zeer ontstokene harde gezwellen, n°. 75. *a.* en *b.* in langdurige ontstekingen met eene zwakte der deelen gepaard, n°. 77. en 78. en in wonden welke uit zwakte weinig of niet etteren n°. 76. als gepast aan te merken.

271 Tot verbetering van stinkenden of dunnen etter, is behalven de bevordering van deszelfs ontlasting en het zuiver houden der wond, het herhaald bevochtigen met koud bronwater eene der eerste en beste middelen; terwijl daarenboven onder andere geneesmiddelen, het osterlucie - kruid of holwortel, benevens de duivelsdrek de eerste plaatsen verdienen, waarbij men voorts rosemarijn, leveraloe, de koorts - bast, het kalkwater enz. voegen kan.

Voor al is het afkookfel van twee handen vol holwortel met een kan water tot op een vierde verkookt zeer heilzaam in wonden en zadeldrukken, zelfs dan wanneer beenderen aangetast zijn, met bijvoeging in het laatste geval van een weinig aloë - tinktuur, waarna men de wond met poeder van holwortel bestrooit, bij hetwelke men in geval van beenbederf even veel aloë bijvoegt, terwijl men in vuile, slecht etterende wonden en verzweeringen, vooral door
ver-

verzwakte levenskracht, wanneer zelfs de wond bleek, rottig, stinkende of met wormen vervuld is, n°. 82. *a. b.* steeds met vrucht gebruiken kan.

272 Om de te sterke ettering voor te komen of te verminderen, is wijngeest met water of azijn tot de helft verdund, eene der beste middelen.

Heeft zich de goede etter gevormd, zoo vermijde men de wond te veel uit te vegen, daar de etter de allerheilzaamste balssem is, gelijk hierboven reeds gezegd is, terwijl de eenigste zalf die men behoort te gebruiken uit n°. 80. bestaan moet, vermijde men voorts om in alle wonden waar in beenderen en pezen gekwetst zijn, vette zaven te gebruiken, wier plaats de opdroogende middelen behooren te vervangen, waarbij men tegen de wormen n°. 81. *a.*, of *b.* voegt.

273 Wat de behandeling der wonden betreft, zoo moet derzelver bedekking zoo ligt als mogelijk zijn, en in alle gevallen bij eenvoudige vleeschwonden slechts met het oogmerk plaats grijpen, om dezelve voor vuiligheden en wormen te bewaren, aangezien de toegang der dampkringslucht haar in genen deele schadelijk is, tegen welke men die

die echter zorgvuldig moet beschermen, waarin pezen, gewrichten, kraakbeenderen en ingewanden ontbloot zijn, als mede, wanneer men ze door spoedige vereeniging wil doen heelen, waarom men dezelve zoo spoedig en zeldzaam als slechts eenigzints mogelijk is, verbinden moet

Daarentegen behoeft men de wonden voor de zonnestralen welke dezelve opdroogen, de pijn vermeederen en eenen zeer schadelijken prikkel veroorzaken.

Wanneer het eerste verband gelegd is, en zich geene kwade toevallen opdoen, tot wier wegneming men de aangewezenen middelen moet aanwenden, zoo moet hetzelfde drie of vier dagen of zoo lang blijven liggen tot zich de etter begint te vormen, terwijl men intuschen om de toevallen te verminderen, van de voorgeschrevene omflaggen gebruik maakt, het zij men zulks door kompresen of door vermenging met klei naar omstandigheden bewerkstelligt; in het vervolg vermijde men het te veelvuldig verbinden, hetwelke tweemaal daags geschiedende, meer dan genoegzaam is, en waar toe men de koele morgen- en avondstonden behoort te verkiezen.

74 Voorts moeten de randen der wonden zoo veel mogelijk zacht worden gehouden, daar

daar derzelver verharding de genezing zeer in de weg staat, terwijl, indien zulks plaats mogt hebben, zoo zuivere men ze vaak met eene spons met zeepwater, en legge wicken met n°. 79. op.

- 275 Men plaatse het paard in koele zuivere stallen, waar de lucht eenen vrien toegang heeft, aangezien het tegendeel, wilk vleesch, versterf en rotkoorten veroorzaken kan.

Voorts dient het voedsel naar de omstandigheden en de gesteldheid des ligchaams berekend te zijn; vooral worden tot voortbrenging van etter, voedzame en versterkende spijsen vereischt, welke in goed kort voeder; brood en meeldranken dienen te bestaan, waarbij men bier of wijn kan voegen, indien de levenskrachten zeer gedaald zijn.

T W E E D E A R T I K E L.

Over de wonden in het bijzonder.

Na derzelver algemeene beschouwing tot hunne geneeswijs in het bijzonder overgaande, vertoonen zich het eerst aan onzen aandacht.

a. De gehouwene wonden.

- 276 Van deze zijn diegene welke het vleesch
en

en de huid beschadigen, ligter te genezen, dan wanneer aanmerkelijke vaten, zenuwen, pezen of beenderen gekwetst zijn, gelijk mede eene overslags of evenwijdig met de spiervezels loopende wond, spoediger dan eene dwarsche heelt, terwijl hoe scherper het werktuig was, waarmede de houw toegebracht is geworden, des te ligter de genezing volgt.

277 De hoofd- en halswonden zijn degene welke het meeste het krijgspaard treffen, van welke de laatste het bezwaarlijkste te genezen zijn, wijl zij niet alleen vaak met beschadiging der beenderen en banden gepaard gaan, maar het steeds moeite kost den etter eene vrije ontlasting te bezorgen, hetwelke men door diepe insnijdingen in de wondlippen, en door tegenopeningen bewerkstelligen kan, waartoe echter de geoefende hand van eenen paardenarts vereischt wordt.

278 De hoofdwonden moet men zoo veel mogelijk door zamenvoeging pogen te genezen, en daarbij vlijtig de koude omslagen in het werk stellen.

279 In het algemeen moet men half doorgesneden zenuwen, geheel doorsnijden om ge-

O

vaar-

vaarlijke krampen voor te komen; pezen en banden beledigt zijnde, genezen zeer moeilijk en alleen door balsmachtinge prikkelmiddelen, als: terebinthijn; in wijngeest ontbondenen peruviaanschen balssem, elixer proprietatis, enz.

b. De gestokene wonden.

280 De gestokene wonden zijn wegens derzelver diep indringende oorzaak en naauwe opening, veel gevaarlijker en tevens moeilijker te genezen dan de gehouwene, vooral wanneer niet slechts de vleesch- maar tevens edelere deelen: als pezen, vaten en zenuwen getroffen zijn, zelfs in het eerste geval heeft de etter zeldzaam eene genoegzame ruimte tot ontlasting, en zich als in eenen zak verzamelende, worden hierdoor gangen, zakken en gezwellen voortgebragt.

Het eerste dat men tot genezing dezer wonden in het werk moet stellen is, dat men dezelve hiertoe eene genoegzame verwijdering geeft, het zij door ze geheel te openen, of zoo de aangrenzende deelen zulks niet vergunnen, ze genoegzaam te verwijderen en tegenopeningen aan de laagste zijde te maken, terwijl men voorts naar omstandigheden inspuitingen doet.

281 Onder de gestokene wonden zijn die welke de voeten door het intreden van nagels enz. worden toegebracht, de gewoonlijkste, terwijl de zoodanige welke in de holligheden der borst of des buiks indringen, steeds gevaarlijk en meestal dodelijk zijn indien zij eene der ingewanden treffen.

De voetwonden.

282 Men kan deze in eenvoudige, gevaarlijke en ongeneesbare onderscheiden. Onder de eerste kan men het vernagelen rekenen, het zij zulks door eenen ouden nagel, een schilfer der nieuwe of het kwetsen der vleeschzool door dezen zelfs veroorzaakt wordt. In alle gevallen moet het ligchaam dat dezelve te weeg gebragt heeft uitgetrokken worden, en indien de wond nog versch is, derzelver opening verwijderd en eenige druppelen tinktuur van aloë, levensbalssem of van n°. 83. er ingegoten worden, terwijl men voorts koude omslagen, vooral van leem, om den voet doet, en dezelve dikwijls in koud water zet; vaak zijn de inspuitingen met hetzelfde, met kalkwater of n°. 98. daarbij ter genezing voldoende.

Is dezelve daarentegen veroudert en in ettering overgegaan, zoo moet men de opening genoegzaam verwijderen om den etter eene ruime ontlasting te bezorgen, en de

wond eerst met n°. 82. *a.* en daarna met n° 83. uitwastchen.

Men ga op gelijke wijs te werk wanneer het paard glas, spijkers enz in den voet heeft getreden. dat weinig te beduiden heeft, wanneer zulks door de hoornzool of siraal slechts even in de vleeschzool gedrongen is, en op gelijke wijs genezen wordt.

283 Gevaarlijker is het wanneer pezen, banden, kraakbeenderen of beenderen gekwetst en vooral indien de gewrichtbanden doorboord zijn.

284 Ongeneeslijk kan men dezelve achten, indien de beenderen zelfs door bederf zijn aangetast, hetwelke men aan den bloedigen, stinkenden, uit de wond vloeijenden etter kan onderscheiden.

Met andere veeartsenijkundige worden door TENNEKER alle scherpe, vette en prikkelmiddelen in voetwonden afgekeurd, en alleen zoogenaamd blaauw water, (n°. 98.) of kalkwater aangeraden; voorts besla men den voet met een eenigzins breed ijzer, hetwelke aan de gekwetste plaats uitgehold is, alwaar men ook de hoornwand moet wegnemen.

c. De geschotene wonden.

285 De geschotene wonden vereischen de genezing door ettering, welke zelfs bij de eenvoudigste zich eerst na zeven of acht dagen vertoont; gewoonlijk zijn vreemde lichamen, als stukken der huid, patroonpapier en kogels in dezelve gedrongen, en zij steeds met scheuring en kwetsing van de aan het kanaal der wond grenzende deelen gepaard, welk een en ander hen het gevaarlijkste en moeilijkste te genezen van alle wonden maakt, daar in haar veelal de beenderen verbrijzeld en edele deelen verscheurd of beschadigd zijn.

286 Alvorens dus de genezing te ondernemen moet men eerst zorgvuldig den aard der wond onderzoeken, en vervolgens haar zulk eene genoegzame opening geven, dat de etter zich vrij ontlasten kan, wanneer het paard overeinde staat, en voorts zich beijveren de in de wond ingedrongene vreemde lichamen uit dezelve te verwijderen, zonder veel in haar te wroeten, waartoe men des noods tegenopeningen moet maken.

287 Wat de behandeling zelve aangaat, zoo

moet de eerste zorg zijn, de bloeding van groote vaten op de voorgescrevene wijze te stuiten; die van kleinere veel minder aanmerkelijk zijnde dan in gehouvene of gestokene wonden, houdt van zelve op; In de tweede plaats moet men eene goede ettering trachten te verwekken, om de verplotterde deelen, beensplinters en vreemde lichamen welke men niet heeft kunnen wegnemen, en die eenen schadelijken prikkel veroorzaken, te verwijderen en de versterking voor te komen. Is de ontsteking sterk zoo gebruike men koude omslagen en des noods kervingen (scarificatien), waarbij men het inwendig gebruik van verkoelende middelen voegt; terwijl men in tegenover stelling wanneer het dier zwak is, uitwendig prikkelende en inwendig versterkende middelen moet aanwenden.

In het algemeen zijn inspuitingen in het wondkanaal, het gebruik van etteringbevorderende middelen, het dekken der wond met plukfel in een of ander wondwater nat gemaakt, het zacht houden van derzelver randen, de middelen om de spoedigste genezing dier wonden te bewerken, wier aard aan dezelve niet doen wanhopen, zoo als diegene zijn, waarin beenderen gebroken of verbrijzeld zijn, doch waarvan men die der ribben in sommige gevallen uitzonderen kan.

TWEE-

T W E E D E H O O F D D E E L ,

D E K N E U Z I N G E N .

E E R S T E A R T I K E L .

Over de kneuzingen in het algemeen.

288 Door kneuzingen of kwetsingen, verstaat men de geweldige beschadigingen, waardoor de weeke ligchaamsdeelen met eenig geweld te zamen gedrukt worden, het zij zulks door drukking, of eene stoot of slag geschiedt, welke eene meerdere of mindere uitwerking te weeg brengen, naar mate dat de stoot des beschadigenden ligchaams sterker, dit zwaarder of deszelfs drukking aanhoudender en geweldiger is geweest; terwijl daarenboven de gesteldheid der hierdoor getroffene deelen de kneuzing meer of minder aanmerkelijk doet worden, het zij dat dezelve alleen de vaten te zamen drukt, en derzelver werkzaamheid verlamt, of dat tevens de dieper leggende verscheurd zijnde geworden, zulks eene uitstorting van vochten veroorzaakt heeft.

De minst beduidende zijn diegene, welke

alleen vlezige deelen treffen en weinig indringen; daarentegen zijn die gevaarlijker, welke gewrichten, beenderen en groote vaten treffen, of in derzelver nabijheid plaats grijpen, vooral, wanneer zij door eene geweldige drukking of schok de ingewanden der borst of des buiks beledigen.

289 De kneuzingen zijn al of niet van eene opene wond verzeld, bij welke laatste gewoonlijk eenen hooger en trap van spanning dan bij de eerste plaats grijpt.

290 De geneezing van alle kneuzingen kan slechts op twee wijzen plaats grijpen, namelijk: door verdeeling of door ettering, waaryan de eerste in alle zulks vergunnende gevallen steeds de voorkeur verdient, daar zij spoediger en gemakkelijker ten doel leidt, edoch dezelve kan alleen bij versche, oppervlakkige en onaanmerkelijke kneuzingen in het werk worden gesteld, aangezien in alle andere aanmerkelijke, verouderde en met opene wonden gepaard gaande, alleen de ettering in staat is, de door de kwetsing tot hunne werkzaamheden onbekwaam gemaakte deelen, af te scheiden, het versterken voor te komen, het deel deszelfs dienstbaren staat terug te geven, en de uitgestorte vochten door de opflorpemde vaten in te zlugen, of ze af te scheiden. De

291 De genezing door verdeeling vereischt het gebruik van prikkelmiddelen, welke de opflorpemde vaten eene vermeerderde of vernieuwde werkzaamheid geven, en waaronder men n°. 84. a. — f. met vrucht aanwenden kan.

Is de kneuzing van eene wond verzeld, doch voorts niet zeer beduidende, zoo kan men van deze middelen in zoo verre gebruik maken als dienstig is om de buitengewone zwelling te verminderen, echter behoort men daarmede bij tijds op te houden, om de ettering, welke deze kneuzingen alleen kan genezen, niet te storen; terwijl men tevens bij alle met wonden verzelde kneuzingen moet waarnemen, om de verdeelende middelen en onslagen slechts op den omtrek der wond aan te wenden.

292 Ingeval bij de kwetsing eene meenigte bloeds in het celwijs weeffel uitgestort is geworden, zoo is het meestal vruchteloos op verdeeling te hopen, moettende men hetzelfde zoo veel mogelijk door diepe insnijdingen ontlasting pogen te bezorgen; terwijl men insgelijks van reeds in ettering overgegane kneuzingen, geene verdeeling kan verwachten, maar zoodra de etter genoegzaam gevormd is, derzelver rijping moct bevorderen en ze met het mes openen.

293 Men kan de kneuzingen verdeelen: 1^e. In die welke het hoofd en de aangrenzende deelen treffen, 2^e. in die der schoft en des rugs (zadeldrukking); 3^e. in die der beenen: als van den elleboog, hak en knie enz. (leggers, schijthakken en verder flagen of stoten); 4^e. der kroon (kroonbetrapping en strijken); 5^e. van de zool (steengallen); 6^e. der hieken (het verballen); 7^e. het verhangen in den halfterketen; 8^e. het kwetsen der grootte pees.

T W E E D E A R T I K E L.

Over de kneuzingen in het bijzonder.

a. De mol of varent.

294 Eene der gevaarlijkste gezwellen bij het minste verzuim, welke door eene uitwendige beschadiging veroorzaakt worden, is hetgene onder den naam van de mol of varent (*la taupe ou testudine*) bekend, zich gewoonlijk tusfchen het achterhoofdsbeen en den derden halswervel uitstrekt. Hetzelve is in den aanvang zeer pijnlijk en hard, bevat zelden goeden etter, en moet steeds zoo spoedig mogelijk geopend worden, térwijl, indien het zeer ontstoken is, men het alvo-
rens

rens met lijnzaad, ajuin en melk behoort te pappen.

Het bedenkelijkste van dit toeval is, dat door den etter zeer ligt den nekband aangetast en fistelholten voortgebragt worden, hetwelke men aan het verschijnen van veel wild vleesch bespeurt; alsdan make men pappen van brood en saffraan, en doe, het zij door inspuiting van prikkelende middelen, zoo als bij de zadelkwetsing voorgeschreven is, het beschadigde afscheiden, of wel, men verwijdere de opening genoegzaam om het te kunnen wegsnijden, waarna men de wond gelijk eene zadelkwetsing met balsmachtinge middelen geneest.

b. De zadelkwetsing.

295 Dezelve bestaat in eene al of niet door eene wond verzelde kneuzing, welke door den zadel of mantelzak op de schoft, den rug, de lendenen of ribben te weeg gebragt wordt, en waarvan diegene welke de schoft treft, steeds bedenkelijker is dan die den rug of de lendenen aandoet, aangezien de eerste vaak de banden, kraakbeenderen en pezen beschadigt, terwijl die der ribbe het minst beduidende van alle is. (12)

Men

(12) De zadelkwetsingen worden of door de ongelijke of door de langdurige drukking deszelfs te wege gebragt; dit

296 Men onderscheidt de door den zadel veroorzaakte kneuzingen, in brandvlekken, in eenvoudige en in diep indringende zadelskwetsingen.

De

dit heeft bijzonder plaats bij aanhoudende bewegingen in den stap; alsdan worden de sijne luidvaartjes te zamen gedrukt en verlamd, en de in deze lan zame beweging traaijk omlopende vochten kunnen dezen tegenstand niet overwinnen; wanneer nu deze drukking ophoudt, en vooral indien door te vroegtijdig afzadelen, deze thans ten uiterste gevoelige deelen aan de lucht worden blootgesteld, veroorzaakt deszelfs prikkel eenen vermeerderden toevloed van vochten naar dezelve, wier aandrang deze verzwakte vaatjes niet kunnende wederstaan, daardoor eene merklijke zwelling en uitzetting ondergaan, en zelfs vaak bersten; terwijl daarenboven de koude der dampkristal slucht haar doet verdikken; welk een en ander die zwelling te wege brengt, die eene zadeldrukking aankondigt.

Deze verklaring zal de oorzaak van het verschijnsel oplossen, waarom menigmaal de best gevormde zadels drukken; als mede waarom men door steeds of bij afwisseling te draven, zelfs bij min passende zadels, minder in dezen gang dan in den stap drukt; wijt hij de sterkere beweging in den draf, door eenen versnelden omloop, den tegenstand ligter overwonen wordt; gelijk ook waarom vette paarden meer dan magere er aan onderhevig zijn, terwijl zulks ook de doelmaticgheid zal doen erkennen van het gedrag van ervaren ruiters, die niet slechts eenen geruimen tijd laten verloop en alvorens af te zadelen, en zulks naar mate zij zich langer bewogen hebben, maar die in plaats van den singel los te maken, hetwelke vaak uit kwalijk geplaatste sporing des paards geschiedt, interendeel dezelve aangespen om den aandrang der vochten slechts trapswijs in de overspannene vaatjes toe te laten.

297 De aanhoudende of ongelijke drukking, vooral der bladen of stegen des zadels, brengt de brandvlek voort, waardoor de omloop der vochten in de vaten der huid belet, en derzelver werkzaamheid verlamd wordende, deze als doet versterven.

298 In de eenvoudige zadelkwetfing heeft alleen eene kwetfing der vleeschdeelen plaats, welke zich dadelijk kanmerkt door eene ongewone hitte en zwelling, veroorzaakt door de uitstorting der vochten uit geborstene vaatjes, welke men zoo spoedig mogelijk door aanwending van eene der in n°. 84. en 85. aangewezene middelen, moet trachten te verdeelen, of wel, men neemt eene ons ammoniakzout, legge dit tusfchen twee linnene lappen op de beschadigde plaats, bevochtige het met koud bronwater en $\frac{1}{3}$ azijn, in één kan van hetwelke, men eene ons falfpeter opgelost heeft, herhalende zulks zoo vaak, tot het ammoniakzout ontbonden en het gezwel verdwenen is, tot welk einde men ook n°. 85. gebruiken kan. Bij gemis van andere middelen neme men een handvol klei, eene handvol zout, en make zulks met eene genoegzame hoeveelheid water tot eene pap, welke men op de kneuzing legt; fomtijds is eene versche graszode welke men met de graszijde op dezelve legt en

en met koud water, zoo mogelijk met azijn of brandewijn bevochtigt, tot derzelver verdeeling voldoende.

In het algemeen zijn het de prikkelende middelen welke aan de opflorpemde vaten eene genoegzame werkzaamheid tot inzui- ging der uitgestorte vochten teruggeven, en hierdoor de verdeeling bewerken moeten, terwijl tevens de koude derzelver aandrang vermindert, en de afleiding te weeg brengt der warmtestof, door de vermeerderde werk- zaamheid der vaten veroorzaakt; zijnde voorts het schootwater van THEDEN in deze ge- vallen zeer dienstig.

Indien het gelukt de kneuzing te verdee- len, zoo moet men derzelver oorzaak, door de verbetering des zadels enz. wegnemen, en de plaats nog eenige tijd met koud wa- ter waschen.

299 Geschiedt echter de verdeeling niet vol- komen, zoo ontstaat er of eene waterblaas, welke verouderende in eene zwam of wild vleesch ontaart, of wel de kneuzing gaat in eene zoogenaamde brandvlek of in een etter- gezwel over.

300 Eene zoodanige waterblaas moet ge- opend, de vochtigheid uitgedrukt en het
mid-

middel n°. 86. eens ingewreven worden.

301 Is er eene zwam aanwezig, zoo doe men eene diepe insnijding, en poge ze door n°. 86. tot ettering, te brengen of wel men snijde ze geheel uit en verbind de wond met droog plukfel.

302 Bij eene brandvlek die ontstaat wanneer de verdeelende middelen vruchteloos geweest zijn, en de huid kaal, zwart en hard als leder doet worden, moet men deze van het daaronder leggende celwijs - weeffel afscheiden, het zij door dezelve tweemaal daags met boter of reuzel, of indien zulks mislukt met n°. 87. te bestrijken, en ze vervolgens langzamerhand met eene schaar af te snijden, terwijl men de daaruit ontstaande vlakke wond met osterlucie - afkookfel, met extract van lood of goulards water (*aqua goulardi*) en zelfs met zuiver water kan genezen.

303 De meeste kneuzingen aan de schoft welke niet door de verdeeling weggenomen kunnen worden, veroorzaken een ettergezwel; indien dus de dikte niet in ten hoogste vier dagen verdwijnt, zoo moet men de ettering bevorderen, en vervolgens, wanneer de etter zich in hetzelfde beweegt, het op de laagste plaats openen; terwijl men zoo wel dan, als wanneer in gewone zadelkwetsing de ontfeking

king vernindert, ze met kompresfen met n°. 89. bedekt, vervolgens legt men er de etterbevorderende zali n°. 77. of 79. en als omflagen n°. 88. op. Is de ettering goed, zijn de randen der wond zacht, en begint zich deze te vullen of te fluiten, zoo moet men haar met n°. 91. verbinden, en tegen het wilde vleesch n°. 92. gebruiken.

304 Veel gevaarlijker, ten minften langwili-ger in de genezing is de diep indringende zadelkvetfing, waardoor been-deren, kraakbeenderen en bnden beledigd zijn, het zij zulks door de onmiddelijke drukking, of door het invreten van den verouderden etter veroorzaakt is geworden; zulks wordt kenbaar aan het vuile, stinkende, bruine vocht, dat zich in plaats van etter uit de wond begint te ontlasten, aan het loodkleurige bruine vleesch derzelve, aan het wilde vleesch dat zich in haar ver- toont, en aan de harde fpekachtige wond- randen.

In alle gevallen moet de wond genoeg-zaam geopend worden, om den etter eene vrije ontlasting te geven, en vroegtijdig ge- noeg, om deze te beletten verzakkingen te vormen; hebben deze door verzuim plaats, zoo moet men de, door den ouden etter veroorzaakte fistelachtige kanalen openen; daar-

daarenboven moeten de eeltachtige randen, welke lij verouderde wonden alle genezing in den weg staan, weggesneden, weggebeten of door insnijdingen tot ettering gebragt worden, terwijl in gespannene en pijnlijke wondranden, vooral het uitgeperste sap van klisfenkruid met ongezoutene boter, het afkookfel van klisfenwortel, (*rad. bardana*), als mede rosemarijn en groene tabaksbladen, zeer heilzaam is.

305 Is men beducht dat de nekband aangestast is, zoo gebruike men n°. 90., en als omslag n°. 84. *a.* terwijl men in de wond sijn gemaakt osterluciekruid strooit, men ga genoegzaam op gelijke wijs te werk, wanneer beenderen aangedaan zijn, vooral bezige men n°. 82 *a*, *b.* en 90. en 82, *b.* met roode neergeploffte kwik vermengd, hetwelke de beenderen doet afschilferen en tot genezing voorbereidt, waarna men ze als eene andere wond behandelt.

Van deze middelen kan men zich niet alleen met vrucht in door zadelkwetsing ontstaande verouderde eeltachtige wonden, bedienen, om ze te zuiveren, maar de verouderde verharde sponsachtige gezwellen op de schoft, kan men het beste door het dagelijks besmeren van roode neergeploffte kwik met reuzel, in ettering doen overgaan.

306 In het algemeen genezen de zadelkwetsingen des zomers en bij hitte langzamer, dan in den winter, moettende men, indien, zoo als somtijds in dit jaargetijde gebeurt, wormen zich in de wond vertoonen, dezelve met n°. 81. *a.* of *b.* nat maken.

Wordt het paard door den singel of eenig ander deel der toerusting gekwetst, zoo moet men zulks als eene andere kneuzing behandelen en de wond met water of loodextrakt bevochtigen.

a. De leggers en schijthakken.

307 De zoogenaamde leggers en schijthakken, welke uit gezwollen aan den elleboog en de punt der waai of des haks bestaan, en hun aanwezen, uit kneuzingen of andere oorzaken ontleenen, bevatten eene waterachtige vochtigheid, somtijds etter, en gaan, indien zij verouderd zijn, vaak in eene sponsachtige zwammige zelfstandigheid over.

308 Ontstaan de leggers uit het liggen op de kalkoenen, zoo moet men in de eerste plaats het ijzer verwisselen voor een ander dat deze niet bezit, en het paard een overvloedig legstroo geven; voorts geschiedt derzelver wegneming alleen op twee wijzen, het zij door verdeling of door ettering.

Tot de eerste, welke men steeds bij voorkeur

keur moet trachten te bewerken, zijn de tegen de kneuzingen voorgeschrevene middelen, die waarmede men beginnen moet, zoo lang het gezwel nog heet is; zoo als het wasfchen met koud water, omslagen van leem, azijn, ammoniakzout en herhaald wrijven, terwijl n°. 95., driemaal daags fterk ingewreven, door veeartfenijkundigen zeer aangeprezen wordt.

Is het gezwel koud en hangende, zoo trachte men het door inwrijvingen van n°. 97. *a.* waarbij men des noods geest van kamfer voegt, te verdrijven; kunnende men ook tot hetzelfde oogmerk eene dunne dragt onder het vel fteken.

Gaat het in ettering over, zoo moet men het openen, en voorts als een ander gezwel genezen.

Om verouderde leggers te verdrijven, wrijve men om den anderen dag n°. 96. *a.* of *b.* in, en doe dit door nabij houden van eenen heeten fteen of gloeiend ijzer intrekken; hiermede vare men voort tot de ettering ontftaat, waartoe men n°. 93. gebruikt en dagelijks den omtrek der wond met n°. 78. warm baadt; waarna men ze met n°. 82, *a.* zuivert, en met n°. 94. geneest; terwijl indien zich een zwam in dezelve vertoont, eene dragt door den legger geftoken moet worden.

oorzaken van stooten of wrijven voortgebracht, moet men in de eerste plaats, de aanleiding wegnemen, en als zij ontstoken zijn, verdelende middelen aanwenden; is het eene waterblaas, zoo gebruike men uitwendige prikkelmiddelen, gelijk bij de leggers en kerve de huid; terwijl men tegen zwammen n°. 97 of kwikzalf inwrijft.

d. Kwetsing door het overtreden in den halfterketen, slagen of stooten.

310 Men wasche de wond met spaansche zeep of blaauw water n°. 98, en indien dezelve met verrekking en zwelling der koot of waai gepaard gaat, zoo gebruike men, wanneer de kwetsing nieuw is, omslagen van azijn, water, zout of ammoniakzout en potaarde, tot de ontsteking verdwenen is, en geneze vervolgens de wond met THEDENS schootwater; terwijl, wanneer dezelve zeer diep is, lood-extrakt en goulards water met bijzonder nut gebruikt worden. Op gelijke wijze ga men bij slagen en stooten te werk die de beenen treffen, terwijl men tot bevordering van de opslorping der uitgestorte vochten, het paard door het te leiden, dagelijks eene gematigde beweging moet doen verrigten.

e. De peeskwetsing of peeskwelling.

311 Hierdoor verstaat men de zwelling of kwetsing

sing der groote buigpees van het voorbeen, door eene uitwendige beschadiging veroorzaakt, en welke of alleen de peesfcheede of tevens de zich daarin bewegende pees beleedigt, waarvan het laatste steeds bedenkelijker dan het eerste is.

In het eerste geval, wanneer dittoeval slechts in eenen geringen trap plaats heeft, en niet verouderd is, kan het omflaan van leem met loodextrakt en water voldoende worden geacht, edoch wanneer hetzelfde verouderd is zoo moet men zeepgeest met kamfer bezigen.

Is de peesfcheede gescheurd, zoo legge men op dezelve kompresen met zeepgeest, en omzwachtele het been van de knie aan de koot, endoe hetzelfde door middel van een riem en gesp. eene eenigzins gebogene stelling aannemen, van welken riem men het echter alle twee dagen bevrijden moet en niet nalaten den kogel vlijtig met koud water te waschen.

112 Merendeels vindt men in dit toeval knobels in de peesfcheede, vooral wanneer het uit eene reumatieke oorzaak ontstaat, of deze er zich bijvoegt; alsdan bade men het been met n°. 78 warm gemaakt, wrijve het daarna met terebinthijn - olie en vervolgens sterk met stroo; terwijl men, indien na verloop van drie weken deze behandeling geene gunstige gevolgen te wege brengt, eene dragt aan dat been moet zetten.

f. De beschadiging der knie.

- ▲ 313 Dit toeval; door stooten of vallen veroorzaakt, kan alleen in eene kneuzing bestaan of ook door eene wond verzeld worden, wier verwaarloozing of veroudering, vaak een gezwel ten gevolge heeft, waarin zich eene kniezwam bevindt, en dat zelfs in eene beenverharding ontaarden kan; deszelfs genezing vereischt, dat men het gezwel even als eene andere kneuzing pogen te verdeelen, en indien eene opene wond er mede gepaard is, met n°. 94 geneest. Terwijl men een verouderd, en in een kniezwam ontaard gezwel met n°. 97. waschen en zulks niet helpende drie dagen lang met n°. 96, *a.* of *b.* inwrijven moet. (13)

g. De kroonbetrapping.

- 314 Men neme bij deszelfs genezing in aanmerking of het ongemak versch dan wel of het verouderd is. In het eerste geval neme men het losgetrapte hoorn weg, zuivere de wond
van

(13) De kniezwam of witte zwelling wijkt zeldzaam voor de gewoone middelen, waar onder n°. 96, *c.*, mede eene plaats verdient, hetwelke in de gewone heilkunde met vrucht tegen dit ongemak aangewend wordt. Wanneer dus de opgegevene middelen niet helpen, zoo zijn de eenige waarvan men nog iets te wachten heeft: door het zetten van dragten ter wederzijde der knie, eene sterke en aanhoudende ettering te weeg te brengen, of het gloeiende ijzer aan te wenden, en daarna de geschroeide plaatsen in fontanelen te veranderen. Wanneer echter het ongemak verouderd, is het meestal ongeneeslijk of wordt door eene beenuitwasping (*anchylosis*) gevolgd.

van haar en alle vreemde lichamen, en waschen dezelve dagelijks uit met laauw zeepwater, met kalkwater, of n°. 98, en bij gebrek daarvan met koud water of pis; terwijl men voorts de voet meermalen daags in koud water moet stellen.

§15 Veelal ontstaan kroonverzweringen uit bovengemelde oorzaken, vooral wanneer in voetgebreken de etter zich niet bij tijds genoegzaam heeft kunnen ontlasten en holten tusschen den hoorn- en vleeswand gemaakt heeft; om zulks voor te komen, en deze ontlasting te weeg te brengen, moet op de laagste plaats eene opening in den wand of in de zool gemaakt, en de wond meermalen met zuiver put- of kalkwater, of met n°. 98 uitgespoten worden, waartoe men bij gevreesd beenbederf, n°. 82, *a a.* gebruiken kan en tot derzelver genezing n°. 94. aanwenden.

§16 Soms wordt eene zoodanige verzwering, welke het padgezwell of de vijk geraamd wordt, door inwendige oorzaken voortgebracht, van welke bij de mok nader aanwijzing zal geschieden.

Een zeer gewoon gevolg der kroonbetrapingen zijn de hoornkloven, welke volgens derzelver plaats, in kwartiervoeten, wanneer zij de zijdelingsche hoornwanden; en

in osfenvoeten, indien zij den voorhoef treffen, onderscheiden worden, en meest uit de door de betrapping ontstaande scheuring van den zoom ontstaan, vooral wanneer het hoorn zeer broos is, of dat de smeden zulks door afraspen verdund of bedorven hebben. Het beste middel tegen dezelve bestaat in het buigzaam houden van het hoorn door middel van hoefmeer, het bestrijken van basilikum-zalf op de kroon en den hoef, voorts in het in de weide zenden; terwijl bovenal een doelmatig beslag tot voorkoming en genezing van dit ongemak het meeste toebrengt.

k. De steengallen.

317 Hierdoor verstaat men de blaauwe of roode vlekken, voortgebragt door kneuzingen, die de vleeschzool, merendeels in de hoeken, of tusfchen den wand en de ftraal treffen en door het veroorzaken eener meerdere of mindere ontsteking, den gang des paards pijnlijk maken; terwijl men als derzelver oorzaken, kwalijk passende ijzers, vooral wier binnenranden de zool drukken, bijzonder wanneer deze dun uitgesneden is, te regt kan aanmerken.

Naar mate de vlek rooder of blaauwer en de ontsteking fterker is, moet de geneeswijs inge-
rigt worden. In de eerste plaats trachte men de ontsteking weg te nemen, en indien zij tot ettering is overgaan, deze eene vrije ontlasting

te

te bezorgen; het eerste geschiedt door omslagen van leem en het bevochtigen met lood-azijn; terwijl men, wanneer zich eene groote hitte openbaart, de plaats der steengallen tot het leven toe uitveegt, doorsnijdt, laat uitbloeden en met leem inslaat; voorts besla men na eenige dagen dien voet met een breed uitgeslagen ijzer, waarvan men den laatste nagel weglaat en het weinig aanhaalt; en giete voorts niets anders dan ten hoogste een weinig van n°. 98 op de wond.

Is dezelve in ettering overgegaan. zoo make men openingen in de witte lijn en geneze haar met een mengsel van gelijke deelen: osterlucie-afkookfel en aloë-tinktuur.

i. De kneuzing der hielen of het verballen.

318 Dit ongemak dat merendeels door het gaan op zeer harden grond, door te korte, of drukkende ijzers veroorzaakt wordt, kenmerkt zich door den pijnlijken gang op harde wegen; het knijpen der hielen met de tang doet de zetel der pijn ontdekken, terwijl het doorbreken van den etter boven de hielen, den overgang der ontsteking in ettering aanwijst.

Hiertegen zoek men de ontsteking door leem-omslagen weg te nemen, alsmede door de voet meermalen in koud water te stellen.

Breekt de etter aan een of beide de hielen, boven den zoom uit, of is deze plaats week

en pijnlijk, zoo moet men in den hoek van een of beide de hielen eene kleine opening maken; voorts de wond met schoon water of n°. 98. uitspuiten en de voet dikwijls in koud water zetten.

Is de kneuzing der vleeschzool zoo sterk, dat deze zich van de hoornzool afscheidt, zoo make men aan de beide wanden, en naar omstandigheden ook aan den voorhoef, kleine openingen ter wijdde van een stroohalm, en behandel ze na het uitbloeden der wond op gelijke wijze.

Men behoeft bij deze en foortgelijke openingen, geene ongerustheid te voeden, wegens het te voorschijn komen der vleeschzool of van het zoogenaamde leven; alleen vermijde men daarbij het gebruik van vette prikkelende middelen, daar dit toeval door omslagen van leem, en des noods door insnijdingen in de vleeschzool van zelfs verdwijnt.

k. De vervangenheid door uitwendige oorzaken.

319 Onder de toevallen aan welke de beenen door beschadigingen onderhevig zijn, kan men te regt ook die vervangenheid rekenen, welke haren oorsprong alleen van uitwendige oorzaken ontleent en daardoor van diegene onderscheiden is, welke door reumatieke of zoodanige oorzaken te wege wordt gebragt, die
meer

meer in het inwendige des dierlijken gestels gelegen zijn, ofschoon deze zich ook zeer dikwijls met haar vereenigen. Bij de beschrijving der reumatieke toevallen is van dezelve ook een algemeene beschouwing in §. 107. geschiedt, terwijl wij ons thans tot eene bijzondere zullen bepalen, van diegene welke door uitwendige oorzaken ontstaat, en grootendeels door plaatselijke middelen weggenomen moet worden.

320 Deze vervangenheid wier zetel steeds in den voet gevestigd is en meestal de vóór- zeldzamer de achterbeenen treft, bestaat in eenen ontstekingsachtigen toestand van deszelfs zachte deelen, welke eenen meerderen toevloed van vochten derwaarts veroorzaakt, dan deze hoornachtige doos kan bevatten, welke haar dus prangt, wanneer zij door dezelve uitgezet worden.

Hierin is de oorzaak gelegen van de ongemeene pijn, hitte en zwelling der voeten, welke bij toeneming van het ongemak zich verder tot de buigspieren der beenen uitstrekt en deze stijf en onbuigzaam maakt; worden voorts door eene gepaste behandeling de oorzaken en gevolgen van dit toeval niet weggenomen en de ontsteking verdeeld, zoo gaat dit deszelfs gewonen loop, veroorzaakt de grootste verwoestingen, en maakt het paard, zoo niet
ge-

geheel, ten minste voor langen tijd onbruikbaar.

321 Bijzonder ziet men dit toeval in hitte, droogte en des zomers het paard treffen, wyl alsdan de hoornwanden harder, en minder toegevend zijnde, de in haar bevatte deelen ligter drukken en aanleiding tot ontsteking geven kunnen.

Alles wat prikkel, pijn en ontsteking kan voortbrengen, verstrekt hetzelfde tot oorzaak, zoo als alle feilen die bij het beslaan of door slechte vorming der ijzers begaan worden, drukkende ijzers, het verdunnen, uitsnijden en branden der zool; het doorsnijden der hoeken, het gaan over harde wegen, het inkrimpen van den hoof door hitte en droogte; te langdurige en plotselinge rust, enz.; terwijl voorts paarden met enge, platte, en volle hoeven meer aanleg tot hetzelfde hebben, dan die welke goede voeten bezitten.

322 Dit toeval wordt in het algemeen gekenmerkt door pijnlijke stijfheid in het gaan, welke zich naar den trap des ongemaks steeds verder langs het been uitstrekt, en eindelijk hetzelfde geheel inneemt, waarbij het zeer bezwaarlijk wenden en teruggaan kan.

323 De minste trap van hetzelfde is die het ver-
bal-

ballen te wege brengt, waarbij het paard wel pijnlijk op den voorhoef gaat, doch het been niet stijf is; bij eenen hooger en trap of sterker beschadiging, waarin reeds eene uitstorting en sterker toevloed van vochten plaats heeft, en de hoorn- en vleeschdeeler gescheiden zijn, is de beweging met meer pijn verzelt, en de stijfheid strekt zich tot de knie uit; terwijl tevens de staat der gezondheid gestoord is, welke in verderen voortgang des ongemaks, nog meer aangedaan wordt, wanneer de ontstekings- en ettering overgaat: die, ingeval geene doelmatige middelen aangewend worden, om den etter ontlasting te geven, de noodlottigste gevolgen heeft; daar dezelve de inwendige deelen doorknaagt, de beenderen aantast en verplaatst, de vorm van het hoorn verandert en zelfs den geheelen hoef doet afvallen, ja de dood des diers veroorzaken kan, terwijl zelfs na de genezing dit meestal tot verderen dienst onbruikbaar blijft. Dit legt de oorzaak aan den dag, waarom eene verwaarloosde of kwalijk behandelde vervangenheid, gewoonlijk door ringhoeven en volvoeten, door den veranderden vorm van het hoorn en verplaatsing der beenderen des voets gevolgd wordt.

- 324 Aangezien ontstekings- en daarop volgende vermeerderde toevloed van vochten, dit toeval veroorzaken, wordt de wegneming en ver-
dee-

deeling der eerste, benevens de vermindering der laatste als van zelve ter genezing aangewezen, en zulks te weeg gebragt, door het afleiden der warmtestof, waar toe het plaatsen der voeten in natte klei een voortreffelijk middel oplevert; alsmede, door warme baden tot bevordering der ontspanning; terwijl het dadelijk verrigten eener aderlating, vooral aan de boegaderen, en het zetten van dragten aan de lijdende beenen, het tweede oogmerk: de vermindering van toevloed der vochten, vervult; waarbij men met vrucht het inwendig gebruik van salpeter of n°. 7., en het voeden met zemel- en meeldranken voegen kan.

Is dezelve zoo verouderd of verzuimd dat de ettering plaats grijpt, zoo moeten de openingen ruimer gemaakt, en deze volgens de in § 107. en 282., wegens de voetwonden gegevene voorschriften, behandeld worden; terwijl het in de weide zenden der paarden op alle soortgelijke ongemakken den heilzaamsten invloed heeft.

Is echter de kwaal tot eenen hooger en trap gestegen, zoo dat men niet meer kan verwachten, dat de vochten verdeeld of opgenomen zullen worden, zoo blijft er niet anders over dan derzelver ontlasting te bevorderen, door op de pijnlijkste plaatsen der zool op de witte lijn, kleine openingen van omtrent eene lijn in middellijn te maken, en voorts volgens de voorschriften van § 107. te werk te gaan.

DER-

DERDE HOOFDDEEL.

DE VERREKKINGEN EN VERSTUIKINGEN.

25 Dus noemt men de toevallen, wanneer door eene geweldige oorzaak, eene der beenderen geheel of gedeeltelijk uit deszelfs gewrichtsholte geweken is, of dat deszelfs banden eene bovenmatige uitrekking ondergaan hebben, welke alle in eenen meerderen of minderen trap, kreupelheid ten gevolge hebben.

26 Men onderscheidt dezelve in verrekkingen van het kruis, van het heupbeen, der waai, van het armbeen, der knie, en van de koot, waarvan de laatste het meeste plaats grijpt, terwijl de eerste in de meeste gevallen onheelbaar zijn, en slechts in eenen geringen trap eenige hoop tot herstel vergunnen; dus is insgelijks de verstuiking van het kootbeen of het zoogenaamde overkoten, waartoe hooge kalkoenen en lage voorhoeven, bij springen, uitglijden enz. veel aanleiding geven, een zeer bedenkelijk toeval, hetwelke alleen door een spoedig zetten, of herplaatsing door eene hierin geoefende hand, herstel belooft.

Bij

327 Bij geringe verstuikingen, gunne men het paard rust en verschaffe hem alleen eenige beweging door het een weinig te doen leiden, men wrijve het met n°. 99, bevochtige voorts eene handbreede zwachtel met n°. 100, met welke men het beschadigde been tamelijk vast omwindt, en zette voorts den voet vaak in koud water.

Is er eene sterke zwelling bij de verstuiking of verrekking aanwezig, zoo wasche men deze dikwerf laauwarm met n°. 102, wrijve vervolgens n°. 100. b. of 101. sterk in, terwijl men om daarna de banden weder te versterken, de lijdende plaats vaak met koud water baadt en met overgehaalden wijngeest wast.

E E R S T E A R T I K E L.

De kreupelheid uit deze en uit reumaticke oorzaken.

328 De meeste der kreupelheden welke onder de benaming van boeglam en kruislam voorkomen, hebben hun aanwezen of geheel aan eene reumaticke oorzaak te danken, of deze voegt zich gewoonlijk bij de uitwendige beschadiging en blijft dan nog voortduren, wanneer deze reeds lang opgehouden heeft; uit dezen hoofde is het steeds raadzaam iedere kreupelheid te behandelen als reumaticke.

kreupelheid wier zetel niet in den voet is, voornamelijk als een reumatiek toeval te behandelen; bestaande, in het zetten van dragten aan het schouderblad, of tusfchen de vóórbeenen, indien het vóórgeftel lijdt, en aan de dij of op het kruis, wanneer de kreupelheid zich aan het achtergeftel openbaart, terwijl men daarbij het paard verfterkend voedsel geeft en eene matige beweging doet verrigten, door welke volftrekt onfchadelijke middelen men alle reumatieke gevolgen voorkomt.

In de weinige gevallen dat de boeglammgheid alleen door eene uitwendige oorzaak: als vallen, fpringen, uitglijden, te weeg gebragt wordt; kan zij haren oorfprong ontleenen: 1^e uit eene verrekking van het armbeen en fchouderblad; 2^e. uit eene verrekking der fchouderblads- en armbeensbanden, van die der zoogenaamde beursbanden der knie of wel van die, welke het fchouderblad aan de fchoft bevestigen; 3^e. uit eene door kwetfing veroorzaakte uitftorting der lijmpa-vochten, waardoor de fpierbeweging belemmerd wordt; terwyl bij de kruislammgheid zulks door eene diergelijke verrekking van het heup- en dij- en fcheenbeen te weeg gebragt kan worden.

T W E E D E A R T I K E L.

*Over de onderscheidings - kenmerken der
kreupelheid.*

329 Daar de kennis van den aard en zetel der kreupelheid volstrekt den weg tot hare genezing moet aanwijzen, zoo is die der merkteekenen, waardoor men dezelve kan onderscheiden, een allergewigtigst onderwerp van nasporing: te meer, daar men hierin dagelijks de grootste mislagen ziet begaan.

De meeste kreupelheden hebben haren zetel in den voet, zeer zeldzaam is deze in de schouder, het kruis, de heup, de knie of waai, slechts somtijds in de koot, doch meest altijd in den hoef te zoeken.

Men ontdekt welk been het is waaraan het paard lijdt, in den gang daardoor, dat het bij het nederzetten van hetzelfde het hoofd opheft, doch dit laat zinken, wanneer de lijdende voet opgeligt en de gezonde op den grond is.

330 De boeglamigheid, welke meest altijd uit eene reumatieke oorzaak ontstaat, wordt gekenmerkt door de volgende teekenen: zij is afwisselend, de eene tijd merkbarer dan den anderen, vooral bij koud en vochtig weder sterker dan in droog en warm; zij is sterker in het begin der beweging, dan wanneer deze

eenigen tijd geduurd heeft, en omtrent gelijk op harden of zachten grond; op stal zet het paard het lijdende been vooruit; in het gaan zet het den voet vlak neder, alleen in het bovenbeen bespeurt men pijn. De stap is kort, slepende en stijf; het treedt met dit been korter dan met het andere, en brengt (vooral bij verrekking) hetzelfde niet regt, maar kringswijs vooruit; teruggaande, sleept het dit stijf na en hinkt alsdan, zoo wel als bij het wenden aan die zijde het sterkste waar de kreupelheid schuilt; terwijl voorts, wanneer de boeg- of kruislammigheid verouderd is, het lijdende been trapsgewijze vermagert.

31 Ontleend de kreupelheid hare oorzaak uit de verrekkingen van de beursbanden der knie, zoo mijdt het paard stilstaande, dat been; het treed pijnlijk wanneer men het heen en weder, en vooral, indien men liet terug doet gaan, edoch het zet daarbij den voet plat neder; bij het voortgaan treedt het korter met dit been en beweegt het slepende, kringswijs; terwijl de eerste treden het pijnlijkste zijn, en het even kreupel op zachten dan op harden grond gaat.

32 Bij verrekkingen van het kootgewricht kan het paard in het geheel niet op den voet treden wanneer de koot ontwricht is, maar

hinkt op drie beenen , is de knokkel nog in het gewricht , zoo kan het den voet nederzetten offchoon niet dan zeer pijnlijk , waarbij het echter niet geheel doortreedt , maar meest op den voorhoef gaat ; beweegt men het gewricht , zoo geeft het pijn te kennen ; terwijl voorts in gaan de pijn gedurende de eerste schreden heviger is dan in het vervolg.

333 Kreupelheid door zwelling of kwetsing der buigpees van het voorbeen te weeg gebragt , onderscheidt men : doordien deze gezwollen , weinig beweegbaar en met kleine knobbels bezet is ; in den stal zet het paard den pijnlijken voet vooruit , betoont in het begin van het gaan hevige smert , en kan door het zwellen der pees niet geheel doortreden , maar gaat in het den aanvang op den voorhoef. De gevolgen dezer kwaal verouderd zijnde , is een steltvoet.

334 In de kreupelheid door mok , gezwollene beenen , enz. , is de oorzaak oogenfchijnlijk , den gang is daarbij in den aanvang gespannen en pijnlijk doch vast met den voet.

335 Even zoo zichtbaar is die welke uit eene uitwendige kneuzing , het fteken met den mistvork ; verhangen in den halfterketen , kroonbetrapping , ftrijken , enz. ontstaat. Bij

336 Bij die uit kroonbetrapping, gaat het paard kreupeler op harden dan op zachten grond en uit bij het onderzoek met den hamer des te meer pijn, naar mate de beschadiging dieper is.

337 Door ftrijven gaat het de eerste schreden na hetzelfde belemmert, waarna de kreupelheid vermindert, welke alsdan weder merkbaar wordt, wanneer het zich op nieuw aan de beschadigde plaats stoot, als wanneer het vaak op drie beenen, zoo lang voorthuppelt tot de hevigheid der pijn voorbij is.

338 Bij kreupelheid door in den voet getrapte ligchamen, kan men deze of zien, of de beschadiging door het kloppen met den hamer op de zool ontdekken.

339 In vervangenheid kan het paard alleen met moeite, vaak in het geheel niet voortgaan, en hinkt bij eenen hoogen trap; terwijl het in alle kreupelheden die men aan reumatische oorzaken moet toeschrijven, wijl men geen uitwendige oorzaken er van ontdekken kan, de eerste schreden het meeste hinkt.

340 Daarentegen neemt de kreupelheid met het gaan toe, wanneer dezelve in den voet schuilt: zoodanige paarden bewegen het been

vrij en regt, maar zetten den voet op zachten grond veel meer dan op harden door; men heeft des te meer rede om deze oorzaak te vermoeden, wanneer men geene uitwendige beschadiging bewust is, en de kreupelheid zich kort na het beslaan, na gebrekkig beslag, of eenen marsch op zeer harden grond openbaart, en het paard daarbij echter eene volkomene gezondheid schijnt te genieten.

DERDE ARTIKEL.

De wijze van onderzoek tot ontdekking der oorzaak en plaats der kreupelheid, vooral die des voets.

341 Ten einde men zich in staat gesteld bevindt, over den zetel der kreupelheid, vooral die welke in den voet gelegen is, een juist oordeel te vellen, onderzoekte men in de eerste plaats: of het paard, gevallen, gestooten of korteling beslagen is, of sterk gesprongen heeft; men lette of het op eenen harden grond meer dan op eenen zachten linkt, of het na het beslaan zulks sterker doet dan te voren plaats had, hetwelke de zetel der kreupelheid in den hoef verradt; gelijk mede na deszelfs duur, welke zeer veel licht deswegens geven kan, aangezien elke hoefkreupelheid in weinige weken betert of in ettering overgaat.

Ten

342 Ten einde zich nader hiervan te overtuigen, drukke men de hielen of ballen met beide handen sterk te zamen, wyl dit alsdan het paard pijn zal doen uiten; men onderzoeke voorts of eenig deel van den hoofwand, der hielen of straal eene buitengewoone hitte bezit; voorts make men den voet met een oud mes schoon, ter ontdekking of zich ook iets tusfchen de zool en het ijzer bevindt, en of dit dezelve niet hier of daar kneld: moettende men steeds de rug van een mes tusfchen deze beide kunnen brengen. Ontdekt men niets van dit alles, zoo onderzoeke men verder de straal en hoeken, door dezelve te zuiveren en te drukken, om gewaar te worden of ook fpijkers, glas, enz. in dezelve mogten gedrongen zijn; heeft zulks geen plaats, zoo kloppe men op alle nagels en zelfs op het ijzer, knijpe vervolgens met den hoeftang rondsom den hoef en de zool, en neme eindelijk het ijzer af het welke steeds bij het onderzoek van iedere kreupelheid moet gefchieden, en in de meeste gevallen, diegene, welke in den hoef fchuilt, aan den dag zal leggen, door de pijn welke het paard daar bij uit

343 Vindt men echter geene dezer teekenen in den hoef zoo zette men het onderzoek tot het koot gewricht voort: of dit ook heet en gezwollen is, hetwelke men wel moet onder-

fcheiden of eene verwaarloosde voetkwaal hier-
toe aanleiding heeft gegeven.

- 344 Is de koot onpijnlijk en vrij in de bewe-
ging, zoo ga men tot het onderzoek der
buigpees over, en terwijl men dezelve tus-
schen twee vingers op en nederfchuivende,
drukt, neme men waar, of zij ook gezwollen
en ontstoken, of met kleine knobbels bezet is,
welke laatste eene reumatieke oorzaak hebben,
terwyl het eerste uit beschadigingen ontstaan
kan.
- 345 Heeft geene dezer gevallen plaats, zoo let-
te men of ook de knie gezwollen is, of dat
zich barsten in hare buiging bevinden, welke
aanleiding tot de kreupelheid kunnen geven;
Ontdekt men geen van beide, zoo poge
men door sterk drukken met de beide dui-
men op onderscheidene plaatsen van het
schouderblad, te ontwaren, of het paard
door uitwendige of reumatieke oorzaken ook
boeglam is, hetwelke meestal, even als
aan de achterbeenen, door het laatste ontstaat,
of zich bij eene plaats gehad hebbende ver-
rekking voegt.
- 346 Schuld de kreupelheid in de achterbee-
nen, zoo moet men even als bij de voorbeenen
het onderzoek met den hoef en de koot aan-
van-

vangen, en indien men aldaar de oorzaak der kreupelheid niet ontdekt, dezelve tot het kniegewricht, of dat van het fchenkel- en dijbeen voortzetten, waar meest altijd de zitplaats der kreupelheid is, welke de achterbeenen door uitwendige oorzaken aandoet; waarbij men het gewricht fterk met de hand te zamen drukt, in diervoege, dat men de knieschijf juist onder de hand heeft.

Geeft zulks nog geen licht, zoo is de kreupelheid als eene heup- of kruisflammigheid aan te merken, welke meest altijd reumatiek is, en die men op gelijke wijs als de boegflammigheid, trachte te ontdekken, en te genezen.



VIERDE HOOFDDEEL.

DE GEZWELLEN.

EERSTE ARTIKEL.

a. *De heete gezwellen zonder uitwendige oorzaken.*

347 Soms tijds ontstaan heete gezwellen, op de oppervlakte des ligchaams vooral vóór de borst zonder dat men er eene oorzaak van ontdekken kan, dezelve moet men tot rijpheid pogen te brengen, door inwrijvingen van terebinthijn-olie met reuzel, en het opleggen van pappen van lijnzaad-meel tot eene dikke brei in een schapenvacht; vervolgens zoodra men golving (*fluctuatie*) in het gezwel ontdekt, eene ruime opening maken, om denzelven te laten wegvloeijen, terwijl men zoo lang den omtrek nog hard is, met pappen en smeren moet voortvaren en voorts, wanneer het geheel gezuiverd is, de genezing met de daartoe voorgeschrevene middelen: als het afkookfel en poeder van osterlucie, voltoojen.

b. *De beslissende (kritieke) gezwellen.*

348 In sommige ziekten, als rotkoorts en
ver-

vertoonen zich gezwollen , meest voor de borst , onder den buik , op de schoft en de lendenen , welke vlak , breed en niet zeer heet zijn , een flechten etter bevatten , en ingeval zij verdwijnen , meestal doodelijke kenteekenen zijn . Men moet deze tot eene goede ontfeking en ettering pogen te brengen , door middel van het doorfteken met eenen met terebinthijn en roode nedergeplofte kwik bestrekenen dragt , en het zacht schroeijen van derzelver omtrek : door een gloeiend ijzer zoo lang nabij te houden tot het paard pijn uit , waarna men vervolgens prikkelende omslagen van wijn met eikenbast , oplegt , en inwrijvingen van kamfergeest , kwikzalf enz. verrigt ; terwijl men hierbij het inwendig gebruik der middelen voegt die in de rotkoortsen voorgeschreven zijn .

T W E E D E A R T I K E L .

De koude gezwollen.

349 Onder deze behooren in het algemeen al de gene welke bij hun ontstaan weinig hitte bezitten , waaronder men dus ook de leggers , schijthakken , gezwollene beenen , zoude kunnen rangschikken .

In het bijzonder zijn het echter die , welke zich onder den buik vertoonen , zich vaak tot aan de borst uitstrekken , en somtijds van zellis verdwijnen , doch vaak weder aldaar of op andere plaatsen te voorschijn komen .

Der-

Derzelver aanwezen wordt waarschijnlijk veroorzaakt, door eenen toe- en overvloed van lympha en verflapping van het celwijs-weefzel, te weinige beweging en vooral door langdurige rust na sterke vermoeijenissen.

350 Van gelijken aard zijn de onderscheidene foorten van zakgezwellen, dus genaamd, wijl zij als in eenen zak besloten zijn, en volgens de vorm der zelfstandigheid die ze bevatten, in zoogenaamde honig-meel- en spekgezwellen onderscheiden worden, en tot wier wegneming geen ander middel dan het openen en uitsnijden bestaat.

a. De gezwollene achterbeenen en koker.

351 Vaak overkomt paarden welke sterk, vooral met rogge gevoederd worden en weinig beweging hebben, dat hunne achterbeenen en koker zwellen, welke zwelling in den aanvang koud en week is, doch naderhand hard wordt; hetzelfde heeft insgelijks plaats bij zoodanige paarden, welke aan veel beweging gewoon zijnde, lang stilstaan.

Zoo lang het gezwel niet verouderd is noch boven het onderste der pijp reikt, verdwijnt het meestal door eene matige bewegingen dagelijks gedurig wrijven met stroowissen en wolene lappen, gepaard met het baden in koud

water; terwijl men het voorts door het waschen met n°. 103. tracht te verdrijven; voorts doe men bij zeer sterk gevoede paarden eene lating, en geve hen een buikzuiverend middel (purgatie); Helpt dit niet zoo zette men aan ieder been eenen dragt en wasche dezelve met een verdeelend afkookfel (n°. 102).

b. De gallen.

Men onderscheidt dezelve in vlot- knie- en peesgallen; terwijl de hazenhak een gelijksoortig ongemak vormt.

352 De vlotgallen (*vesfignons*) bestaan in eene weeke verhevenheid tusfchen de achillispees en het fchenkelbeen, boven den hak; terwijl de kniegallen zich kort boven de knie bevinden; zy worden door den naam van enkele of doorgaande onderscheiden, naar mate zij aan eene of aan beide zijden van het been aanwezig zijn. Eindelijk bevinden de peesgallen (*molettes*) zich boven de koot tusfchen de pees en de pijp. De vlotgallen zijn of eene uitzetting der peesfcheede, of wel, zij hebben hunnen oorsprong in de flijmbeursen; hetzelfde heeft mede bij de peesgallen plaats, waaraan alle de vier beenen onderhevig kunnen zijn; zij bestaan uit een veêrkrachtig voor drukking wykend
ge-

gezwel , dat eene waterige geelachtige lijmpaachtige vochtigheid bevat , die veelal met den tyd verdikt. In derzelver aanvang en wanneer zij klein blijven veroorzaken deze gewellen weinig nadeel , edoch toenemende , kunnen dezelve kreupelheid veroorzaken.

Derzelver oorsprong is gelegen in overmatige inspanning van jonge en zoodanige paarden , welke een week vezelgestel hebben , welke daaraan meer dan oudere , en van edele rassen , onderhevig zijn.

353 Wat derzelver geneeswijs betreft , zoo moet men zoo lang zij het paard geen hinder veroorzaken , dezelve alleenlijk dagelijksch in eenen emmer koud water baden , en daarna met sterke azijn , waarin eikenbast gekookt , en wat steen - aluin ontbonden is , of wel met n°. 97. waschen.

Helpt dit middel alleen niet , zoo neme men ijzer - oker , mengte dezelve met rooden wijn of azijn tot eene dikke pap , en legge ze op de gal , alwaar men ze 24 uren laat verblijven , vervolgens met koud water afwascht , en op nieuws weder oplegt. De ijzer-oker veroorzaakt door hare eigenschap eene veêrkrachtige zachte bestendige drukking , terwijl daarenboven de ijzerdeelen die dezelve bevat , de verzwakte deelen versterken , en haar de verlorene veêrkrachtige eigenschap terug doen verkrijgen. Edoch
in-

indien men oordeelt, dat het ongemak van eenen zoodanigen aard is, welke naar geene zachte middelen zal luisteren, zoo kan men trachten de opflorpemde vaten eene meerdere werkzaamheid te geven, tot inzuiging der uitgestorte vochten: door het verwekken eener kunstige ontsteking, door de aangedane plaats met steenolie en terebinthijngest, des noods zelfs met euphorbium gom of spaansche vliegen, vermengt, in te wrijven; terwijl men deze ontsteking door loodazijn weder zoeken te verdrijven, wanneer dezelve aan hare bedoeling beantwoord heeft.

354 Eindelijk levert het schroeijen met een knopsgewijs brandijzer, een middel op, waardoor men insgelijks eene kunstige ontsteking te weeg brengt, en tevens de huid vernauwt, door dezelve op de gal met het roodgloeiende ijzer, met punten of strepen, volgens bijgevoegde figuren half door te branden.



Sommige veeartsijkundige hebben het openen der peesgallen, en het trekken van eenen dragt door dezelve, als het eenige middel opgegeven, waardoor men derzelve zekere wegneming kan bewerken, edoch, daar hetzelfde vereischt, dat zulks door eene bijzonder be-

bekwame hand ten uitvoer gebragt wordt , en dan nog zeldzaam van een gewenscht gevolg is , zoo durven wij hetzelfde niet onvoorwaardelijk aanraden.

- 355 De genezing der buitenwaarts onder de waai zich bevindende hazenhakken , kan het beste door het trekken van eene dragt door dezelfde worden bewerkstelligd.

c. De stijfheid der voorbeenen.

- 356 Ontstaat dezelve door te veel rust en voetsel , en heeft daarbij eene hoefontsteking plaats , zoo moeten , zoo wel plaatselijke aderlatingen in de zool , als eene algemeene aan den hals en de boeg geschieden , en voorts , de bij het verballen aanbevolene klei omslagen aangewend , als mede dragten aan de schouders of eene fontenel voor de borst in het werk gesteld worden ; terwijl men het paard eene bestendig herhaalde , doch in den aanvang gematigde beweging moet doen verrigten.

Is de stijfheid aan te veel vermoeijenisfen toe te schrijven , zoo dient tot wegneming derzelve hiertegen in de eerste plaats , rust door eene zeer gematigde beweging afgewisseld ; voorts het gebruik van laauwwarme kruidbaden , uit kamille , salij , rosemarijn , hop , jeneverbesfen , spoeling , enz. zamergesteld , gepaard met inwrij-
vin-

vingen van terebintijn - olie of n°. 97. ; terwijl herhaalde doch kortdurenle koude baden , ver-
eenigd met aanhoudend wrijven , mede zeer
heilzaam aan te merken zijn.

Ook het beflag kan daartoe bij een jong paard
veel toebrengen , door de buigpezen welke
meestal opgekrompen zijn , eene meerdere uit-
strekking te geven ; men snijde daartoe de dragten
trapswijze weg , terwijl men de voorhoef hoog
laat en geve het paar i eerst een beflag met la-
ge , daarna zonder kalkoenen.

DERDE ARTIKEL.

*De Mok , egelsvoet , raspen , kootverzwering ,
rotstraal , vijgwratten.*

357 Alle deze toevallen zijn inderdaad van ee-
nen zelfden aard , welke alleen in trap en plaats
verschillende, onder de huidziekten gerangschikt
zouden kunnen worden.

Derzelver oorsprong is vaak aan inwendige,
doch meest aan uitwendige oorzakan toe te schrij-
ven, als het staan in den mist, in slijk, enz. en voor
al onzindelijkheid door verzuim van poetsen.

358 Onder deze ongemakken is de mok de eer-
ste welke in aanmerking verdient genomen te
worden , dewijl zij den grond tot de ove-
rige legt , welke meestal uit haar ontsprui-
ten.

ten. Men onderscheidt de mok in de eigenlijke (*idiopatfche*), en in die welke zich als een toeval (*fymptoma*) in andere ziekten: als in den droes, na koortfen, enz. vertoont, en niet alleen een zeer gevaarlijk, maar meest een den dood voorfpellend teeken is.

359 De eigenlijke mok heeft meest tot oorzak, onzuivere ftallen, fcherp, ftilftaand mistwater en pis, en het verblijven van vuiligheden en flijk op de beenen; terwijl weeke paarden uit lage vochtige landen ontfproten, met vette beenen en voeten, en ruigbehaarde of zoogenaamde zwaar behangene pezen en vetlokken, zoo als de holfteinfche, vriefche, brandfche paarden enz. veelal bezitten, het meeste aan dit en foortgelijke ongemakken onderhevig zijn.

360 De mok bestaat in eenen uitflag, welke zich meer aan de achterbeenen dan aan de vóórbeenen vertoont, met pijn en zwelling gepaard gaat, en een zeer fcherp flinkend vocht ontlast; meest heeft dezelve plaats aan de achterzijde der koot onder den kogel, doch vaak omringt zij ook het kootgewricht en klimt zelfs langs het geheele been tot aan de hak en knie op, zelfs breidt fomtijds dezelve zich rondom het geheele kootbeen uit en ontvangt dan den naam van kootverzwering.

Bij

- 361 Bij de eigenlijke mok is het paard in den aanvang eenigzins ongesteld, vervolgens zwellen de beenen in den omtrek der koot; na eenige dagen komen kleine puistjes te voorschijn, welke openbreken, en een scherp stinkend nat ontlasten, dat de huid wegvreet, de haren doet uitvallen en eene schurftachtige korst vormt.
- 362 Breidt zich de verouderde mok over de kroon, de koot, den kogel, ja zelfs verder tot aan de waai uit, in diervoege, dat een gedeelte der haren door de ontlaste vochtigheden weggevreten worden, terwijl de andere zich als borstels omhoog rigten, zoo ontvangt dit ongemak, hetwelke somtijds droog en schilferig, doch op andere tijden, vochtig en sijperende is, den kenmerkenden naam van egelsvoet.
- 363 De raspen, barsten en kloven die zich in de buiging der knie en waai vertoonen, en min of meer aanmerkelijk zijn: bezitten eenen gelijken aard als de mok, gewoonlijk zijn zij droog, meelig en schubbig; doch somtijds ook als deze, puistachtig en loopende.
- 364 Voorts ontmoet men somtijds, vooral aan de achterbeenen, onmiddelijk op of boven de kroon, een ongemak, onder den naam van
- R. 2
- vijk

vijk of padgezwel bekend, dat een fcherp vocht ontlast, den hoef aantast, dezen doet openberften, ja fomtijds geheel afvallen.

365 Vaak door de mok veroorzaakt of er op volgende, doch even dikwerf door andere oorzaken voortgebracht, en zich alleen vertoonende, ontmoet men de rotftralen, waarbij de hoornftaal van boven af aan fplijt, en een stinkend fcherp vocht ontlast, dat in het vervolg de geheele ftiaal losmaakt en het paard kreupel doet gaan; derzelver eigene oorzaken zijn een te hoog beflag, zoo dat de ftiaal geen grond raakt; het te veel uitvegen derzelve; nat, koude, mist, en pis waarop het paard te lang blijft ftaan; van welke de hierdoor veroorzaakte meer hoop op genezing geven, dan die door de mok voortgebracht worden.

366 Edoch worden dezelve verwaarloosd, of frekt eene kwalijk genezene mok zich tot de ftiaal uit, zoo heeft zulks zoogenaamde vijf wratten ten gevolg, die in grootere of kleinere uitwassen van wild vleesch bestaan, welke gewoonlijk aan de ftiaal of hiel, fomtijds terzijde der zverende ftiaal aan de zool, doch zeldzamer op de kroon en koot aangetroffen worden, en eene loodachtige of roodbruine kleur bezitten, eenen stinkenden reuk heb-

hebben, en een zeer bijtend vocht ontlasten; terwijl zij in het vervolg kankerachtig worden en zeer moeilijk te verdrijven zijn.

367 Wat de genezing dezer verschillende ongemakken betreft, zoo is de zindelijkheid en het drooghouden der beenen eene der beste voorbehoedmiddelen tegen dezelve; zelfs kan men het ontstaan der mok nog bij tijds voorkomen door onslagen van klei met loodextrakt; edoch wanneer zich deze tot in den hof uitstrekt, zoo veroorzaakt zij aldaar vijgwratten, voetkanker, egelsvoeten enz. en is alsdan meestal ongeneesbaar.

In eenen geringen trap der mok enz. is het herhaald dagelijks waschen en baden met aschloog, zeep- of tabakswater met aluin, of ammoniakzout bezwangerd, zeer dienstig om de vuile opperhuid te zuiveren, waarna men de lijdende plaats met n^o. 70, b. of des noods met enkel kalkwater bevoogtigt; terwijl men tegen raspen hetzelfde middel of een smeersel van oprement met honig, met vrucht in het werk stelt.

368 De egelsvoet bevochtigt men met eene zwakke oplossing van opgehevene bijtende kwik in regenwater, welke men trapswijs versterkt.

369 Bij rotstralen moeten de dragten laag en van de straal, al wat bedorven is weg-

gesneden worden; men wasche vervolgens dezelve dagelijks met kalkwater en een weinig aloë-tinktuur, of bestrijke ze met terebinthijn, bestrooije de zieke plaats met levende kalk, en make vervolgens eenen omslag van klei met lood-extrakt of loodwit en azijn; stel-
le het paard voorts op eene drooge kleiplaats; besla het met een ijzer zonder kalkoenen, en doe het veel op drooge kleigronden gaan.

370 De vijgwratten moeten met de hoefbistoerie weggesneden en tot den grond uitgebrand worden; na het ophouden der bloeding. bestrooije men ze met een poeder dat uit gelijke deelen, roode opgehevene kwik, ongebluschte kalk en gebrande aluin bestaat, terwijl men de wond verder met n°. 94 geneest.

371 In het algemeen is in alle deze kwalen, welke niet dadelijk voor de zachte middelen wijken, het zetten eener dragt aan de lij-
dende beenen, eene der zekerste middelen, niet alleen ter genezing der mokachtige ongemakken, maar ook om de longziekten, welke maar al te vaak op derzelver te spoedige heeling volgen, voor te komen; waarbij men met vrucht het dagelijks ingeven van een sli-
brok van n°. 70, a, voegen kan.

VIJFDE HOOFDDEEL.

DE OOGGEBREKEN.

EERSTE ARTIKEL.

De oogontstekingen.

372 De oogontsteking kan of alleen de oogleden en het zamenvoegende oogvlies, of wel den oogbol zelfs aandoen; men onderscheidt ze in de vochtige, door scherpe en veelvuldige tranen gekenmerkt, en in de drooge, bij welke eene sterke pijn en grooté gevoeligheid voor het licht, plaats heeft.

Dezelve ontstaat zoo wel door uit- als inwendige oorzaken; en verschijnt in het eerste geval toevallig door droes, ontsteking van het slijmvlies enz., terwijl zij voorts uitwendig door scherpe stoffen, vreemde lichamen, stof, zand, vergiften, beschadigingen, schielijke koude, enz. te wege gebragt wordt.

373 De drooge oogontsteking, waarbij het oog zeer gezwollen, en de hitte sterk is, het zij dezelve uit geweldige beschadiging of andere oorzaken ontstaat, vereischt eene ruime

R 4

ader-

aderlating aan den hals; Is de ontsteking alleen in de bekleedselen van het oog gelegen, of de oogbol slechts weinig gekwast, en zonder aanmerkelijk gezwel, zoo bade men het oog zoo vaak mogelijk met koud water, legge daarmede bevochtigde kompresen op hetzelfde, en beware het door eenen gepasten stand voor den indruk der lichtstralen, doch doe daarbij het paard echter eene vrije en zuivere lucht inademen.

Indien na vierentwintig uren de ontsteking niet vermindert, zoo herhale men de lating, en zette bloedzuigers in den omtrek van het oog; kunnende men voorts eene dragt voor de borst zetten, en lavementen benevens n°. 104 geven; daarenboven legge men op het oog kompresen met n°. 105 of 107 bevochtigd, en wasche hetzelfde dikwijls met n°. 106. Daar nu na hevige ontstekingen, vaak eene verslapping der vaten volgt, welke lijdelijk voortgelijke toevallen doet voortduren, als gedurende de ontsteking plaats hebben gegrepen; zoo moet men middelen aanwenden die deze te keer gaan, waaronder roode wijn, welke op welriekende kruiden gegoten is, benevens het zoogenaamde hongaarische water, eene voorname plaats verdienen; zijnde het voorts een regel, dat men in alle ooggebreken het gebruik van zuren vermijden moet.

374 De oogontsteking die uit inwendige oorzaken ontstaat, behandel men op gelijke wijs, edoch, wanneer dezelve, vooral bij sterk gevoede paarden, geweldig en aanhoudende is, moet de lating herhaald en eene dragt in de nabijheid van het oog gezet worden.

a. De maanoogen.

375 Hierdoor verstaat men eene op bepaalde tijden van vier tot zes weken terugkeerende oogontsteking, welke, hetzij slechts één oog, of het eene sterker dan het andere aantast, en eindelijk eene volslagene blindheid ten gevolge heeft.

Daarbij is het oog uitwendig gezwollen en ontstoken, de oogappel vertoont zich melkachtig, en het door schijnende hoornvlies als agaats, terwijl het zamenvoegende oogvlies rood en gezwollen is, en zich vaak aan het onderste ooglid een kloofje bij de traanlip vertoont.

376 Tot genezing dezer kwaal, welke zeer moeilijk weg te nemen is, wanneer zij eenmaal hebbelijk is geworden, wordt de behandeling vereischt, die wegens de drooge oogontsteking voorgeschreven is; vooral zijn aderlatingen en langdurige dragten, de midde-
len waarvan men het meeste verwachten kan,

terwijl men tot volkomene genezing, verscheiden male daags, snoekenvet in het oog moet smeren.

De verdere behandeling en de leefregel stemt overeen met die in uitwendige oogontstekingen voorgescreven is; men vermijde een te sterk licht en verduistere den stal, men bewaare voorts het oog voor togt, stof en de uitwaaseming der staldampen. In den aanvang moet het voedsel uit scharle kost, als stroo en meelranken bestaan, doch wanneer het tijdperk der ontsteking voorbij, en dat van zwakte aangebroken is, zoo geve men weder versterkend voeder.

T W E E D E A R T I K E L.

De gevolgen der oogontstekingen.

377 Worden de oogontstekingen kwalijk behandeld, zoo laten dezelve onderscheidene oogkwalen na, als het traanoog, bloedoog, het etteroog, vlekken in, of vliezen op het hoornvlies, zwakte van gezigt, enz.

a. Het traanoog.

378 Hetzelfde ontstaat, wanneer door eene vorige oogontsteking de traanstippen toegegroeid of verslapt zijn, of dat eene uitwendige beschadig-

diging het onderste ooglid gescheurd heeft, waardoor de traanen niet door de traanflippen in de traanbuis kunnen geleid worden, maar uit het oog loopen, van welke oorzaken alleen die door verflapping veroorzaakt worden, eenig hoop op herstel geven.

Somtijds nemen de tranen eene scherpe eigenschap aan, welke het oog doet druipen, waar tegen n°. III een der beste middelen is.

b. Het etteroog.

379 Het etteroog ontstaat wanneer na eene oogontsteking zich de etter in eene der oogkamers verzamelt en ontlast, terwijl nog een ander foort dat ongemak is, hetwelke alleen de oogleden doet zwellen, derzelver randen ontsteken en etteren; het eerste moet men als ongeeneeslijk beschouwen, edoch tegen het andere kan men de oogleden met n°. 108 uitwendig smeren of met n°. 109 waschen.

c. Het bloedoog.

380 Door een uitwendig toeval veroorzaakt, ontstaat hetzelfde, wanneer de bloedvaten gescheurd zijnde, zich bloed in de oogkamers uitstort, waardoor het oog rood, blaauw en zwart wordt, zwelt en vaak verloren gaat; hiertegen zijn bloedzuigers en badingen met laau-

laauwen wijn, waarin welriekende kruiden, als lavendel, majolin enz. gekookt zijn, als het meeste tot herstel bijdragende, te beschouwen.

d. Vlekken van het hoornvlies.

381 Dezelve bestaan in plaatselijke verdikkingen in hetzelfde, welke de lichtstralen onderscheppen, en naar mate zij grooter en digter bij den oogappel zijn, als bedenkelijker aangemerkt moeten worden; terwijl, wanneer zij oppervlakkig na eene beschadiging of ontsteking ontstaan zijn, men eer hopen kan ze te doen verdwijnen, dan wanneer zij tusfchen de bladen van het hoornvlies bestaan; tot genezing der oppervlakkige is snoekenvet of zeer oude lijnolie eene der beste middelen.

e. Vliczen op de oogen.

382 Dezelve bevinden zich op het hoornvlies, of in het zamenvoegend of bindvlies, en zijn een onmiddelijk gevolg van deszelfs ontsteking; Is dit vlies nog klein, zoo helpen vaak flappe oplosfingen van aluin of afkookfel van eikenbast en n°. 110 *b*; terwijl wanneer het aanmerkelijk is, men n°. 110, *a*, zeer fijn gepoederd in de oogen strooijen moet, terwijl

wijl zoo wel in dit als in het vorige geval, het zetten eener dragt aan dezelfde zijde der kaak eene der meest belovende middelen uitmaakt.



VIERDE AFDEELING.

Over de behandeling der paarden in den staat van ziekte.

383 **Z**al de, in de beëffening der vee-artse-
 nikkunde onervarenen eigenaar van paarden uit
 den krijgs- en burgerstand, uit de in de vorige
 bladeren bevatte, aanwijzing der ziekten en der-
 zelve geneeswijze, die vrucht trekken, waar-
 toe dezelve hem medegedeeld is geworden,
 namelijk, om hem, vooral in die gevallen ten
 leiddraad te dienen, wanneer door het gemis
 van den bijstand eens bekwamen veearts, hem
 alleen de keus overig blijft, tusfchen de ge-
 nezing aan de natuur en het toeval over te la-
 ten; of wel, het leven en de gezondheid van
 dit nuttige dier, aan zoodanige toe te vertrou-
 wen, wier onkunde hem allergegrondst mis-
 trouwen moet inboezemen, zoo is het noodig
 hem bekend te maken, met de algemeene re-
 gels die bij de behandeling des paards in den
 staat van ziekte behooren waargenomen te wor-
 den, en hem voorts de wijze te doen kennen,
 hoedanig de hulp der genees- en heilkun-
 de, zoo wel als de middelen waar door
 deze kan en moet worden toegebracht.

EER-

E E R S T E H O O F D D E E L.

REGELS TER BEHANDELING DER PAARDEN

IN DEN STAAT VAN ZIEKTE,

1384 **T** weeledig is de bedoeling der volgende regels, namelijk; die door eene gepaste behandeling de genezing te bevorderen, ten andere, daartoe de meest geschikte maatregelen te nemen.

Heeft eene op vaste grondbeginfelen gebouwde gezondheidskunde, den grootsten invloed op de voortdoring derzelve, niet minder dragen de uit haar ontleende regels bij, om den staat der ziekte minder verderfelijk te maken, en haar spoedig en gelukkig te doen eindigen.

Ontegengesteld is het dat het eerste middel tot verhoeding van ziekten, in de vermijding gelegen is, van de voornaamste oorzaken derzelve: die door de gezondheidskunde aangewezen, wegens hunne belangrijkheid, eene korte gewaging verdienen; bestaande in groote verhitting en verkouding, of snellen overgang

van

van de eene tot de andere, en van rust tot vermoogenis; zoo als ook in ongezond, bedorven, ongeregeld en ongeëvenredigd voedsel, ongezonde verblijfplaatsen enz.

385 Het andere bestaat, in het dierlijk ligchaam hiëraan minder gevoelig te maken en tegen dezelve als te verharden; waardoor, indien men het als niet geheel voor ziekten kan behoeden, het, ten minste er minder vatbaar voor doet worden, minder door dezelve doet lijden, en hen gemakkelijker te boven komen.

Hiertoe dient het verleenen van toegang aan de zuivere lucht in de stallingen, gedurende het grootste gedeelte van den dag in alle jaargetijden; het zuiveren der huid en het baden ten minste tweemaal des weeks; terwijl, daar een werkzame toestand des ligchaams, de zekerste tegenwerking aan ziekte oplevert, die hetzelfde te ligter aantast naar mate het lijdelijker is, zoo rjde men het paard dagelijks; daarbij neme men waar, om indien het tot snelle bewegingen verplicht is, het tusfchen beide deze te doen uitvoeren, aan welke het daar door gewoon wordt, zonder dat zulks naderhand dien nadeeligen invloed op de gezondheid heeft, welke anders plaats grijpt, indien het er niet toe was voorbereid geworden.

286 Allergewigtigst is de verwerving eener genoegzame kennis der ziekte-kenteekenen, zoo die den staat van ziekte in het algemeen, als de kenmerken der bijzondere ziekten aanwijzen, ten einde te kunnen beoordeelen, of het toeval van dien aard is, dat het volstrekt genees- of heilkundige hulp vereischt, of dat men hetzelfde aan de natuur kan overlaten, daar het in vele gevallen even nadeelig en dikwerf schadelijker is, te ligt en veelvuldig tot de toediening van geneesmiddelen over te gaan, als dezelve geheel achterwege te laten.

287 Deze bedenking is van te meer gewigt, wanneer men in aanmerking neemt, dat de meeste ziekten en toevallen die de dieren treffen, door de levenskracht, den tijd of de verandering der omstandigheden genezen worden, en men zich dus daarbij slechts lijdelijk behoeft te gedragen; want ontstaan dezelve uit de luchtgesteldheid, landstreek, behandeling, het voedsel of het verblijf, zoo houden de gevolgen meestal van zelve op, wanneer men de dieren van de oorzaken, of deze van de dieren verwijdert; zijn zij daarentegen hunnen oorsprong aan overerving of vorming (organisatie) verschuldigd, zoo is even weinig hulp van de natuur als van den arts of de artsenijen te wachten.

S

Hier.

Hieruit blijkt dat de minste ziekten door de artsenijmiddelen genezen worden, zelfs doen zij meer schade dan nut wanneer zij ondoelmatig, ongeëvenredigd en ontijdig worden aangewend; zij verergeren de ziekten indien zij geene verandering, ontlasting of andere scheiding te wege brengen; en, daar zij alle het ligchaam op menigerlei wijze prikkelen, verstrekken zij hetzelfde alsdan tot vergif; daarenboven vindt men zich vaak van dezelve verftoken en dikwerf zijn zij van zulk eenen hoogen prijs, dat zij de waarde van het dier overstijgen; dit alles legt de noodzakelijkheid aan den dag, om in hunne toedeling eene wijze beperking te maken, en zich in de veeartsenijkunde steeds tot het gebruik der eenvoudigste en min kostbaarste te bepalen.

- 388 Wordt een paard door eenige ziekte of toeval getroffen, zoo beoordeel men wel of derzelver waarschiynlijken uitflag ook zoodanig wezen kan of zal, dat deszelfs waarde tot den dienst ten eenemaal of grootendeels, zelfs bij het gelukkigste gevolg verloren zoude kunnen zijn, en overwege: of niet door de langdurigheid der kuur, de geneeswijs en onderhouds-kosten, de waarde van het dier te boven zoude stijgen, in welk geval het belang aanraadt zich van hetzelfde te ontdoen,
- Men

Men trachte vóór alles de oorzaken der ongesteldheid op te sporen en zoo veel doene-lijk weg te nemen, daar zulks niet slechts in de meeste gevallen vaak alleen voldoende en de eerste stap ter genezing is, maar tevens tot aanwending van de doelmatigste geneeswijze opleidt.

Als slotfom dezer grondregels blijkt het dus raadzaamst te zijn, dat wanneer de ziekte of het toeval van weinig gewigt is, men de genezing aan de natuur overlaten, hare wenken volgen, en hare pogingen, alleen door eenen doelmatigen leefregel en behandeling ondersteunen moet.

389 Indien echter de hevigheid der toevallen eene ernstige ongesteldheid aan den dag leggen, en gebrek aan kunde of ondervinding verhindert derzelve waren aard met zekerheid te onderscheiden, zoo is het raadzaam de hulp van eenen ervarenen veearts in te roepen, die, het zij door eene wetenschappelijke studie op eene der veeartsenijkundige scholen, de noodige bekwaamheden in zijn vak heeft verworven, of door eene langdurige ondervinding en eigene nasporing, de ziekten heeft leeren onderscheiden, en die middelen kennen, die bij dezelve met vrucht aangewend kunnen worden; zijn geene zoodanige ter plaatse aanwezig, zoo raadplege

men eenen bekwamen geneesheer, welke, indien hij al niet volkomen met de bijzonderheden der veeartsenijkunde gemeenzaam was, echter in alle gevallen in staat is, doelmatige middelen voor den eersten oogenblik aan te wijzen, en door den naastbijzijnden veearts eene beschrijving der kenteekenen en toevallen der ziekte, mede te deelen, dezen in staat te stellen, de noodige voorschriften te geven.

390 Nimmer echter, zelfs dan wanneer men van al deze hulp verstoken was, neme men den toevlugt tot die maar al te veel verspreide kwakzalvers, die zich den naam van paardendokters toeëigenen, wier onkunde alleen door de onbeschaamdheid geëvenaard wordt, waarmede zij hunne geheimen, uitventen, die nit een of ander oud receptboek ontleend en veclaluit de slechtste geneesmiddelen zamengesteld zijn en echter door hen wonderkrachten worden toegeschreven; die door zoogenaamde geweldige geneesmiddelen de natuur geweld aandoen, of door sijmpathie of andere geheime middelen de ligtgeloovigheid des grooten hoops verschalken; terwijl men voorts bij de kens van den veearts ook wegens deszelfs ordelijk burgerlijk gedrag en gezond verstand overtuigd behoort te zijn.

391 Heeft men daarentegen rede om van den
vee-

veearts te veronderstellen, dat hij de noodige vereischten bezit, zoo raadplege men hem onverwijld. om te weten, in welk eenentoeftand van ziekte het dier zich bevindt, ten einde geen verzuimenis de kwaal ten hoogsten top doe stijgen; men stelle alsdan een volkomen vertrouwen in hem, deele hem naauwkeurig en openhartig alles mede, wat ons bekend is van hetgene aanleiding tot de ongeteldheid heeft gegeven; men wachte den uitflag met geduld af, zonder dit te verliezen, wanneer de ziekte langer mogt duren dan men zich had voorgesteld, en verandere even min van arts als van doelmatig gekozene geneesmiddelen, of dat men wankelmoedig gedurig vreemden raad volge; terwijl men bovenal naauwkeurig het oog moet houden op de behandeling des paards door deszelfs oppassers en de strikte nakoming der voorschriften van den arts.

392 Bevindt men zich echter in het geval om alleen in zich zelve hulp te moeten zoeken, zoo blijft de keuze tuschen beide over, het zij om de genezing, onder eene doelmatige behandeling, aan de natuur over te laten, of de ziekte naar eigen doorzicht volgens een of ander goed veeartsenijkundig werk te behandelen.

Men mag van het eerste een des te geluk-

kiger gevolg verwachten, indien niet eene oogenblikkelijke redding uit doodsgevaar vereischt wordt, zoo als bij snelverloopenen ontstekings-ziekten; terwijl, bijaldien men wegens deszelfs waren aard onzeker is, men zich tot eene algemeene behandeling moet bepalen, bestaande, in het toedeelen van in alle gevallen onschadelijke middelen, en het bepalen van eenen verzachtenden leefregel, waardoor men tijd wint tot nadere beoordeeling der ziekte en opmerking dier kenteekenen, die tot hare onderscheiding kunnen dienen, waarin men des te gemakkelijker zal slagen, indien men gelegenheid gehad heeft, door het gadeslaan van eenige ziekten, eenige ondervinding te verwerven, terwijl de beoordeeling der waarschijnlijke oorzaken van het jaargetijde, de voorafgaande levenswijs en ouderdom van het dier, de beste aanwijzing ter genezing en aanwending der meest gepaste middelen zal verleenen, en men daardoor nader onderrigt worden, of door aderlating, dragt, lavementen enz., welke laatste middelen zeldzaam schaden, de ontsteking vermindert, of door prikkelmiddelen de levenskracht opgewekt moet worden.

- 393 De meeste ongesteldheden waaraan het paard onderhevig is, vooral die welke men onder de sneleindigende kan rangschikken, zijn in hun-

hunnen aanvang van eenen ontstekingsachtigen aard, vooral wanneer de ziekten na eenen kouden droogen winter, in het voorjaar in eene drooge landstreek voorvallen en jonge volbloedige welgevoede paarden treffen; uit dezen hoofde zal men zeldzaam nadeelige gevolgen zien, wanneer men haar in twijfelachtige gevallen steeds als zoodanig in den beginne behandelt, door het paard zemelwater, zelfs met bijvoeging van een of twee lood salpeter, en van een lepel honig in vermoede borstzicken laten drinken, en het dranken ingeeft van verzachtende kruiden, als afkookfel van kamillen - bloemen, heemstwortel, kaasjes - muurglas- of leverkruid, beerenklaauw, agrimonie, latuw enz., en van lijnzaadmeel in bijkomen - de hoest, voorts onverwijd eene kleine aderlatingdoet, bij iedere mogelijkheid van ontsteking;

394 Wat de bijzondere behandeling des zieken paards betreft, zoo behooren al die zorgvuldigheden, die men in deszelfs gezonden staat waargenomen heeft, thans als het ware verdubbeld te worden.

395 Bijzonder is de zorgvuldigste oplettendheid op deszelfs voedselmiddelen noodig, behoorende men het beste hooi en de voedzaamste haver tot dezelve uit te kiezen, van welke

laatste de havermeelslijm in de meeste gevallen de grootste aanbeveling verdient. (14) Voorts leert de ondervinding dat in ontstekings-ziekten in het voorjaar, indien men gelegenheid ter bekoming heeft, het malische gras met eenig hooi vermengd, eene der heilzaamste voedfels oplevert.

396 Zoo nuttig een goede leefregel, (diëet) is, wanneer men daardoor eene doelmatige keuze van voedselmiddelen verstaat, even nadeelig zoude dezelve worden, wilde men dezelve doen bestaan, in honger en dorst te lijden, zoo als maar al te veel door sommige veeartsen, bijzonder door de fransche aangeraden wordt, welke zonder behoorlijke onderscheiding, genoegzaam in ieder ongesteldheid, het paard de haver onthouden en alleen tot zemelen en dunne meeldranken beperken.

Slechts in enkele ontstekings-ziekten kan eenen schraalen leefregel van dienst zijn; terwijl daarentegen in slepende ziekten en etterende wonden, een voedzaam diëet onmisbaar is; men zal des te meer van de ongepastheid

(14) Deze vervaardigt men door kookend water op eene genoegzame hoeveelheid havermeel te gieten, dit vervolgens uit te persen, en de drank aan het paard te reiken.

heid der onthouding des voedsels overtuigd worden: daar de ondervinding doet zien, dat de natuur het instinct (de natuurdriфт) van liet dier leidt, door voedsel te weigeren, wanneer dit hetzelfde nadeelig zoude wezen, en dat het hierdoor zonder hulp geneest. Om gelijke redenen behoort men in het toedeelen van den drank zich naar deszelfs smaak te voegen en het dus zuiver fris water te geven, ingeval het ander weigert te drinken, latende dus liever de warme en meeldranken achterwege dan dat het dorst zoude lijden.

397 Voorts moet de grootste en dubbele zuiverheid in de kribben en emmers heerschen, waarin men het dezelve toedient, want daar het paard in den staat van ongesteldheid ten uiterste kiesch is, is de minste kwade reuk genoegzaam, het van voedsel en drank te doen walgen.

398 Daar het herstellende paard gewoonlijk in die mate eene natuurlijke graagte en vermeerderden eetlust bezit, als het gedurende de ziekte weinig voedsel heeft genoten. behoort men beide uitersten zorgvuldig te mijden: om het even min door onvoorzigtige voldoening derzelve, eene onverteerbaarheid (indigestie)

te veroorzaken die het zoude doen instorten, als door ongenoegzaam of te slap voeder de zwakte te doen voortduren; men geve het uit dien hoofde genoegzaam en dikwijls doch niet veel gelijktijdig voeder en dit van eenen voedzamen aard, waartoe men het grof gemalene havermeel en wanneer het zeer verzwakt was, het garstemeel rekenen kan, hetwelke het beste aan deszelfs verzwakte verteringskrachten geëvenredigd is.

- 399 Vooral behoort men op een goed en overvloedig legftroo niet karig te zijn, en terwijl men bij gezonde paarden, met voordeel gebruikt kan maken van hetgene nat geworden en weder gedroogd is, behoort dit nimmer bij zieke gebezigd, maar dagelijks vernieuwd te worden, en indien men weet, dat de paarden zich niet zullen nederleggen, het legftroo bij dag worden weggeruimd, daar de uit hetzelfde ontwikkelende uitwasemingen niet anders dan tot voortplanting der bestaande en voortbrenging van nieuwe ziekten dienen.

Daarenboven moet men het paard matig warm houden en vooral, wanneer men gestremde uitwaaseming als oorzaak der ziekte kan aanmerken, het wel dekken; daarentegen indien dezelve van eenen ontstekingsachtigen

gen aard is , draagt een koel verblijf zeer veel bij tot derzelver vermindering.

Het is mede een verkeerd begrip om een ziek paard alle beweging te onthouden, integendeel is het in de meeste gevallen allereelzaamst, dat men dezelve bij gunstig weder op het warmste van den dag, doe rondleiden, alleen met uitzondering der eerste tijdstippen van ontsteking en van de aanvallen van koorts: niet alleen is eene zachte beweging in de vrije lucht eene der heilzaamste versterkende middelen, maar in de meeste uitwendige beschadigingen die de beenen treffen, draagt dezelve zeer veel toe om de opflorping der uitgestorte vochtigheden te bevorderen.

400 Indien in den gezonden staat de grootste zindelijkheid noodig is, zoo is zulks nog meer in dien van ziekte, zoo door herhaald poetsen, reinigen en wassen, als schoonhouden der stallingen, ten einde de ontwikkelende dampen uit de ontlastingen der zieke dieren, en derzelver uitwaseming geenen aanleg tot verdere besmetting veroorzaakt.

401 Ook de stallingen en verblijfplaatsen, mitsgaders derzelver inrigting hebben den grootsten invloed op de genezing, waarvan men zich overtuigen kan, wanneer men slechts de keuze en inrigting der ziekenstallen gade slaat

flaat; de meeste zijn dompig, laag, duister en vochtig, en men acht de slechtste plaats goed genoeg om tot eenen ziekenstal te dienen, daar juist het tegenover gestelde plaats moest grijpen; terwijl men eene alzints ongepaste karigheid in het legstroo waanneemt, zonder te overwegen, dat bij een ongestell paard, de ruimte en eene gemakkelijke ligging even gelijk bij den mensch, den grootsten invloed op deszelfs genezing heeft.

- 402 Met vrucht zoude men de ontdekkingen der latere genees- en heilkunde op de dieren kunnen toepassen en door gelijke middelen, niet alleen de uitbreiding der besmetting maar ook het zoo verwoestende hospitaal vuur kunnen voorkomen; immers wat is anders de oorzaak dat de meeste gewonde paarden bezwijken of ten minste zoo langzaam herstellen, dan dat men hen met sterk etterende wonden of droestoevallen, in beslotene plaatsen (lokalen) en enges tallen te zamen pakt, zoo als maar al te veel bij de veld-depôts plaats heeft, gelijk mij ieder zal moeten toefstemmen, die gelegenheid heeft gehad deze te zien, waardoor zij tot eenen waren kerkhof en moordkuil voor dezelve worden; daar de meeste wonden en ontstekings-toevallen in versterf, de droes in kwaden droes en worm overgaan. Intusfchen bestaan dezelve uit paarden, wier alles behalven gevaarlijke toestand eene spoedige herstelling beloofde;
- meest-

meestal zijn het zadelkwetsingen, kneuzingen, en ligte wonden, of wel droes- en borstontstekingen, welke de paarden aldaar doen verblijven of derwaarts gezonden worden; daar men de genezing der gene welke zwaarder gewond zijn, of niet waardig acht te beproeven of daaraan door de omstandigheden verhindert wordt. Ten blyke van het vorenstaande strekt, dat men de heelbare wonden, die bij de korpsen te velde in de opene lucht behandeld worden, over het algemeen veel spoediger en sommige bedenkelijke gevallen veel gunstiger ziet genezen, dan onder de anders ongunstige omstandigheden verwacht had kunnen worden.

Uit dezen hoofde behoorde men het voorbeeld en de voorschriften der menschen heilkunde te volgen, tot afwending van de versterking bij wonden en het verergeren der ziekten, door de gekwetste enz. paarden der velddepôts eene verblijfplaats aan te wijzen, die aan alle zijden den ruimen toegang der zuivere dampkringslucht geniet, welk het beste voorbehoedmiddel tegen dit toeval is; zoo als opene lootsen, ruime schuren, enz. in plaats van hen in beperkte stallen op een te pakken; terwijl, indien men dezelve mist, het verkiesbaarder is hen in het goede jaargetijde in de opene lucht te plaatsen, hetwelke nimmer gedurende eenige keeren daags verzuimd moet worden, wanneer men verplicht is hen in stallen te plaatsen; alleen

leenlijk neme men daarbij waar, om de wonden voor den prikkel der zonnestralen te dekken.

403 Een ander noodzakelijk vereischte in de inrigting der ziekenstallen, bestaat in de afzondering der paarden volgens de ongesteldheid waardoor zij aangetast zijn; dus zondere men diegene welke aan uitwendige toevallen als wonden enz. lijden, van diegene af welke door eene inwendige kwaal aangedaan zijn; en onder deze die welke van eenen aanstekenden aard zijn, zoo als droes, schurft enz., van zoodanige die niet besmettende zijn; terwijl omtrent diegene, welke aan den geringsten trap van verdachten of kwaden droes en worm lijden, waar te nemen is, dat men alle mogelijke gemeenschap met de andere aflijdt en dezelve in eenen hoogen trap, onverwijld dood; welke oplettendheden bij alle heerschen- de ziekten plaats moeten grijpen, en men daarom al de zoodanige die van deze, van droes, enz. aangetast worden, zonder uitsfel van de gezonde afzonderen. (14)

Voorts

(14) Onder de middelen tot vermindering der besmetting en verbetering der lucht in besloten plaatsen, verdienen de zure beroeking en eene voormane, zoo niet de hoogste plaats, het zij door van tijd tot tijd dezelve op eene voort- gelijke wijs in de ziekenstallen aan te wenden, als de voor- schriften tot zuivering der besmette stallen aanwijzen, gedu- ren

Voorts behoort bij deze scheiding en plaatselijke inrigting der ziekenstallen, den aard der ongesteldheid steeds in het oog te worden gehouden, en dien te gevolge, paarden, welke aan wonden of ontstekingsziekten lijden, eene luchtige, aan die uit gestremde nitwasfening ontfiaan, eene warme, en die met ooggebreken behebd zijn, eene duistere plaats aangewezen te worden. Eindelijk is er nog eene oplettendheid na de genezing der ziekte en het herstel waar te nemen, te weten: dat men even zeer vermijden moet het paard te spoedig deszelfs gewone werkzaamheden te vergen, als dat men het van eene allerheilzaamfte matige beweging onthoude.

rende welke men de paarden uit denzelven verwijdert, als door zulks in eenen minderen trap, 2 of 3 maal des daags, tot verbetering der lucht, te bewerkftelligen; waarbij men echter waarneemt, om zoodanige paarden die aan eenige ontsteking der ademhalings-werktuigen lijden, zoo lang buiten den stal te plaatsen, tot de beroeking voorbij is.

T W E E D E H O O F D D E E L .

D E G E N E E S - E N H E E L K U N D I G E V E R -
R I G T I N G E N E N W E R K T U I G E N .

404 **D**e hoofdbedoeling van dit werk, om den bezitter des paards, ten raad en leidsman te verstreken, wanneer hem de hulp eens ervarenen veearts ontbreekt; zoude zeer onvolkomen bereikt worden en hij uit de daarin bevatte voorschriften weinig nut ontleenen, indien hem niet met de wijze bekend werd gemaakt hoedanig hij dezelve in het werk behoort te stellen.

Allernoodzakelijkst is hiertoe dat hem eene handleiding tot de zamenstelling en wijze van toedienen der genees- en heelmiddelen worde gegeven en hij met de geneeskundige maten en gewigten bekend gemaakt.

Offchoon het aan de eene zijde ten uiterste ongerijmd zoude zijn te veronderstellen, dat iemand wien de noodige ontleedkundige bekwaamheid en oefening in de veeartsenijkunde ontbreken, in staat zoude zijn die heelkundige bewerkingen te verrigten, welke deze kun-

kundigheden vereifchen, er beftaan echter verfcheidene toevallen, waarin hij dezelve dient en vermag te volvoeren; immers zijn er vele gevallen die eene onverwijldé hulp dringend inroepen, en waarin het verrigten eener aderlating, het zetten eener dragt, het leggen eenes verbands, het openen van een gezwel allerdringendst geboden wordt; waardoor zoo wel de kennis der werktuigen waarmede, als der wijze waarop men dezelve moet verrigten, alleronontbeerlijkst wordt.

Terwijl ik dus uit dezen hoofde al de heekundige bewerkingen overftap, waartoe de hulp van eenen arts vereifcht wordt, (15) of die de behoefte des oogenblik niet vereifchen, en met nog meer regt die zinnelooze verminderingen met ftilzwijgen voorbij ga, waarin het onverftand van vorige jaren eene verdienfte ftelde; zoo als het zoogenaamde fnijden van den nagel of van het blikvlies, het oorafsnijden, het uitrukken der opheffpieren van den bovenlip, het korten der fpatäder en wat dies meer is, zullen wij ons tot de eenvoudige aanwijzing der noodigfte heekundige bewerkingen bepalen, welke zulk eenen geringen trap van behendigheid vereifchen, dat ieder met

(15) Zoo als het angliferen, het castreren, het behandelen eener beenbreuk, en van zeer zamengeftelde wonden, enz.

met behulp van eenige onderrigting en een weinig opmerkzaamheid in staat is dezelve te verrigten, wanneer hij van alle andere hulp verstoken is, en de omstandigheden zoo dringende zijn dat ieder uitsfel de noodlottigste gevolgen zoude kunnen hebben.

E E R S T E A R T I K E L.

De heilkunstige verrigtingen en werktuigen.

a. De aderlating.

405 Onder alle heilkunstige bewerkingen verdient de aderlating te regt de eerste plaats, daar zij eene der voornaamste reddingmiddelen in alle ontstekingsachtige ziekten, en vaak alleen voldoende is, hunnen verderen voortgang te stuiten en de gezondheid terug te brengen.

406 Indien omstandigheden zulks vergunnen, zoo kieze men tot het verrigten der aderlatingen, een gematigd weder, en bij sterke hitte of koude die tijden van den dag, dat dezelve het meeste getemperd zijn; voorts wordt de beste tijd daartoe geacht, dat men dezelve des morgens, alvorens de paarden gegeten hebben, doe geschieden, en dat men hen in alle gevallen drie uren vóór en even zoo lang na de lating geen haver geve.

De-

- 407 Dezelve wordt op verschillende plaatsen bewerkstelligd, gewoonlijk aan de halsbloedader, zeldzamer en alleen in bijzondere gevallen aan de zoogenaamde boeg-, spoor- en spatader, in den mond of den voet enz. Het is tot de eerste, dat wij ons voornamelijk moeten bepalen, als de meest voorkomende, wijl de aanmerkelijkheid dezer bloedader het voordeel eener spoedige en ruime ontlasting van bloed, aanbiedt.
- 408 De plaats waar deze aderlating verrigt wordt, is aan de groote hals-bloedader, (*venæ jugulares externæ*), die zich wederzijds in de halsgroef vertoont, en langs de strot tot aan den borstkuil voortloopt, zij geschiedt omtrent drie- of vier vingerbreedte beneden de vereeniging of vork, welke door hare twee takken onder den hoek van het kaakbeen gevormd wordt.
- 409 De werktuigen waarvan men zich hiertoe bedient, zijn het algemeen bekende en meest gebruikt wordende aderlancet. Pl. II, fig. 1, *a*, *b*. (*) dat in grootte even-

(16) Dezelve bestaan uit lancetvormige punten die met eene langwerpige vierkante kling eenen regten hoek vormen, gewoonlijk zijn dezelve ten getalle van 3 of 4, van

evenredigd moet zijn aan de ader welke men wil openen, hetwelke men door eenen matigen slag met eenen ronden klopper van zwaar b. v. van palmboombout verrigt; bij mangel van welken ook wel de heft van het veegmes gebezigd wordt. Voorts de zoogenaamde *sneppers* met *veëren* (17), welke vooral geschikt zijn om de aderlating aan onrustige paarden, en op zoodanige plaatsen te verrigten waar de ader moeilijk te treffen is, b. v. aan de boegaderen. Eindelijk bedient men zich in sommige gevallen en bij mangel van de voorgaande werktuigen van een *lancet*, (18) of van eene *puntige bistorie*,
De

verschillende grootte in een koperen koker bevat. Men hebbe bij derzelve keuze te letten dat zij van goed staal vervaardigd, scherp snijdende en puntig zijn; voorts dat men ze steeds zeer zuiver houde; terwijl die welke men zelve bij instrumentmakers doet vervaardigen, schoon iets duurder, verre de voorkeur boven diegene verdienen welke als dozijnwerk overal verkocht worden en gewoonlijk zeer slecht zijn, hetwelke met de overige heilkundige werktuigen insgelijks het geval is.

(17) De *snepper* Pl. III, fig. 2, *a b.* bestaat uit een foortgelijk doch spits en krommer lancet, hetwelke in een langwerpig koperen doosje geplaatst is, en met deszels punt er buiten uitsteekt. Het wordt door eene *veër* bewogen, met een bijzonder ijzer vastgesteld en door eenen *afrekker* losgelaten.

(18) De *lancetten* zijn in gedaante met die overeenkomstig welke men voor den mensch gebruikt, en verschillen van deze alleen in grootte en slevigheid.

waartoe echter eene geëfende hand vereischt wordt.

410 De aderlating wordt op tweederhande wijze verrigt, te weten met of zonder laatband, (19) waarvan de eerste meestal door eenigzins daarin geëfende deswegens de voorkeur gegeven wordt, wijl vele paarden zich tegen het aanleggen deszelfs verzetten, het overbodig aantrekken daarvan niet alleen de ademhaling ten hoogste belemmert, en door ophooping des bloeds in het hoofd, het paard duizelig kan doen worden en neêrftorten, maar er zelfs voorbeelden bestaan, dat onrustige paarden zich na de lating hebben losgerukt, en door de aanhoudende bloedstorting, veroorzaakt door de drukking des laatbands, het leven hebben ingefchoten.

Men doe het paard dat men wil aderlaten, eene watertrens aan en door iemand deszelfs hoofd eenigzins verheven houden, hetwelke de

(19) De laatband bestaat, het zij uit een touw of wel uit eenen lederen riem van 4 voeten lengte en $\frac{1}{2}$ duim breedte, voorzien van eene gesp zonder doorn, om het einde van den riem met eenen losfen knoop te bevestigen, en een rond verschuifbaar kussentje van $1\frac{1}{2}$ duim breed en 1 duim dik. hetwelke op de ader drukt, en tevens tot steun der hand of van het lancet bij het doen der aderlating kan dienen.

de aderlating gemakkelijker maakt, en voorts indien het noodig is, deszelfs oog met de hand aan die zijde waar deze geschiedt, bedekken.

411 Tot volvoering der aderlating op de eerste wijze wordt de laatband om den hals dicht aan de borst geslagen, en na deze slechts zoo veel te hebben aangetrokken als noodig was, om de halsader genoegzaam zichtbaar te doen worden, hetwelke men nog meer bevordert door het haar met eene vochtige spons glad te strijken, wordt dezelve aan de tegenovergestelde zijde van diegene waar men de lating wil verrigten met eenen losfen knoop in diervoorge bevestigd, dat men in staat is hem oogenblikkelijk los te maken. Vervolgens plaatste men het tusschen den duim en voorsten vinger der linker hand gehoudene lancet, op omtrent ééne lijn afstands van de ader in eene eenigzins schuinsche rigting, en sla met den klopper midden op deszelfs rug: waarbij men echter vermijde de ronde kogelachtige verhevenheden der ader, tot de plaats der aderlating te verkiezen, daar deze aderkleppen zijn, wier kwetsing niet alleen de genezing vertraagt, maar zelfs aanleiding tot aderlatingfistels zoude kunnen geven.

412 Verrigt men de lating zonder laatband,

zoo

zoo moet men eene andere stelling aannemen en met de drie achterste vingers der hand, waarin men het lancet houdt, de ader drukken om haar zichtbaar te doen worden; waartoe men haar van haren ingang in de borst af aan, naar omhoog al drukkende volgt, tot op drie en vier duim van hare verdeling, waardoor men haar even eens als door eenen laatband doet zwellen, en vervolgens dit bloedvat nog sterker met den voorsten en derden vinger drukkende, de aderlating op gelijke wijze verrigt.

413 Indien men tot de aderlating zich van eenen snepper bedient, zoo heeft men behalve al het voorgeschrevene nog daarenboven waar te nemen dat men dezelve wel verzekerd in de hand moet houden, ter overwinning der tegenwerking, veroorzaakt door den tegenstand die de huid aan het lancet biedt; terwijl men voorts zoo wel de diepliggendheid en grootte van het bloedvat als de meerdere of mindere dikte der huid wel moet berekenen, om volgens deze den afstand en de rigting van den snepper juist te bepalen; welk een en ander ook bijzonder in aanmerking moet worden genomen bij de keuze van het aderlancet en in de aanwending eenes meer of minderen sterken slag des kloppers.

414 Ten einde de bloeding te bevorderen, wordt het hoofd niet alleen verheven gehouden, maar men vat de tong en doe deze als ook de kaken bewegen.

Na dat de begeerde hoeveelheid bloeds ontlast is, welke naar evenredigheid van den ouderdom en grootte des paard geregeld wordt, en gewoonlijk drie of vier ponden, of een en een half à twee pinten bedragen moet; tot welker beoordeeling men in het algemeen wel doet, hetzelfde in een of ander vat op te vangen; make men den laatband los, indien deze gebezigd is, en houde een oogenblik de vinger op de wond, of doe de drukking met de beide vingers op de ader ophouden, hetwelke voldoende is om een einde aan de bloeding te maken; vervolgens wasche men dezelve met eene natte spons af, en verbind de haar door eene scherpe speld midden door de beide wondlippen te steken en met eenige haren te omwikkelen; of hetgene nog den voorrang verdient, men verschuive alvorens de lating, het vel een weinig zuiwaarts, en late het na dezelve los, waardoor de wond van zelve bedekt wordt.

Eindelijk neme men na de lating waar, om het paard zoodanig te bevestigen dat het zich niet schuren en daardoor eene nieuwe bloeding veroorzaken kan.

- 415 Indien de redenen bestaan om eene lating aan de spoor-ader te verrigten, zoo wordt daartoe het lijf twee of driemaal met den laatband zoodanig omvat, dat deze onder op het borstbeen rust, waar de plaats der singels is, en op den rug met eenen losfen knoop bevestigd.
- 416 Moeijelijker zijn de latingen aan de boegen spatader, waarvan de eerste onder aan de borst aan de boven- en binnenzijde des arms moet geschieden, en waartoe men het been dat tegenovergesteld is aan de zijde waar men de aderlating verrigten wil, doet opligten; terwijl men die der spatader aan de bovenste binnenzijde der dij, waar de ader naar binnen gaat, verrigt, tot welke latingen het gebruik van den snepper of het lancet, boven de gewone aderlancetten de voorkeus gegeven wordt.
- 417 Wat de overige door de smeden en andere onkundige even veelvuldig als doelloos aangeradene latingen betreft, zoo in den mond, onder den tong als van het verhemelte enz., zoo wordt van dezelve hier alleen gewag gemaakt om hunne nutteloosheid in de meeste gevallen aan te wijzen; wil men echter die in het verhemelte verrigten, zoo geschiedt dezelve met eene bistourie, door
- T 5
- eene

eene insnijding tusfchen den derden en vijfden rimpel, terwijl de bloeding door eene spons met rabels-water bevochtigd, gefluit wordt.

- 418 Behalve deze wordt fomtijds in dringende gevallen, zoo als in razernij en dollen kolder, de flaapflagader met een goed gevolg geopend, hetwelke met een lancet gefchiedt. Hierbij neme men waar, om het haar alvorens af te fnijden, de opening evenwijdig met den loop der flagader te verrigten en de wond met kompresfen en een zwachtel te verbinden.

b. De dragten.

- 419 Niet minder heilzaam dan de door de aderalating te weeg gebragte ontlasting in ontstekingsziekten, is om derzelfver werking een perk te ftellen, zijn de dragten, niet alleen als voorbehoedmiddel, maar ook, om in alle hardnekkige flepande ziekten, door eene kunftige tegenprikkeling, den loop der ziekte op eene voortgelijke wijze af te leiden als door de fontenel, de fpaanfche vliegen en andere blaartrekkende middelen bij den mensch gefchiedt.

De insnijding en het aanwezen van een vreemd ligchaam, veroorzaken in de oppervlakte een fterken prikkel en ontfteking, die een-

eenen vermeerderden toevloed van vochten en daarop volgende ettering ten gevolge heeft, en tot eenen tegenprikkel aan diegene verstrekt, welke de onderscheidene werktuigen (organen) en stelsels aandoen.

Geene genees- of heelkundige bewerking is van uitgebreider en algemeener nut en tevens minder gevaarlijk en schadelijk dan deze, het zij dezelve als hulp- of als voorbehoedmiddel aangewend wordt; waardoor zij niet alleen in alle ontstekingen der levenswerktuigen, als die van het hoofd, der ademhaling en des buiks, de hevigheid van derzelve toevallen eene heilzame afleiding en wijziging verleent, maar vooral in alle langdurige (chronische) kwalen, zoo als vervangenheid, kreupelheid, mok en velerhande huidziekten, wier hardnekkigheid alle andere hulpmiddelen trotseert, levert zij vaak het eenigste hulpmiddel op.

420 Men onderscheidt dezelve in dragten en fontenellen. De eerste welke het meeste aangewend worden, bestaan daarin, dat men eene opening in de huid maakt en door dezelve een band steekt, hetzij van gewoon linnen of wollen band, of wel eene uit hennip en haar gevlochtene koord, bestreken met eene prikkelende zalf, als basilicum enz., zelfs met spaansche vliegen, hetwel-

welke spoedig eene kunstige ettering te wege brengt.

- 421 De plaatfen waar dezelve aangewend worden, zijn veelvuldig, en hangen van omftandigheden, den aard en de zetel der ziekte of des toevals af: als aan de borst, tusfchen de voorbeenen, aan de kaken, den hals, op de fchouders, het kruis, aan den elleboog, aan de dijen, aan onderfcheidene plaatfen der beenen enz.

Het werktuig waarvan men zich hierbij bedient, zijn de zoogenaamde fontenel naalden, welke in fcherpe (20) en ftompe (21), onderfcheiden worden, waarvan de laafte alleen dienen, om na het maken eener opening in de huid, door het celwijsweeffel te ftooten en dit los te maken.

- 422 Naar mate men naar eisch der omftandighe-

(20) De fcherpe fontenel naalden, Pl. III fig. 3 dienen om de doorfteking der huid, tevens te verrigten; dezelve zijn uit goed ftaal gevormd, rond, aan de eene zijde van eene lansvormige tweefhijdige punt voorzien en een weinig gebogen; voorts zijn zij tot doorfteken van den band, van een oog voorzien, dat zich of in de achterfte helft der punt, of aan het einde der naald bevindt, welke eene lengte van 8 à 10 duimen heeft, en veelal uit 2 ftukken bestaat, die te zamen gefchroefd kunnen worden.

(21) De ftompe zijn breeder en plat zonder punt.

heden zich van het eene of andere soort dezer naalden bedient, verschilt de wijs van het zetten der dragten; indien men de *scheurpe* bezigt, zoo wordt de huid in eene plooi waterpas te zamen genomen, van het lijf verwijderd en vervolgens met de naald doorboord, in welke de band ingestoken is of wordt, die men vervolgens zamen knoopt.

Men maakt vooral van de andere wijze gebruik, wanneer men eene sterke werking verlangt; hiertoe wordt de huid in eene loodregte plooi van het lijf afgetrokken, en in deze met de bistourie eene insnijding van één duim breedte gemaakt, waarin men de stompe fontelnaald met ingestokenen band, vier à zes duim benedenwaarts onder de huid steekt, dezelve voorts van het celwijs weefsel scheidt en rondom los maakt; vervolgens ligt men haar met de punt op en verrijgt aldaar eene tweede insnijding, door welke de band met de naald getrokken wordt. Het is een algemeene regel bij deze bewerking, dat de band steeds in eene loodregte rigting moet worden doorgestoken, ten einde de etter eene vrije ontlasting te verschaffen, en dat men dezelve dagelijks verschuive.

423 Behalve deze dragten worden somtijds van fontenellen, bijzonder vóór de borst
ge-

gebruik gemaakt; men maakt daartoe in de huid eene dwarsche insnijding, en deze met den vinger rondsom van het celwijsweefsel los, waarna men in hetzelfde een dubbeld gevouwen rond leder steekt, in het midden van een gat voorzien en vervolgens terebintlijn-olie in deze opening giet, terwijl men, wanneer de ettering genoegzaam daardoor veroorzaakt is, dezen ontlasting verschaft door eene opening op het laagste der gezwollene plaats te maken.

In dringende gevallen zoo als in de klem en pestbuilen, heeft men zich met goed gevolg bedient van den witten nieswortel, welke men op soortgelijke wijze als de fontenel onder de huid steekt.

c. De insnijdingen.

424 Even noodzakelijk, schoon minder menigvuldig voorkomende, zijn de kunstige openingen welke gemaakt moeten worden, om het ligchaam van vreemde voorwerpen of schadelijke stoffen te bevrijden, die in hetzelfde eenen nadeeligen prikkel te wege brengen; het zij dat deze uit vreemdaardige lichamen bestaan, zoo als b. v. kogels in geschotene wonden, of glas, spijkers enz., in voetwonden, of wel, dat zij als uitgestorte vochten

en

en etter in gezwollen opgesloten zijn, van welke vooral de laatste, door een te lang verblijf in dezelve, scherp en bijtende wordt en den verwoestendsten invloed op de aangrenzende deelen uitoefent, daar zij ter baning van eenen weg tot ontlasting, overal holen en fistelachtige gangen graaft, die niet anders dan door diepe insnijdingen weggenomen kunnen worden.

425 De gezwollen zijn van tweederlei aard die men door de benaming van *heete* en *koude* onderscheidt, van welke de eerste, zoo als zadel-drukkingen, uit uitwendige, andere gelijk in den droes enz. door inwendige oorzaken ontstaan, en wanneer zij niet verdeeld worden, gewoonlijk in ettering overgaan; en wijl alsdan er geene hoop meer overblijft om hen te doen verdwijnen, wordt het noodzakelijk tot eene onverwijde opening over te gaan, zoo dra derzelver rijpheid door weekheid wordt aangekondigd.

Koude gezwollen, zijn de zoodanige die onpijnlijk zijn, geene bijzondere hitte of ontsteking vertoonen en alleen door bijkomende oorzaken in ettering overgaan; zoo als leggers, schijthakken, gallen enz. Zoo wel de eene als andere kunnen door kunstbewerkingen weggenomen worden, waartoe zich tweederhande wijzen aanbieden, namelijk,

lijk, de insnijdingen en het schroeijen met een gloeiend ijzer.

426 Tot het verrigten der eerste worden onderscheidene werktuigen vereischt.

Diegene welke tot het doen van insnijdingen gebruikt worden, bestaan uit onderscheidene soorten van heelkundige mesen, scharen, enz.

De eerste zijn verschillende soorten van bistouries, skalpels, lancetten en hoefmesen.

427 De bistourien (22) zijn mesen van verschillende gedaante, welke daarin overeenstemmen, dat zij als een knipmes, doch zonder veêr, in een hecht van schildpad, hoorn of balein kunnen toegevouwen worden.

Zijn

(22) Men ziet in *Fig. 4. a*, een skalpel, en in *b* eene bistourie met eene ronde snede, eenigzins hol geslepen, van welke men zich tot het angliseren en zoodanige insnijdingen bedient, die van buiten naar binnen moeten geschieden.

In *Fig. 5.* is eene spitse regte bistourie met eene regte snede en rug vertoont, waarvan men gebruik maakt om van binnen naar buiten te snijden, om het kwetsen van vaten te vermijden.

Het lancetvormige tweesnijdige bistourie, *Fig. 6*, dient tot opening van gezwollen en aderlatingen, en dat met uitpuilende snede *Fig. 7*, tot een soortgelijk einde als de skalpel.

Om fistelachtige holligheden te openen wordt van de kromme bistourie *Fig. 8* en *9* gebruik gemaakt, waarvan de laatste een knopje aan de punt bezit, waardoor men van hetzelfde met meer veiligheid gebruik maakt.

Zijn zij van een vast hecht of van eene veer voorzien, ten einde grootere kracht te kunnen aanwenden, zoo ontvangen zij den naam van skalpel; gewoonlijk worden zij dan ook iets grooter gemaakt.

Tot het doen van insnijdingen in den hoof bezigt men bijzondere zoogenaamde hoofmesfen, die door hunne fterkte vooral daartoe gefchikt zijn (23), bij wier mangel men zich van het gewone veegmes bedienen kan.

428 Behalve deze mesfen kan men onder de
fuij-

(23) Men heeft drie foorten van hoofmesfen, te weten: het eigenlijke hoof-bistourie, *Fig. 10*, dat overal gelijk breed, van eenen dikken rug en eene ftompe punt voorzien is, en door deszelfs fterkte vergunt het hoorn naar welgevallen te fuijden.

Het groefmes, *Fig. 11*, bezit eene gelijke regte kling, welks punt zoodanig regthoekig haakswijs omgebogen en tweefuijdig is, dat men het naar beide zijden gebruiken kan. Deszelfs fmeden brengen breede groeven voort, wier beftemming is afloop te verfchaffen aan de in den voet uitgefteorte vochten en etter;

Het mijrthenbladvormige mes, *Fig. 12, a, b*, dat eene eironde, tweefuijdige en aan de punt opgebogene kling bezit, heeft eene bijzondere beftemming in de kunstbewerking van den hoornfistel en om verharde of fponfachtige randen der wonden weg te nemen; tot het zelfde einde dienen de gebogene hoofmesfen, *Fig. 13*, welke regts of links gebogen en van eenen rug voorzien zijn.

snijdende werktuigen nog de fcharen rekenen, van welke men behalve de gewone regte, noch twee foorten van kromme fcharen. (24) bezigt.

- 429 Tot het openen van harde deelen waartoe de bovenstaande werktuigen geene genoegzame fterkte zouden bezitten, en die slechts eene kleine opening vereifchen, om de nadeelig werkende of uitgestorte vochten enz. afloop te verfchaffen, die, het zij in de holigheden des hoofds of in den voet opgefloten zijn, maakt men nog van een werktuig gebruik, hetwelke den naam van trephine draagt (25), welks eenvoudige zamenftelling het

(24) Het eerste foort van kromme fcharen. *Fig. 14*, is volkomen als eene regte gevormd, uitgenomen dat dezelve volgens hare vlakke omhoog gebogen is; men bedient zich van deze om uitstekende ligchaamen op eene vlakke, of de haren ter plaatfe waar men eene infnijding wil doen, weg te fneiden.

Het andere is de kromme infnijdings-fchaar, *Fig. 15*, welke voor die plaatfen gebruikt wordt, waar men zich niet wel van het mes kan bedienen, zoo als aan de oogen en de weeke ligchaamsdeelen.

(25) De trephine heeft de gedaante eener gewone fretboor, met een ftalen handvat, en onder van eene zoogenaamde kroon voorzien, welker tanden wederzijds fneiden, waarvan men zich bedient om een rond ftuk been, vooral uit den harfenpan, of hoorn uit te boren.

het den voorrang boven den gewonen trepaan doet geven.

430 De beloeving en het gebruik alle dezer werktuigen trekt daar heen, de vochten ontlasting te verschaffen die in een gezwel of holte opgesloten zijn, en eene verwoestende werking op de aangrenzende deelen zouden uitoefenen, of wel, schadelijke voorwerpen te verwijderen, welke vooral in gestokene en geschotene wonden aanwezig kunnen zijn; om wier diepte en aard te peilen en te onderzoeken, men zich van de zoogenaamde fonde (26) bedient; terwijl men tot hunne verwijdering van eene tang en pincet (27) gebruik maakt.

Daar

(26) De fonde bestaat uit eene uit ijzer, zilver of balein gevormde stift, welks eene einde van een rond knopje voorzien is.

De gegroefde fonde, *Fig. 16*, dient om in fistelachtige gangen het insnijdingsmes met de punt te plaatsen en dus zonder gevaar te besturen.

(27) De tang waarvan men zich bedient om vreemde lichamen uit te trekken, is bijna als eene schaar gevormd, uitgenomen dat deszelfs einden half rotrond, en ter plaatse waar zij op een sluiten, gegroefd zijn.

Het pincet, *Fig. 17*, is een veerhard staal tange, waarvan men zich bedient, zoo om het verband weg te nemen als andere dingen te vatten, die de vingers bezoedelen of ontglippen zouden.

431 Daar tot het verrigten der meeste insnijdingen, ontleedkundige bekwaamheden en eene geoefendheid vereischt wordt, welke men bij vele lezers dezes werks niet veronderstellen kan, zoo bepalen zich dezelve voor deze, tot die, welke tot het openen van droes- of onderkaakklier-, vijvel- of oorklier- en zadelgezwellen, en des noods tot die des hoefs vereischt worden, tot wier gepaste volvoering de volgende algemeene regels behooren waargenomen te worden.

432 In alle heilkunstige bewerkingen, moeten de insnijdingen genoegzaam uitgestrekt geschieden om de bedoelde werking voort te brengen, doch aan de andere zijde, ook niet grooter dan hiertoe vereischt wordt, en met zoo weinig verwoesting der gezonde deelen als mogelijk zij, ten einde de weder herstelling des te spoediger plaats grijpe.

Te dezen einde moeten dezelve zoodanig geschieden, dat zij gelijkwijdig met de vezels loopen, en dus loodregt aan den hals, de borst, de vóór- en achterbeenen; terwijl zij aan het lijf waterpas verrigt, en in beide gevallen door het afsnijden van het haar vooraf gegaan moeten worden.

Bij het openen van ettergezwellen, hetwelke steeds aan de laagste plaats moet geschieden om den etter genoegzamen afloop

te verschaffen, vermijde men, de opening zoo groot te maken dat de lucht in derzelver hol-
 ligheid kan indringen, en daardoor nadeelig op
 de onder dezelve gelegene deelen werken,
 en poge, vooral in niet verouderde ge-
 zwellen, door eene kunstige drukking de ver-
 eeniging der opperhuid en het celwijs weeffel
 met deze weder tot stand te brengen, wijl
 de verzuimenis daarvan derzelver geheele af-
 sterving te wege brengt, en door hunne
 noodzakelijke weder voortbrenging eene zeer
 langwijlige genezing ten gevolge heeft, waar-
 van men dagelijks de voorbeelden ziet, in
 de langdurigheid der door de zadelkwetfing
 veroorzaakte wonden.

2. Het branden.

433 Van zulk een uitgebreid nut en met zoo
 weinig gevaar verbonden is het schroeijen
 met een gloeiend ijzer in de heelkunde der die-
 ren, dat men zich te regt verwonderen moet, dat
 zulks niet algemeener aangewend wordt.

Men bedient zich van hetzelfde tot berei-
 king van een tweeledig doel, namelijk:
 door toefchroeijen van aanmerkelijke bloed-
 vaten eene gevaarlijke bloedstorting te stuiten,
 of wel, door het veroorzaken eener kunstige
 ontsteking, de opflorpande vaten eene
 vermeerderde werkzaamheid te geven tot

het inzuigen van schadelijk werkende of uitgestorte vochten of andere zelfstandigheden; terwijl het da renboven door zamentrekking van den omtrek der bekleedelen van eenig deel, kan lijdragen tot het verminderen des omtreks van koude gezwellen; als zoodanig is dit het zekerste midde tot wegneming van gallen, leggers, schijthakken, uitzetting van gewrichtbanden, reumaticke kreupelheid, enz. en tot het vormen van eenen tegenprikkel in verschei.ene ziekten; eindelijk, om eene afscheiding tusschen een gezond en verstorven deel te weeg te brengen, en schadelijke te vernietigen.

434 De werktuigen die men tot dit oogmerk bezigt, zijn van verschillende gedaante, gewoonlijk van ijzer met eenen houten steel voorzien en aan het andere einde van eene mes- of ringvormige, puntige of platte gedaante, volgens het doeleinde waartoe men hen gebruiken wil.

435 Dezelve worden met steen- of nog beter met houtskool, kersrood gloeiende gemaakt, afgewreven, en zoo lang over de huid gestreken tot deze zonder geheel doorgebrand te worden, eene bruingele kleur verkrijgt, waarbij men de plaats die men door schroeijing eene grootere werkzaamheid wil geven, het

het zij met strepen of met punten, volgens zekere orde brandt ; (Pl. II.) zelfs is het in sommige gevallen voldoende tot voortbrenging der ontsteking, dat men het ijzer alleenlijk in de nabijheid houde, en eene of andere prikkelende zalf doe intrekken of eene spekzwaard tusſchen het ijzer en de huid plaatst.

Ter uitvoering dezer bewerking is het noodig dat het paard nedergeworpen wordt, dat men van een genoegzaam getal ijzers voorzien is, ten einde ſteeds behoorlijk gloeiende voorhanden te hebben, en dat men wel in acht neemt, om de huid wel genoegzaam, doch niet meer dan half door te branden; waartoe zulks met eene ligte hand zonder drukken geſchieden moet, terwijl men na de bewerking de gebrande plaats met eene verzachtende zalf infmeert.

Tot het ſtempen van bloedingen, dat naar den aard der plaat en met het platte, ronde of puntige ijzer geſchiedt, moet hetzelfde mede niet te ſterk op de plaats gedrukt worden.

e. Het verëenigen der wonden.

436 Hetzelfde geſchiedt door naden van verſchillende ſoorten, door welke men de wondlippen, vooral van gehouwene wonden te zamen hecht, in diervoegte als hiervoor aan gewezen is.

De werktuigen waarvan men zich hiertoe

bedient, zijn de zoogenaamde wondnaalden, *Fig. 20*, krom, met een driekante punt, en aan de tegengestelde zijde van groote en kleine oogen voorzien, tot doorsteken van bandjes of meervoudig zamengedraaide draden, met welke men de randen der wonden zamentrekt en verëenigt, hetwelke in menigerhande gevallen ook door een pikpleister geschieden kan.

- 437 Tot de stuiting der bloeding van aanmerkelijke bloed- en vooral slagaderen, dat bij kleine door zamentrekkende middelen, zwamenz. geschiedt, wordt bij grootere het middel van toefschroefing of wel dat van het onderbinden vereischt, tot welk laatste men zich, het zij van den zoogenaamden slagader-haak of wel van de tang bedient, waarmede men het bloedvat omvat, te voorschijn trekt en vervolgens met eenen dubbelgewasten draad ombindt en toeknoopt.

f. De verbanden.

- 438 Na deze voorafgaande beschrijving der noodzakelijkste heilkunstige bewerkingen, zal het niet overbodig zijn, kortelijk de middelen te gewagen, waarmede, men door het verbinden der wonden, breuken en verrekkingen, hunne heeling bevordert.

Dezelve bestaan uit plukfel, kompresen en zwachtels; zij hebben ten doel de kranke leden zoo nabij mogelijk hunne vorige stelling te doen hernemen, deze voor nadeelige indrukken te beschermen, en de heelmiddelen gelegenheid te geven op de voordeeligste wijze te werken.

Het plukfel dat bij den mensch uit uitgetrokkene lijnwaaddraden bestaat, doch waartoe men bij het paard, vooral in groote wonden, meestal wel geklopt werk, hennip of vlas neemt, dient, of om als prikkel of opdroogend middel op de wond te werken of heelmiddelen in dezelve te brengen. Naar mate van derzelver aard worden deszelfs draden geschikt, en ontleenen daarvan den naam van plumaceaus, wicken, steekwicken, proppen, enz.

439 Kompresen bestaan uit meer of min verdubbelde lappen oud linnen, flanel of wolle, en dienen om eene wond of andere beschadiging te dekken, eene zekere drukking te wege te brengen, of bevochtigd tot natte omslagen voor het lijdende deel te dienen.

De zwachtels of verbanden hebben ten doel, beide vorige hulpmiddelen ter hunner plaats te doen verblijven en voor verschuiven te bewaren; men bezigt tot dezelve linnen of wollen strooken, riemen, koorden enz.

440 Als een algemeene regel bij dezelve is waar te nemen, dat zij zoo eenvoudig en weinig drukkende voor het dier moeten zijn als eenigzins mogelijk is.

Daar tot voorkomstg huer verschuiving, vaste bevestigingspunten vereischt worden, dient daartoe een buikfingel, waaraan zich een borst- en staartrium bevindt, waarvan de fingel zes duimen breed en van zacht leder behoort te zijn; Voorts dient tot verband des hoofds een breede met baai gevoederde halfter van zacht leder, in de gedaante eens hoofdgestels gevormd, waaraan zich een keel- front- en neusriem bevindt, en voorts met eene dubbele rij nestelgaten tot bevestiging der verbandstukken voorzien is.

Ten einde een denkbeeld te geven van de wijze-hoedanig de onderscheidene verbanden bewerkstelligd worden, is hier (Pl. II.) de afbeelding dergene gegeven, welke LA FOSSE in zijn *Cours d'hippiatrique* voorgescreven heeft.

Zeer bezwaarlijk valt het echter dezelve werkdadig aan te wenden, wegens de onrustigheid die het dier gewoonlijk bezit, en die aanleiding geeft dezelve spoedig te doen verschuiven, weshalve het in de meeste gevallen verkiesbaarder is van eene eenvoudige bedekking gebruik te maken, die uit eene grove linnen lap bestaat, welke men naar eisch der omstandigheden, met banden aan den fingel,

gel, de borst- of staatriem, of wel aan den boven beschrevenen halfter bevestigd. Voor de beenen zoude men ook met meer voordeel van eene soort van lederen kous gebruik kunnen maken, uit zacht buigzaam leder gevormd, van nestelgaten en eene rijgsnoer voorzien, welke eene uitstijding voor de knie of hak bezit en tevens beweegbaarder en minder aan verschuiven onderhevig is, dan zwachtels; terwijl in voetwonden een diergelijke ruime lederen schoen verre den voorrang boven deze verdient.

T W E E D E A R T I K E L.

De middelen om zich van het paard te verzekeren.

441 Tot het doen der meeste dezer bewerkingen is het volstrekt noodig zich zoodanig van het paard te verzekeren, dat het even min door de pijn die het ondervindt, pogingen doe zich deze door beweging te onttrekken, als door verdediging den bewerker in levensgevaar brenge.

Men bedient zich hiertoe van verscheidene middelen, als, door den knevel of praam die men het op den bovenlip zet; den mond-rooster waarmede men dezen opent; de noodstalen het werpgereedschap om zich geheel van hetzelfde te verzekeren.

De

De beide eerste werktuigen worden dan gebruikt, wanneer men slechts eene eenvoudige kortstondige kunstbewerking behoeft te verrigten, en slechts weinig tegenkanting te wachten heeft.

442 De *p r a a m*, Pl. I. *Fig. 1, c*, waarin menden bovenlip prangende, door de pijn welke het paard bij iedere tegenkanting gevoelt, hetzelfde tot onderwerping dwingt, is van ijzer of hout gevormd, waarvan de laatste het eenvoudigste en werkzaamste en dus het verkiesbaarste is.

443 De *m o n d r o ' o s t e r d*, van ijzer gevormd en met een handvat voorzien, wordt gebezigd om het paard den mond te doen openen, wanneer men deze wil onderzoeken of er eenige kunstbewerking in verrigten.

444 De *n o o d s t a l* is dan alleen tot het doen eener zamengestelde bewerking aan te raden, wanneer dezelve zoodanig ingerigt is, dat men door middel eens breedten singels het paard van den grond opwinden en alle tegenkanting volstrekt beletten kan, of dat de bewerking in deze stelling volvoerd kan worden.

445 In vele andere gevallen is het eene volstrekt-

strekke noodzakelijkheid hetzelfde neder te werpen, niet alleen tot het doen van kunstbewerkingen en het verbinden, maar zelfs is zulks bij sommige paarden het eenige middel om hen te kunnen beslaan.

Hiertoe worden vereischt vier dubbele sterke lederen riemen, met baai of zelfkant gevoerd, van die evenredigheid dat zij de voeten kunnen omvatten; dezelve zijn aan hunne beide uiteinden van eenen ijzeren ring voorzien tot doortrekken der koord, Pl. I, *Fig. 1. a.* (28).

Om het nederwerpen van het paard te bewerkstelligen, kieze men eene vlakke plaats uit, welke men tien voeten in het vierkant dik met stroo bedekt, en bringe het paard op dezelve, na het, indien omstandigheden zulks vergunnen, 24 uren te hebben doen vasten, tot voorkoming dat de val geene der inwendige deelen doe bersten.

Vervolgens worden de riemen om de voeten gelegd en na de koord aan dien van het linker of regter voorbeen bevestigd te hebben,

naar

(28) Deze kluisters verdienen de voorkeur in al die gevallen waarin men geene der beenen onder de kunstbewerking behoeft los te maken, wijl zij van zelve afvallen; edoch wanneer men eene der beenen verplaatsen moet, zoo bevestigt men aan hetzelfde eenen voortgelijken kluister, die van eene gesp voorzien is. [*Fig. 1. b.*]

naar mate de zijde is op welke men het paard wil doen nedervallen, wordt de koord door de overige ringen en eindelijk door diegene gestoken aan welke zij bevestigd is, waarvan men het einde twee man in handen geeft. (zie Pl. I. *Fig. 1*)

Ook kan men twee koorden aan de overhoeksche vóór- en achterbeeren doortrekken, zoo dat de eene koord tusschen de vóór-, en de andere tusschen de achterbeenen door gaat, en ieder door twee man vastgehouden wordt, waarvan de een naar voren en de andere naar achteren trekt, hetwelke door alle geliktijdig even sterk geschieden moet.

Welke dezer beide wijzen men ook gebruike, men plaatse nog iemand aan het hoofd die het paard met den praam op de neus vasthoudt, en één aan de staart om het achtergestel vooruit te drijven, benevens twee man ter zijde om het in den val te ondersteunen en op die zijde te leggen die men begeert; alwaar men een deken uitspreidt om voor te komen dat geele stroohalmen deszelfs oog beschadigen, of wel men omwikkele het met denzelven. Zoo dra het paard gevallen is gaat een hunner op den hals zitten om zich van het hoofd des paards te verzekeren, van hetwelke men de vier voeten met eenen losen knoop te zamen bindt, en door dezen eené stroowis steekt.

DERDE ARTIKEL.

Het toedienen en de vorm der genees- en heelmiddelen.

a. Keuze en onderscheiding der geneesmiddelen.

446 De genees- en heelmiddelen die het groei-
stoffelijk, delfstoffelijk en dierenrijk opleve-
ren en in de veeartsenijkunde gebezigd wor-
den, hebben genoegzaam dezelfde toepassing
en werking op het dierlijke, als op het men-
schelijke ligchaam, echter met eenige wijzigin-
gen, die voornamelijk ontleend worden uit het
verschil dat tusfchen de bijzondere bewerktui-
ging, grootte en de levenswijs van een plant-
en vleeschëtend dier plaats grijpt (29). Terwijl
het ten algemeenen regel wordt aangenomen, om
wegens de vereischte grootere hoeveelheid, de
minst kostbaarste en eenvoudigste uit te kiezen.

Bij derzelver gereedmaking hebbe men op
te

(29) Wilde men de kracht der geneesmiddelen bepa-
len volgens hunne uitwerking op het menschelijke lig-
chaam, en dat der vleeschetende dieren, zoo zoude men
de uitkomst geenzins aan de verwachting zien beantwoor-
den, daar zij op deze vaak de sterkste uitwerking heb-
ben, terwijl zij op de plant- en graanëtende, weinige of eene
gheheel andere te wege brengen; deze verdragen niet alleen
vele plantgiften in eene verbazende hoeveelheid, maar de
spiesglans en hare bereidingen, de kwik en het rattenkruid
in zulke sterke giften, die voor de vleeschëtende dieren
voorzeker doodelijk zouden zijn.

te letten, geene tegenstrijdige zamen te voegen, en dat de onderscheidene soorten die één geneesmiddel uitmaken, wel te zamen en gelijkelijk vermengd worden.

Men ontvangt de geneesmiddelen uit de drie rijken der natuur, terwijl derzelver bereiding het onderwerp der artsenij-mengkunde uitmaakt. Geeft of bezigt men dezelve zoodanig als de natuur haar oplevert, zoo worden zij eenvoudige geneesmiddelen (*simplicia*) genaamd; worden verscheidene te zamen verëenigd, zoo ontstaan hieruit de zamengestelde, (*composita*); terwijl diegene welke door kunstbewerking uit een der drie rijken getrokken worden, den naam van scheikundige ontvangen.

Volgens hunne aanwending worden dezelve in inwendige en uitwendige onderscheiden; van welke de eerste in het bijzonder den naam van genees- den laatste die van heelmiddelen dragen.

Onderscheiden is de vorm en de wijze waarop eene en andere vervaardigd en toege-deeld worden.

b. Vorm en toedeling der genees- en heelmiddelen.

- 447 De geneesmiddelen worden bereid in de gedaante van poeders, pillen, flikbrokken, kaauw-

kaauwpoppen, dranken en lavementen.

Uitwendig worden de heelmiddelen door inspuitingen, baden, wasfchingen, smeersels, pleisters en berookingen aangewend.

A. Vorm en toedeeling der geneesmiddelen.

1) *Geneesmiddelen in vaste zelfstandigheid.*

448 De poeders worden het paard ingegeven, vermengd met natgemaakt voeder, het zij haver, meel, zemelen enz.; edoch, daar dezelve indien zij eenen voor hetzelfde on-aangenamen fmaak bezitten, het van eten kunnen wederhouden, en ingeval het den eetlust ontbreekt, hetzelfde nog minder dit vermengd dan zuiver voeder zal nuttigen, zoo is hun gebruik zeer beperkt en alleen bij wel-smakende geneesmiddelen en voortdurenden eetlust van toepassing, weshalve zij verre tegen dranken, flikbrokken en pillen terug staan.

449 Uit dezen hoofde maakt men een uitgebreider gebruik van pillen en flikbrokken, welke voornamelijk daarin verschillen, dat men de eerste eene vastere zelfstandigheid geeft; beide worden gevormd door de tot poeder gestootene geneesmiddelen, door middel van honig, fijroop, jeneverbezienfijroop, worteltap en zelfs in vele gevallen door dik gekookt

§22 TOEDEELING DER GENEESMIDDELEN,

kookt rogge- of tarwenmeel tot eene zoodanige weeke zelfstandigheid te vereenigen, dat men ze in eene der bovengemelde vormen kan ingeven.

450 De pillen worden ter grootte van ongeveer een hoenderei vervaardigd en aan een puntig gesnedenen stok gestoken, met welken men ze het paard tot in de keel brengt, waar zij dezen van zelve verlaten en vervolgens doorgeslikt worden.

451 De flikbrokken worden op eenen houten spatel genomen, vervolgens vat men met de linkerhand de tong des paards, trekt deze uit den mond en strijkt met den spatel de flikbrok op dezelve, waarna men de tong loslaat, bij wier terugtrekken, het paard verplicht is den flikbrok door te zwelgen.

452 Een ander middel zijn de zoogenaamde kaauwpoppen, bestaande uit geneesmiddelen die men om een trensgebit bindt, en ze dus het paard, dat men omkeert, in den mond geeft, hetwelke door kaauwen op dezelve, derzelver zelfstandigheid inneemt.

2) *Geneesmiddelen in vloeibare zelfstandigheid.*

a. *De dranken.*

453 Men gaat over tot het toedienen van
drank.

dranken wanneer de geneesmiddelen uit afkookfels of andere vlocibare of zoodanige middelen bestaan, wier oplossing in de maag moeilijk, onvolkomen of langzaam plaats grijpt, waarom men zulks alvorens verrigt, b. v. der zouten in water, der harsten en gommen in brandewijn enz. of, dat men slijmerige middelen tot verzachting of omzwachting van anders scherpe middelen wil bezigen, waartoe het lijnzaadmeel en de heemstwortel bijzonder geschikt zijn, of eindelijk, dat men eene spoedigere werking derzelve verlangt. Het ingeven derzelve geschiedt door middel van een hoorn, van een blikke of bij derzelve mangel, van eene gewone sterke flesch met eenen langen hals, waarbij men op de volgende wijs te werk gaat.

Indien men al van geenen bijzonderen toom tot ingeven, of zelfs van geene gewone watertrens voorzien is, welke steeds de voorkeur verdient boven, vooral dunne touwen, die ligt den mond beschadigen, (30) neemt men

(30) Tot het ingeven bedient men zich van eenen bijzonderen toom, welke uit een gewoon watertrens-hoofdstel bestaat, waaraan bij wijze van een gebit eene ronde ijzeren slang ter lengte van 6 duimen en één duim dik bevestigd is, wederzijds van eenen ring voorzien, aan welke het touw bevestigd wordt, met hetwelke men het hoofd omhoog trekt; of wel dezelve bestaat uit een stuk

men een sterk, tamelijk dik touw, waarvan men het eene einde tot eene lis vormt, die men het paard om de bovenkaak boven de haaktanden slaat: vervolgens steekt men het andere einde door eenen ring of katrol die zich boven het paard bevindt en trekt deszelfs hoofd met kracht omhoog; of wel men verheft hetzelfde door middel eener hooivork wier tanden men door deze lis steekt. Voorts treedt men ter zijde van het paard, steekt de punt van den hoorn, trechter of de hals der fles in deszelfs mond tusfchen de haaktanden en kiezen, en giete met eenige tusfchenpoozingen het de drank in den hals. (Pl. I. *Fig. 2.*)

b. De lavementen en inspuitingen.

454 De inspuitingen hebben een uitgebreid nut in de veeartsenijkunde, het zij dezelve als zoodanig in onderscheidene plaatsen of als lavement gebezigd worden.

455 Tot het inspuiten der lavementen bedient men zich van de klijsteerspuit, (31) of

van een geweerloop, dat aan het eene einde gesloten, in het midden van eene cironde opening en aan het andere van eenen trechter tot ingeven der dranken voorzien is.

(31) De klijsteerspuit welke van die grootte we-

of van eene zoogenaamde klijsteerkan, (32) welke wegens deszelfs langzamere werking door verscheidene de voorkeur gegeven wordt.

Bij het aanwenden der lavementen, welke volgens de bijgevoegde voorschriften zamengesteld en steeds laauwwarm toegediend moeten worden, kan men tot beveiliging tegen het achteruit slaan des paards, indien men deswegens eenige beduchting heeft, deszelfs vóór- en achterbeenen te zamen spannen.

456 De inspuitingen geschieden met eene kleinere zoogenaamde wondspuit, in zoodanige ligchaamsdeelen en wonden, welke men op geene andere wijze door de heelmiddelen kan doen bereiken, b. v. in de neusgaten, de holligheden des hoofds, in fistelachtige gangen enz.

De-

zen moet dat zij omtrent 2 ponden vochts kan bevatten, is te bekend om eene verdere beschrijving te behoeven, verschillende van de gewone alleen in grootte, en daarin, dat somtijds tusschen dezelve en de pijp eene buigzame lederen buis van omtrent 4 voeten lengte ingevoegd wordt, ten einde deze verrigting zonder gevaar uit te voeren.

(32) De klijsteerkan die uit blik gevormd omtrent 4 ponden of eene kanne vochts bevatten kan, is boven met een welsluitend deksel, ter zijde van een handvat en onder van eene houten pijp 16 duimen lang voorzien. Na dezelve met het lavement gevuld en de met olie bestreken pijp, ter halver lengte ter bestemder plaats ingebragt te hebben, opent men het deksel waarop het lavement langzaam uitvloeit.

Dezelve bestaan naar eisch der omstandigheden uit afkookfels van kruiden, specerijen balsemachtige of geestrijke middelen, zoo als tinktuur van mijrrhe, aloë, terebinthijn, enz. en wanneer men eene afscheiding wil bevorderen, uit de oplossing van opgehevene kwik, spaansch groen, hellschen steen enz.

c) Het inademen van dampen.

457 Niet alleen wordt de zelfstandigheid der geneesmiddelen zelve, maar ook derzelver dampen en rook met vrucht tot genezing gebruikt; welke volgens hunnen aard op tweederhande wijze op de werktuigen der ademhaling worden aangewend.

Het doen inademen der vochtige dampen is eene der heilzaamste middelen ter vermindering van ontsteking en spanning, zoo als in den droes, de long- en keelontstekingen, wijl zij verzwakkende werken.

Men dient dezelve toe, door in eenen emmer kokend water, kamillen- of vlierbloemen of bij gebrek van deze, zemelen of hooizaad te doen; vervolgens deze het paard onder het hoofd te zetten en eenen deken over hetzelfde te hangen, ten einde het tot inademing dezer warme uitwasemingen te verpligten; of wel, men kookt haver of garst in water, of indien men een sterker prikkelender werking

king begeert, in bier, en doe dezelve in eenen zak, welke men het paard, bij wijze van eenen mondzak omhangt, terwijl men in geval van verzwakking van het slijmvlies, dezelve met heete azijn zoude kunnen vermengen, hetwelke vooral in eenen droes en andere ziekten met verzwakte levenskracht en verslijming gepaard, voorzeker goede gevolgen beloofd; in welke gevallen ook die van welriekende kruiden van dienst kunnen zijn; men maakt daartoe een kei- of muursteen heet, plaatst dezelve in een bak, giet azijn op dezelve, en doe het paard de opgeloste dampen op gelijke wijze inademen.

- 458 De berookingen met drooge dampen van verschillende zelfstandigheden, worden als een prikkelmiddel aanbevolen, waarvan men vooral in den verdachten droes met regt veel verwachting heeft, welke daartoe door middel eene bijzonder werktuig, in den neus gebragt worden (33); zoo als ook de lavementen van tabaks-rook (34) zich als

(33) Hetzelve bestaat uit eene bolronde blikke doos, onder van eenen rooster, boven van eene slangvormige kopere pijp, en aldaar ter zijde van eene schuif voorzien, dienende om het rookpoeder door te werpen, dat alsdan op een gloeiend ijzer valt hetwelke op den rooster gelegd is. Pl. I.

(34) Het werktuig tot de lavementen van tabaksrook, heeft de vorm van eenen dubbelen blaasbalg; aan deszelfs uiteinde van eene lange ledere huis, en op de bovenvlakte van eene ingeschoefde, met tabak gevulde tabakspijp voorzien.

als een zeer werkzaam middel in de orgesteldheden van het darmkanaal hebben doen kennen.

B, Vorm en gebruik der heelmiddelen.

459 De uitwendige of heelmiddelen bestaan in koude, warme en drooge omflagen, baden en waschingen: voorts in zalven, smeersels en wondsteenen.

460 De omflagen zijn van het uitgebreidste en heilzaamste gebruik in alle heilkundige gevallen, waarin het noodig is te verdeelen, te ontspannen, te verkoelen of te versterken.

a. De omflagen.

461 De koude omflagen bestaan, het zij uit kompresen die men uit eene of andere linnen of wollen stoffe vervaardigd, of uit pottenbakkers klei, eene en andere genoegzaam met de begeerde vochtigheid doorweekt, welke naar eisch der omstandigheden verschillende is. Dezelve zijn bijzonder dienstig in alle gevreesde sterke ontstekingen, waarin de toevloed van vochten, zware en gevaarlijke toevallen zouden veroorzaken, zoo als in alle hoofdbeschadigingen, oogontstekingen, zadeldrukking en verdere kneuzingen; voorts in verrekkingen, verzwakking van het celwijs weeffel en beslissende gezwellen; van de daartoe gebruikte zelfstandigheden is koud- en vooral sneeuwwater eene der eerste hoofden tevens der onkostbaarste middelen.

Indien eene kneuzing verdeeling vereischt die niet anders dan door prikkeling bewerkt kan worden, is eene vermenging van drie deelen water met één deel azijn en genoegzaam zout, of n°. 84, *f* zeer geschikt.

Bij een zeer zwak celwijs weeffel is de oplossing van aluin, afkookfel van eikenbast, ijzerwater. loodextract, enz. bijzonder nuttig. Tot het bezielen der deelen die hunne werkingskracht verloren hebben, dienen: water, azijn, brandewijn, zeep- en kamfergeest enz., terwijl men om te versterken, de prikkelbaarheid te vermeederen en de opflorping te bevorderen, behalve de voorgaande, potasch- of houtaschleog gebruikt.

462 Van geen minder nut zijn de warme omslagen, vooral tot vermindering der ontsteking, verslapping, ontspanning en het tot rijpheid en ettering brengen van ontstekings- en koude gezwellen.

Tot verslapping bedient men zich vooral van het afkookfel van lijnzaad, havermeel, zemelen, heemstwortel, kaasjeskruid, enz.; tot pijn- en krampstilling kan men afgekookt zwartbilsenkruid, kamillen-bloemen, slaapbollen en opium bijvoegen; terwijl men tot vermeerdering der werkzaamheid en prikkeling, zuurdeeg zelfs met bijvoeging van mosterdzaad, en tot versterking, warm bier of wijn gebruikt en

naar omftandigheden er lavendel, majolijn, falie, munte, jeneverbezien, enz. bijvoegt, om dezelve krachtiger te maken.

- 463 Bij deze omflagcn kan men de pappen voegen, wier oogmerk is, harde gezwellen en klieren tot ettering te brengen; dezelve bestaan uit wittebrood, lijnzaadmeel enz., waarbij men, indien de gezwellen verdeeld moeten worden. lood-extract, nachtschade, enz. en tot pijnstilling, opium voegt.

c. De inwrijvingen.

- 464 Eene der voornaamfte prikkelmiddelen bij verminderde werkingskracht der werktuigen (*organen*), zijn de inwrijvingen, wijl zij den ongelijken en vertraagden omloop der vochten verminderen; terwijl men tot hen onderscheidene zelfftandigheden bezigt.

Met een bijzonder nut worden dezelve als plaatfelijke prikkelmiddelen aangewend, welke vooral in koude gezwellen, reumaticke toevallen en verrekkingen ook als verzachtend en weekmakend middel bijzonder werkzaam zijn.

Zulks gefchiedt met kamfer- en zeepgeest, zuren zeepachtigen ballen, fpaanfche vliegen aftreksel, phosphor-olie en kwikzalf, gelijk ook met mosterd, peperwortel enz.

De

1. De wasfchingen en baden.

- 465 Zeer na hiermede verbonden zijn de wasfchingen, die zoo wel tot verzachtende als prikkelmiddelen gebruikt worden, waarbij die met brandewijn alleen of met zeep, de beenen na groote vermoeijenissen bijzonder nuttig zijn.
- 466 Niet minder uitgebreid is het nut en gebruik der baden, die zoo wel koud als warm, het zij algemeen het zij plaatselijk op verfchillende wijzen aangewend worden, doch van alle welke het water het hoofdbestandeel uitmaakt. Zij dienen niet alleen tot zuivering, maar verfrifchen, verfterken, bezielen en ontspannen volgens hunne zamenftelling en den aard waar op zij worden toege diend.
- 467 Het algemeene koude bad in ftroomend water in het warme jaargetijde, is eene der meest verfterkende middelen, zoo tot herftel van verlorene krachten, en het overwinnen van jichtige toevallen als vooral in huidziekten, tot reiniging der huid.
- 468 Ook zijn het de ftortbaden van koud water, welke in herfenontftekingen en kolijken, vaak de krachtigfte en eenigfte hulpmid-

middelen opleveren; gelijk het plaatselijke koude bad, een bijzonder werkzaam middel is, om verzwakte deelen hunne vorige sterkte en veêrkracht terug te schenken.

469 De warme baden, offchoon tot eene plaatselijke aanwending beperkt, brengen des niet te min de uitnemendste gevolgen voort, het zij men dezelve door middel van in warme loog gedoopte en omgehangene dekenen, in krampachtige toevallen, of door middel van een emmer met verzachtende kruiden, als kamillen, hooizaad, jeneverspoeling, enz. bij voetgebreken, in het werk stelt; terwijl dezelve daarenboven het nut hebben, in verslijfde deelen eene heilzame ontspanning te wege te brengen.

470 Behalve in de vloeibare gedaante worden de heelmiddelen als eene vastere zelfstandigheid in den vorm van zalven, balsems, pleisters en wondsteen en op de beledigde plaatsen aangewend.

Even verschillende in zamenstelling als gebruik zijn de zalven, als ten doel hebbende het plukfel te verhinderen aan de wond te kleven of deze te prikkelen; voorts de ettering te bevorderen, of wel haar te overdekken.

Men onderscheidt dezelve dus in etterbe-

vorderende en in minder prikkelende foorten, van welke een en ander onder de hier achter geplaatste voorschriften voorkomen; dezelve worden dus op de wicken gestreken], om derzelver stijf worden en het verharden der wondranden voor te komen.

d. Wondwaters en wondsteenen.

471 Tot heeling der wonden worden ook wondwaters en wondsteenen gebruikt met welke men de wonden ter genezing bevochtigt, en waarvan de laatste ter gemakkelijker medevoering bestemd, in eene of andere vochtigheid ten zelfden einde opgelost worden.




De geneeskundige gewigten en maten.

472 Ten uiterste gewigtig is het met deze bekend te zijn; men dient dus te weten dat de geneesmiddelen naar dat hunne zelfstandigheid vast of vloeibaar is, volgens gewigt en maat, meermalen ook volgens het eerste alleen bepaald worden.

Een gewoon pond (℔) bevat	. . .	16 oncen.
Een apothekers pond	. . .	12 ———
Een once ($\frac{7}{8}$) 2 lood of	. . .	8 drachmas.
Een halve ($\frac{5}{8}$) once of 1 lood	4 drachmas.
Een drachma ($\frac{3}{8}$) of $\frac{1}{4}$ lood	3 schrupels.
Een schrupel ($\frac{1}{8}$)	20 grein.
Eene geneeskundige maat bevat 8 ponden vocht.		
Een kan omtrent	4 ponden.
Een kwartier of flesch	2 ponden.
Een pintje	$1\frac{1}{2}$ pond.
Een wijnglas	$1\frac{1}{2}$ à 2 oncen.
Een lepelvol	$\frac{1}{2}$ ons.
Een droppel	1 grein.
Zouten of zware poeders rekt men op een		
kleinen lepel, $\frac{1}{2}$ drachma of wel	2 schrupels.
Ligte poeders van 15 tot 25 grein.		
Van planten rekt men een vingergreep op 1 drachma.		
Een handvol	$\frac{1}{2}$ once.
Een armvol	6 oncen.




VOORSCHRIFTEN VAN GENEES- EN
HEELMIDDELEN.



VOORSCHRIFTEN

VAN

GENEES- EN HEELMIDDELEN.



VOORAFGAANDE AANMERKINGEN.



Deze verzameling van voorschriften is onder eene bijzondere volgreeks van bladzijden gedrukt, met de bedoeling om niet alleen bij het werk zelve te dienen, waarin hunne toepassing aangewezen wordt; maar om ter gemoedkoming van het geheugen te verstreken, wanneer men, het zij op reis, in het veld, als anderzins, hetzelfde als te omflagtig ter medevoering mogte aanmerken; immers is het wel mogelijk dat men zonder eigentlijk paardenarts te zijn, eenige kennis van den aard, en de algemeene behandeling der ziekten verwerve, edoch het is geenzins te verwachten, dat hij die de veeartsenijkunde niet regelmatig beoefend heeft, de vorm, het soort en hoeveelheden der vereischte en voor ieder geval meest geschiktste geneesmiddelen in de gedachtenis zoude behouden, van welke zorg hem deze kleine verzameling van voorschriften zal ontheffen, welke hij daartoe slechts behoeft op te slaan.

A

De-

Deze opheldering zal noodig zijn om het ware gezigtspunt te vinden, waaruit men dezelve moet beschouwen, ten einde ze niet onder eene zelfde klasse met die menigvuldige receptboeken te rangschikken, wier ondoelmatige aanwending vaak meer nadéel te wege brengt, dan hunne nalating gedaan zoude hebben. Immers hoe gepast een geneesmiddel voor ééne soort van ziekte en in een bepaald tijdperk derzelve berekend moge zijn, zoo schadelijk is het vaak in ieder ander, waardoor alle voorschriften slechts voor zoo verre waarde bezitten, als degene die ze wil aanwenden, in staat is deze eenigzins te onderscheiden, en daarna doelmatig aan te wenden, en alsdan hebben zij het nut, hem die met de kennis der eigenschappen, hoeveelheid en toebereiding der geneesmiddelen niet gemeenzaam is, de behandeling der ziekte zeer gemakkelijk te maken, door de opgave van voorschriften, die voor ieder derzelve berekend zijn.

Daar men in de veeartsenijkunde even als in de geneeskunde die artsen wel het gelukkigste ziet slagen, die zich tot het gebruik van slechts weinige en welgekozene middelen bepalen, wier krachten hen volkomen bekend zijn, en in wier aanwending zij volgens de verschillende gevallen, de vereischte wijzigingen weten te maken, zoude het wel-

welligt kunnen gebeuren dat de hierbij gevoegde opgave der in de paarden-artsenijkunde gebruikelijke middelen, door hen als te omflagtig beschouwd, en aan eene meer beperkte de voorkeur gegeven wierdt, edoch deze overwegen daarentegen, dat ofschoon alle goede artsen dezelfde algemeene regels van geneeskundige behandeling volgen, zij echter in de keuze der middelen tot bereiking van hun doel, vaak van verschillende gevoelens zijn, en op het eene meer vertronwen dan op het andere stellen, en dat deze mischien als eene gaping zouden beschouwen, indien zij eenig middel zagen voorbij gegaan, welks nut in bijzondere gevallen, hen de ondervinding had doen kennen; dus zal deze lijst voor het algemeen niets overtolligs bevatten, maar mogte zelfs voor den wensch van sommige nog uitgebreider zijn.

Zoo ook zal welligt het aantal der geneeskundige voorschriften te groot, en voor hem overbodig voorkomen, die door de beoefening der natuur- en ziektekunde, en de kennis van de uitwerking der geneesmiddelen op het dierlijke ligchaam, dezelve zouden kunnen misfen, daar zijne kundigheden hem in staat stellen, uit de geneesmiddelen eene gepaste keuze te doen, en hen naar den eisch der omftandigheden zamen te voegen,

gen; edoch daar deze onderscheiding geenzins van den in de geneeskunde ongeoeffenden verondersteld kan worden, en de onzekerheid hem in eene angsvallige verlegendheid, nopens derzelver keuze zoude kunnen brengen, scheen het mij verkiesbarer liever te ruimfchotig dan te karig in hunne opgave te moeten zijn; terwijl ik des te vrijmoediger daarbij heb durven te werk gaan, daar zij uit diegene bestaan, welke, het zij door onze beroemdste hedendaagfche vee-artfennijkundigen, als: WOLSTEIN, TENNERER, PILGER. VIBURG, AMMON, enz., als doelmaticg aangeprezen, of door het geneeskundige bestuur der armee, ten voorschrift aan de troepen te paard gegeven, of door mij zelve in mijnen langdurigen dienst bij de kavallerij, door ondervinding beproefd gevonden zijn; van welke de voorschriften des geneeskundigen bestuurs, die ter onderscheiding, dit merkteeken (*) dragen, dusdanig toebereid aan de korpsen ruitery gezonden zijn geworden, en in de meeste gewoone gevallen toereikende geacht kunnen worden; terwijl het echter den ervarener paardenkenner vrij staat, hierin zoodanige wijzigingen te maken, als de omftandigheden hem raadzaam zouden kunnen doen toefchijnen.

Daar de benamingen der genesmiddelen zoo door de nieuwe fcheikunde als de rangfchikking

van

van den ridder LINNEUS, grootelijks zijn veranderd, terwijl zij echter veelal nog onder hunne oude bekend zijn, en bij deze onderscheiden worden, worden hierdoor niet alleen vorige schriften onverstaanbaar voor den genen die met beide niet gemeenzaam is, maar zeer ligt zoude zulks misverstand kunnen doen geboren worden; het is uit dezen hoofde dat dezelve onder beide benamingen, en zoo wel in het latijn als nederduitsch in de voorschriften voorkomen, ten einde men bij het overschreden der grenzen onzer nederduitsche spraak zich in geene verlegendheid ingewikkeld bevinde, daar de hoogduitsche en franche benamingen te zeer van die in de nederduitsche taal verschillen, om het daarin verlangde geneesmiddel aan te duiden, terwijl daarentegen de latijnsche benamingen alom dezelfde en tot geneeskundig gebruik algemeen in de apotheken bekend zijn; terwijl voorts tot spoedige onderscheiding der oude en nieuwe benamingen, en om niet in gedurige herhalingen te vervallen, hierbij gevoegt is eene naamlijst der voornaamste genees- en heelmiddelen in de onderscheiden talen, welke tevens ten hulpmiddel bij het doorlezen van vee-artsenkundige werken in de franche en hoogduitsche taal verstrekken kan.

Eindelijk daar het eene geneesmiddel van een uitgebreider algemeen gebruik dan het

andere is, of zich door min kostbaarheid en verkrijgbaarheid voordeelig onderscheidt, eigenschappen die bijzonder in de veeartsnijkunde in aanmerking komen, zoo zijn deze in den tabel met dit teeken (*) aangewezen, en voorts de zoodanige, wier nabij overeenkomende eigenschappen en uitwerking toelaten, dat bij mangel der eene, de andere gebezigt kunnen worden, met een zelfde cijffertal aan het einde des regels geteekend.

Niet ten onpasse moge het geacht worden, de volgende regels nopens de keuze en toediening der geneesmiddelen alhier eene plaats in te ruimen.

Zoo lange men niet van het wezen of den aard der ziekte volkomen overtuigd is, overhaaste men zich niet met het toedienen van geneesmiddelen, wijl uit omzigtig dralen, nimmer zoodanige schadelijke gevolgen, als uit overijling ontspruiten.

Indien het kenmerk der ziekte niet duidelijk in de oogen valt, zoo wachte men zich wel, om met het gebruik van sterk werkende of beslissende middelen den aanvang te maken, maar kieze daartoe de zachtste en onschuldigste uit; wanneer men dus van het aanwezen eener ontsteking niet volkomen overtuigd is, zoo zette men liever een dag langer, het gebruik van een hedarend of verzachtend middel voort, tot het ontstekende

de karakter zich meer ontwikkeld, en dus eene duidelijker aanwijzing tot de wijze van behandeling gegeven heeft; is daarentegen het aanzijn of toenemen der zwakte, nog met een twijfelachtig duister omfluijerd, zoo zij men omzigtig, niet te plotseling prikkelden en opwekkende middelen aan te wenden.

Met uitzondering dier enkele gevallen, welke geen dralen toelaten, vange men de geneeswijze, steeds met de kleinste giften aan, alvorens tot sterkere middelen en grootere hoeveelheden op te klimmen, daar de vermeerdering altijd van minder nadeelen verzeld gaat, dan eene gedwongene vermindering; vooral verplicht de ouderdom, grootte en gesteldheid des paards tot eene oplettende wijziging in dezen, daar men dezelfde maat van geneesmiddelen die voor een groot, bejaard of verzwakt paard volstrekt noodig mogte zijn, niet wel aan een jong, kleiner en welgevoed kan toedienen, zonder welligt eenen te sterken prikkel te veroorzaken.

Bij de keuze van elk middel overwege men steeds wat het oogmerk is, dat men er door wenscht te bereiken, welke deszelfs werking op het dierlijke ligchaam is, en dus wat men van hetzelfde moge verwachten. Hier aan zoude kwalijk voldaan worden, wilde men te veel onderscheidene middelen te zamen verbinden, want is hunne werking

VIII VOORSCHRIFT. VAN GENEESMIDDELEN.

overeenstemmende, zoo is onnodig hun aantal te vermeerderen, en strijdige middelen kunnen even min een goed gevolg beloven, als dat men hopen kan, tegenover gestelde einden door hen te bereiken, daar zij elkanders werkingen vernietigen; dus zoude het in het algemeen ongerijmd zijn, wanneer men gelijktijdig, verzwakkende en versterkende, prikkelende en bedarende middelen wilde aanwenden; alleen de ervaren arts vermag somtijds door de verbinding van schijnstrijdige middelen, eenige wijzigingen te maken, om hunne krachten tot een heilzaam doel te temperen; b. v. in de vereeniging van kamfer en salpeter, edoch nimmer zal men hem dit tot tegenstrijdige bedoelingen zich verrigten.

Van bijna gelijk werkende geneesmiddelen, geve men steeds aan inlandsche en ligt verkrijgbare, de voorkeur boven uitheemsche en zeldzame, zoo als ook aan de minkostbare, boven de dure, wanneer hunne uitwerking bijna gelijk staat.

VOOR.

VOORSCHRIFTEN

VAN

GENEES- EN HEELMIDDELEN.

GENEESMIDDELEN.

Middelen in den droes.

De goedaardige droes en verkoudheid.

- I Vlierbloem - afrekkfel, van $\frac{1}{4}$ pond op 2 kan
water.
Braakwijnsteen (gefpiesglansde wijnsteenzure pot-
asch,) *tart. emeticus*,) *tart. potassæ sibiata*) 2 drachma.
Eenvoudige honigazijn, (*oxymel simplex*), 2 pond.
Alle 2 uur één pint.

2

a.

- Jeneverbezien, (*bacc. juniperi.*) *juniperis com-*
munis L.) 4 oncen.
Roode gentiaan w. (*rad. gent. rubræ*) *gentiana*
lutea L.) 4 ———
Anijszaad, (*sem. anisi*) *pimpinella anisum L.*) 2 ———
Spiesglans, (*antimonium crudum*) 4 ———
Keukenzout. 4 ———
Driemaal daags een lepel vol.

A 5

*) b.

*) b.

Spiesglans.	1 drachma.
Fenegriek, (<i>fœni-græci sem.</i>) <i>trigonella fa-</i> <i>num græc. L.</i>)	3 ———
Zoethout, (<i>liquiritia</i>) <i>glycyrrhiza officinalis L.</i>)	3 ———

Met genoegzamen honig tot een slikbrok, welke men
in eens en 4 maal daags in geeft.

c

Zoethout	2 drachma.
Fenegriek	2 ———
Anijszaad	1 ———

Goudzwavel, (gezwavelde verzuurde spiesglans,
met waterstof,) *sulph. aurat. antimonii.*) *sul-*
phuretum oxyduli stibii hydrogenatum.) 1 schrupel.

Tot een poeder in eens.

3

Alandswortel, (<i>r. helenium</i> ,) <i>inula helenium L.</i>)	8 oncen.
Anijszaad	2 ———

Zoete kwik, (onvolkomene zoutzure verzuurde
kwik,) *calomel. merc. dulcis.*) *urias hydar-*
gyri oxydulati.) 2 drachma.

Goudzwavel	2 ———
------------	-------

Met genoegzamen honig tot een slikbrok, en daarvan
viermaal daags 2 lepels vol ingegeven.

4

Ammoniakgom (<i>gumm. amm. pur.</i>) in	2 oncen.
Geest van minderer, (azijnzure ammoniak,) <i>spir.</i> <i>minder.</i>) <i>acetis ammoniac liq.</i>) ontbonden.	8 ———
Jeneverbezen - siroop	1 pond.

Alle 4 uur $\frac{1}{2}$ deel, in een afkooksel van lijnzaad.

Z:

5 Zevenboom, (*h. sabina*) *juniperus sabina* L.) 2 oncen.

Jeneverbezen, 2 —

In eene kan water gekookt en een pint met n^o. 4
gegeven.



De boosaardige droes.

6

e.

*Middel om in dezen de ontlasting uit de
neus te bevorderen.*

Duivelsdrek, (*assa fatida*) *ferula assa fatida* L.)

ontbonden 1 ons.

Geest van kamfer, (*spir. camphor.*) 2 drachma.

Terebinthijn - olie, (*ol. terebinth.*) 2 —

Wijn $\frac{1}{2}$ pint.

Warm in eens in te geven.

e) b.

Spiesglans 1 drachma.

Zoete kwik. 15 grein.

Galganth - wortel, (*rad. galanga.*) 3 drachma.

Kalmus w. (*r. calam. arom. (acor. cal. L.)*) 3 —

Met honig tot een slikbrok, in eens.

A 4

e.

XII V O O R S C H R I F T E N

6.

Roode gentiaan - wortel	.	.	2 drachma.
Galanth - w.	.	.	2 ———
Alants - w.	.	.	1 ———
Mosterdzaad.	.	.	1 ———
Bloem van zwavel	.	.	1 ———

Tot een poeder of als een slixbrok, in eens.

Verkoelende middelen in ontstekings-
ziekten.

a

7

Wonderzout van glauber, (zwavelzure soda) <i>sal mirab. glauberi.) sulphas sodæ)</i>	.	.	4 ons.
Salpeter, (salpeter - zure potasch) <i>nitr. depur.) nitras potassæ depur.)</i>	.	.	3 —
Room van wijnsteen, (zuivere wijnsteenzure potasch) <i>cremor tart.) tartris acidula potassæ.)</i>	.	.	1 —
Zoethout	.	.	1½ —

Met genoegzamen honig tot een slixbrok, van welke men ieder 4 uur een lepel vol geeft.

*) b.

Salpeter	.	.	1 ons.
Ammoniak - zout	.	.	1 drachma.

Met honig tot een slixbrok, in eens.

8 Versterkende middelen tot natuur, en in met
verzwakking gepaarden droes.

Wilgenbast, (<i>cort. salicis laur.</i>)	.	3 oncen.
Jeneverbezi n	.	4 —
Yzer - vijffel	.	2 —

Op ieder voeder 2 lepels vol.

*) b.

*) b.

Versterkend middel in den boosaardigen droes met
verzwakking.

Goudzwavel	$\frac{1}{2}$ drachma.
Yzer - vijfel	1 ———
Alandswortel	2 ———
Baldriaan w. (<i>rad. valer. sylv.</i>) <i>valeriana offic. L.</i>) 3	———

Met honig tot een slikbrok ; in eens , 3 maal daags.

9

Baldriaan w. . . .	1 ons.
Kalmus - w	2 ———
Rooide gentiaan - w	2 ———

Op ieder voeder één lepel vol.



In den verplaatsten droes.

10

Kamfer. (*)	2 drachma.
Geest van minderer	2 oncen.
Honig	2 ———
Jeneverbezien	4 ———
Vlierbloem aftreksel	2 pint.

Alle 2 uur een vierde gedeelte.

(*) Zie n°. 22.

KIV VOORSCHRIFTEN



In den verdachten of de beginfelen van den
kwaden droes.

II

a.

Oprement, (<i>puly. subtil. auriplyment.</i>)	4 drachms.
Wilgenbast.	8 ons.
Kalmus - wortel	4 —

Draganth-gom, (*mucil. gumm. tragacant.*) gefmol-
ten, zoo veel als noodig is, om 16 pillen
te maken, waarvan men des morgens en 's
avonds één ingeeft.

*) b.

Zoete kwik.	1 fchrupel,
Bloem van zwavel	1 drachma.
Witte kervel, (<i>herb. cicuta.</i>)	$\frac{1}{2}$ —
Heemstworrel, (<i>rad. althæa</i>) <i>althæa officinalis</i> L.)	2 —

Met honig tot een flikbrok, in eens.

II

Opgehevene bijtende kwik (zoutzure kwik) *merc.*
subl. corrosivus) *urias hydrargyri oxydati*) 1 drachma.
Ontbonden in 2 pond overgehaald regenwater,
waarbij men zoo veel arabifche gom voegt als
noodig is om het lijnig te maken.

Jeneverbezien moes	1 pond.
------------------------------	---------

Fijne eikenbast. (*puly. cort. quercus*) *quercus*
robur. L.) in genoegzame hoeveelheid om er
12 pillen van te maken, waarvan men des
morgens en 's avonds één ingeeft.

In

In den kwaden droes.

13

a.

Roode gentiaan - w.	6 oncen
Bloem van zwavel	6 ———
Ammoniak - gom	2 ———
Duivelsdrek	1 $\frac{1}{2}$ ———
Goudzwavel.	$\frac{1}{2}$ ———
Zoete kwik.	$\frac{1}{2}$ ———

Met honig tot een flikbrok in 12 deelen, 2 maal
daags een deel.

b.

Kalmus - wortel	4 onf.
Pokhout, (<i>lign. guajac.</i>) <i>guajacum officinale</i> L.)	1 ———
Zeeajuin - w. (<i>rad. squillæ mar.</i>)	1 ———
Zoete kwik	2 drachma.
Kamfer	4 ———

Met honig tot een flikbrok in 8 deelen, tweemaal
daags een deel.

14

Bernage kruid en wortel, (<i>herb. boraginis c. rad.</i>)	8 oncen.
Slangenwortel, (<i>rad. serpentariæ virginianæ</i>)	
<i>aristolochia serpentaria</i> L.)	4 ———
Suikerijwortel, (<i>rad. cichoreæ.</i>)	4 ———

Dit met 4 pint water in een digten pot gekookt,
voorts doorgezijgd en bijgevoegd:

Kalkwater	1 pint.
Ammoniakzont	2 oncen.
Salpeter	2 ———
Honig	3 ———

Van dit middel geve men driemaal daags $\frac{1}{2}$ pint, ter-
stond na het ingeven van n^o. 13, z.

Mid-

18 *Versterkend middel tot natuur in den kwaden droes.*

Eikenbast	12 oncen.
Kalmus - wortel	6 ———
Jeneverbezien	6 ———
Zevenboom	4 ———
Ijzervijfel	1 ———

Tot een poeder gemaakt en in 4 dagen ingegeven.

19

Wilgenbast	8 oncen.
Meekrap, (<i>rad. rubiae tinctorum.</i>)	8 ———
Kalmus - wortel	2 ———
Gom van mijrhe, (<i>gumm. myrrhae.</i>)	2 ———

Tot een poeder gelijk het voorgaande.

b.

Middel van WALDINGER, Profesfor bij de veeartsenij-
sehoel te *Weenen*, tegen den nog niet verouder-
den kwaden droes.

Fijn gestotene houtskoolen in een zak, het paard zoo-
danig omgehangen, dat het dezelve moet opsnuiven;
dit middel moet tweemaal daags, gedurende een uur
aangewend en telkens nieuw vervaardigd worden.

Voorts wordt eene dragt vóór de borst gezet, en de
verharde klieren ingewreven met volgenden balssem:

Laurier - olie	$\frac{1}{2}$ once.
Terebinthijn - olie	1 ———
Spaansche vliegen poeder	2 drachma.

Te-



Tegen den worm.

Uitwendig.

20

a.

Vermillioen, (roode gezwavelde kwik,) <i>cinnabaris factitia</i>) <i>sulphuretum hydrarg. rubr.</i>)	2 drachma.
Drakenbloed, (<i>sanguis draconis.</i>)	12 grein.
Wit rattenkruid.	40 —

Inwendig.

b.

Eikenbast.	2 drachma.
Pokhout	3 —
Kraanoogen, (<i>nux vomica</i>) <i>strychnos nux vomica</i> L.)	$\frac{1}{2}$ schrupel.
Spiesglsnslever	$\frac{1}{2}$ —
Gom van mijrrhe	2 —

Met honig tot een flikbrok, tweemaal daags, in eens.

*) c.

Zoete kwik	1 schrupel.
Goudzwavel	$\frac{1}{2}$ drachma.
Wilde kervel	$\frac{1}{2}$ —
Zevenboom	$\frac{1}{2}$ —

Met genoegzamen honig tot een flikbrok als boven.

*) d.

*) d.

Wilde kervel.	.	.	.	$\frac{1}{2}$ drachma.
Opgehevene bijtende kwik	.	.	.	6 grein.
Ammoniakgom	.	.	.	2 drachma.

In eene flesch gekookt water of met lijnzaad - afkookfel opgelost.

Middel van COLLAINÉ tegen den kwaden droes
en den worm.

Tegen den kwaden droes.

e.

Spiesglans - lever	.	.	.	6 oncen.
Bloem van zwavel	.	.	.	12 à 18 ons.

Met genoegzamen honig tot slikbrokken, en dagelijks deze hoeveelheid ingeven, met kleine giften beginnende.

f.

Tegen den worm.

Mijnstoffelijke kermes, (waterstoffig verzuurde spiesglans,) <i>kermes minerale</i>) <i>hydro-sulphuretum oxyduli stibii.</i>)	.	.	.	2 oncen,
Of bloem van zwavel.	.	.	.	6 —

Als boven dagelijks.

~~~~~

## Longontsteking.

In het begin tot wegneming der ontsteking.

21

*a.*

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Lijenzaad . . . . . | 4 oncen. |
|---------------------|----------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Gekookt in putwater. . . . . | 2 kan. |
|------------------------------|--------|

tot het lijnachtig wordt, waarna men het  
doorzijgt en er bijvoegt:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Zuivere salpeter . . . . . | 4 oncen. |
|----------------------------|----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Enkelvoudige honigazijn . . . . . | 2 ponden. |
|-----------------------------------|-----------|

Alle 2 uur een pint, of wel men geeft n<sup>o</sup>. 7, *a*, *b*,  
als slikbrok tweemaal daags.

*aa.*

Tot vermindering van den hoest.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Alandswortel . . . . . | 4 oncen. |
|------------------------|----------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Heemstw. . . . . | 4 ——— |
|------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Zoethout . . . . . | 4 ——— |
|--------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Venkelzaad . . . . . | 2 ——— |
|----------------------|-------|

Met genoegzamen honig tot een slikbrok, alle uur een  
lepel vol.

*b.*

Bij vermindering der ontsteking.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vlierbloemen . . . . . | 8 oncen. |
|------------------------|----------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Afgetrokken op kokend water . . . . . | 2 kan. |
|---------------------------------------|--------|

Doorgezigt en bijgevoegd:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ammoniakzout . . . . . | 2 oncen. |
|------------------------|----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Braakwijnsteen . . . . . | 2 drachm. |
|--------------------------|-----------|

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Enkelvoudige honigazijn . . . . . | 2 pond. |
|-----------------------------------|---------|

Alle 2 uur een pint, of n<sup>o</sup>. 26, *b*.

e.

In het oogenblik van verzwakking en in longontstekingen met verminderde levenskracht.

|                   |   |   |   |          |
|-------------------|---|---|---|----------|
| Wolverleibloemen. | . | . | . | 1 ounce. |
| Baldriaanwortel   | . | . | . | 1 —      |
| Heemst w.         | . | . | . | 1 —      |

Afgekookt met  $1\frac{1}{2}$  flesch water, doorgezijgd, en bijgevoegd.

Zwavel - aether, (*aether sulph. alcohol.*) 1 ounce.

Wijn . . . . .  $\frac{1}{2}$  flesch.

In drie maal des daags in te geven.

f.

|                                                              |   |   |   |             |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|
| Zoethout-drop                                                | . | . | . | 2 drachma.  |
| Venkelwater.                                                 | . | . | . | 3 oncen.    |
| Pijnstillende geest van ammoniak. ( <i>liq. anod. amm.</i> ) | . | . | . | 1 —         |
| Opium - tinctur.                                             | . | . | . | 1 schrupel. |

In eens als boven.

g.

Bij vermindering der ontsteking en wanneer de ziekte op het punt is in verzwakking over te gaan.

|          |   |   |   |                       |
|----------|---|---|---|-----------------------|
| Salpeter | . | . | . | $1\frac{1}{2}$ oncen. |
| Kamfer   | . | . | . | 2 drachma.            |
| Honig    | . | . | . | 1 ons.                |
| Zoethout | . | . | . | 1 —                   |

In 4 keeren, alle 3 uren, als de ontsteking genoegzaam verdwenen is.

Na



22 Na het ophouden der ontsteking.

a.

|                                            |   |   |   |            |
|--------------------------------------------|---|---|---|------------|
| Zoete kwik.                                | . | . | . | 2 drachma. |
| Braakwijnsteen                             | . | . | . | 2 ———      |
| Kamfer (*)                                 | . | . | . | 4 ———      |
| Heemst-wortel                              | . | . | . | 2 oncen.   |
| Verdikt vlierfap, ( <i>rob. sambuci.</i> ) | . | . | . | 1 pond.    |

Alle twee uur het  $\frac{1}{3}$  deel met een pint afkookfel van lijnzaadmeel.

b.

## Versterkend middel.

|                                            |   |   |   |                     |
|--------------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Kalmus - wortel                            | . | . | . | 2 oncen.            |
| Roode gentiaan - w.                        | . | . | . | 2 ———               |
| Wilgen - bast, ( <i>cort. sal. laur.</i> ) | . | . | . | 4 ———               |
| Duivelsdrek.                               | . | . | . | 1 $\frac{1}{2}$ ——— |
| Aftekfel van alfem                         | . | . | . | 1 ———               |

Met genoegzamen honig tot pillen gemaakt ten getale van 12, van welke men viermaal daags één in  $\frac{1}{2}$  pint water oplost, en met bijvoeging van een  $\frac{1}{4}$  pint wijn ingeeft.

Wan-

---

(\*) Om de kamfer op te lossen en op dat dezelve bij de oplossing, door het bijvoegen van meer vocht niet wederom afgescheiden worde, dient het volgende in acht genomen te worden. Men wrijve de kamfer met eenige droppels verzoete salpetergeest, (*spir. nitri dulcis*) waarna men dezelve door bijmenging van wijngeest verder kan oplossen: deze oplossing wordt vervolgens met poeder van heemst-wortel of arabische gom gewreven, en bij deze slijmachtige oplossing de overige afkookfels laauw warm, langzaam en bij kleine gedeeltens bijgevoegd; giet men in het becin te veel vocht bij, zoo wordt de kamfer afgescheiden en drijft boven.

c.

Wanneer zich vrees opdoet dat de ziekte in ettering  
zal overgaan.

|                                      |   |   |          |
|--------------------------------------|---|---|----------|
| Rabels water, (n <sup>o</sup> . 45.) | . | . | 4 oncen. |
| Honig                                | . | . | 1 ———    |

Hiervan alle vier uur een derde met een pint  
lijnzaad-afkookfel in te geven.



### Aamborstigheid of dampigheid.

a.

23

Wanneer men dezelve aan verftopping in de longen toefchrijft.

|                          |   |   |         |
|--------------------------|---|---|---------|
| Duivelsdrek.             | . | . | 2 ons.  |
| Baldriaan - w            | . | . | 3 ———   |
| Jeneverbezienfap verdikt | . | . | 1 pond. |

Tot een slikbrok, waarvan men ieder 4 uur 2  
lepels vol ingeeft.

Voorts kan men zich met vrucht van n<sup>o</sup>. 3 en  
22 a, bedienen, terwijl men de drank zeer be-  
perkt, dagelijks 2 kannen kalkwater doet ge-  
bruiken, en het hooi met stroo verwisfeld.

B 4

\*) i.

# XXIV V O O R S C H R I F T E N

\*) b.

Borstmiddel in langdurige longgebreken.

|                                                                       |   |   |   |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|
| Ammoniakgom                                                           | . | . | . | . | $\frac{1}{2}$ drachma. |
| Duivelsirek                                                           | . | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ———      |
| Bloem van zwavel                                                      | . | . | . | . | 1 ———                  |
| Zoethout                                                              | . | . | . | . | 3 ———                  |
| Wolverlei wortel en bloem, ( <i>rad. arnicæ. c. fl.</i> ) <i>arn.</i> |   |   |   |   |                        |
| <i>montana L.</i> )                                                   | . | . | . | . | 2 ———                  |

Genoegzamen honigazijn om het tot een slikbrok te maken, tweemaal daags in eens.



24

Hoest.

|                                          |   |   |   |         |
|------------------------------------------|---|---|---|---------|
| Zuiver ammoniakzout.                     | . | . | . | 1 ons.  |
| Zoethout                                 | . | . | . | 2 ———   |
| Arabishe gom, (of heemstwort. in poeder) | . | . | . | 2 ———   |
| Gemeene honig                            | . | . | . | 1 pond. |

Tot een slikbrok, alle 2 uur 2 lepels vol.

25

|                                             |   |   |   |         |
|---------------------------------------------|---|---|---|---------|
| Venkelzaad, ( <i>pulv. sem. fœniculi.</i> ) | . | . | . | 4 ons.  |
| Gemalen zoethout                            | . | . | . | 8 ———   |
| Gemeene honig                               | . | . | . | 1 pond. |

Als boven.

6. In een uit verzwakking ontstaande vochtige hoest.

|                                                                 |   |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Zevenboom                                                       | . | . | . | 2 ons. |
| Roode gentiaan-wortel                                           | . | . | . | 2 —    |
| Anijszaad                                                       | . | . | . | 4 —    |
| Jeneverbezien, ( <i>bacc. lauri</i> ) <i>laurus nobilis</i> L.) | . | . | . | 3 —    |
| Walſchot, ( <i>sperma ceti</i> .)                               | . | . | . | 2 —    |
| Mijnſtoffelijke moor, (zwarte gezwavelde kwik,)                 |   |   |   |        |
| ( <i>athioſ miner.</i> ) <i>sulphuret. hydrarg. nigr.</i> )     | . | . | . | 2 —    |

Als boven tot een ſlikbrok, hiervan dagelijks 2 oncen in 3 keeren.

\*) 6 Krampachtige drooge hoest.

|              |   |   |   |             |
|--------------|---|---|---|-------------|
| Zoete kwik   | . | . | . | 15 grein.   |
| Goudzwavel.  | . | . | . | 1 ſchrupel. |
| Duivelsdrek. | . | . | . | 1 —         |
| Zeeajuin     | . | . | . | 2 —         |
| Zoethout     | . | . | . | 3 drachma.  |

Genoegzamen honigazijn, in eens tot een pil, twee of driemaal daags.



Keelontſteking en herſenontſteking.

27 Verkoelend middel in ontſtekingen.

|             |   |   |   |        |
|-------------|---|---|---|--------|
| Salpeter    | . | . | . | 1 ons. |
| Wonderzout. | . | . | . | 1 —    |

Met genoegzamen honig tot een ſlikbrok, viermaal daags.

28    Buikzuiverende middelen, (*purgatien.*)

a.

Jalappen, (*rad. jalappæ convolvulus jalappa. L.*) 1 ons.

Zoete kwik. . . . . 1 drachma.

Met genoegzamen honig tot een slikbrok, in eens.

b.

Wonderzout . . . . . 6 oncen,

in twee pond, of eene fles water ontbonden.

Lever-aloë, (*aloë hepatica.*) . . . . . 1 ———

In twee keeren, des avonds en 's morgens.

\*) c.

Lever-aloë . . . . .  $\frac{1}{2}$  ons.

Jalappen . . . . . 3 drachma.

Zoete kwik. . . . . 1 drachma.

Witte zeep om ze tot een pil te maken, in eens.

Men bedient zich van dit middel bijzonder tegen wormen.

## 29

## Kolder.

Nachtschade, (*belladonna atropa bellad. L.*) 8 oncen.

Zeyenboom . . . . . 4 ———

Braakwijnsteen . . . . . 1 ———

Met genoegzamen honig tot 12 pillen gemaakt, waar-  
van men er dagelijks 4 inneest.

Keel-



Keelziekte.

30

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Heemstwortel of lijnzaa-meel.                      | 8 oncen. |
| in 4 kan water gekookt, doorgezijgd en bijgevoegd: |          |
| Salpeter.                                          | 2 ———    |
| Ammoniakzout.                                      | 1 ———    |
| Gemeene honig                                      | 1 pond.  |
| Alle 2 uur één pint.                               |          |

31

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Vlierbloem-aftreksel, op twee kan water. | 8 oncen. |
| Geest van minderer                       | 8 ———    |
| Conserf van vlier                        | 8 ———    |
| Gemeene honig                            | 8 ———    |
| Alle 2 uur één pint.                     |          |

Inwrijving uitwendig.

32

a

|                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Spaansche vliegen, ( <i>puly. cantharidum</i> ) meloë.                                                                      |        |
| <i>vesic. L.</i> )                                                                                                          | 1 ons. |
| Gekookt in lijnolie                                                                                                         | 8 ———  |
| Vloeibare geest van ammoniak, (vloeibare koolzure ammoniak, ( <i>spir. sal. ammon.</i> ) <i>carbonas ammoniac liquid.</i> ) | 4 ———  |

Tot

b.

Tot inspuiting in de keel.

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Zwart bilfenkruid, ( <i>h. hyoscyami nigr.</i> )               | 4 oncen.  |
| Kaasjes - kruid, ( <i>malva</i> ,) <i>m. sylv. rot. fol.</i> ) | 4 ———     |
| vier uur in 4 fleschen water gekookt, doorgezijgd,             |           |
| Enkelvoudige honigazijn . . . . .                              | 2 ponden. |

33

Buikwee, (*kolijk.*)

Windkolijk, a.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Pitter bier . . . . .         | 1 pint.    |
| Wonderzout. . . . .           | 6 oncen.   |
| Is hevige krampen bijgevoegd: |            |
| Opium of diivelsdrek. . . . . | 2 drachma. |
| Alle 2 uur in eens.           |            |

b.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Jeneverbezien . . . . .                  | 8 oncen. |
| Roode gentiaan, kalmus of baldriaan - w. | 8 ———    |
| Gordzwavel. . . . .                      | 1 ———    |
| Anijszaad . . . . .                      | 4 ———    |
| Keukenzout . . . . .                     | 4 ———    |

Tot een poeder, waarvan men viermaal daags een  
groote lepelvol geeft.

Kal-

34

a.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kalmus - w.         | 4 oncen. |
| Roode gentiaan - w. | 4 ———    |
| Mosterdzaad.        | 4 ———    |

Tot een poeder, waarvan men een lepelvol op ieder haver voeder geeft.

b.

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Zedoar-wort. ( <i>rad. zedoar.</i> )    | 3 drachma.        |
| Venkelzaad .                            | 3 ———             |
| Peterfeliezaad, ( <i>sem. petros.</i> ) | $\frac{1}{2}$ ——— |
| Zuivere opium .                         | $\frac{1}{2}$ ——— |

Tot een poeder in eens.

Krampkolijk, a.

35

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Duivelsdrek .                                                                     | 1 drachma.        |
| Arabifche gom of heemst-wortel .                                                  | 1 ons.            |
| Putwater, $\frac{1}{2}$ pint of .                                                 | 1 pond.           |
| Boomolie, ( <i>ol. olivarum.</i> ) .                                              | 8 oncen.          |
| Magnesia, koolzure bitter - aarde, ( <i>magnesia alba carbonas magnesiae.</i> ) . | $\frac{1}{2}$ ——— |

In eens.

b.

Krampachtig kolijk, vooral door wormen veroorzaakt.

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Geest van hartshoorn, ( <i>spir. cornu cervi,</i> ) <i>carbonas pijro-animale liquidum.</i> ) . | 1 drachma.        |
| Zwavel æther, .                                                                                 | $\frac{1}{2}$ ——— |
| Boomolie .                                                                                      | 3 ———             |

in eene flesch vlierbloemen - aftreksel, in eens.

# XXX VOORSCHRIFTEN

c.

Tegen de wormen gebruikt men met gevolg:

|                                              |   |   |   |          |
|----------------------------------------------|---|---|---|----------|
| Gentiaan wortel.                             | : | . | . | 4 oncen. |
| Rijnvaren - kruid ( <i>h. tanacet.</i> )     | . | . | . | 4 ———    |
| Driemaal daags een lepelvol over het voeder. |   |   |   |          |

Voorts: 3 oncen glimmend schoorsteenroet in een pint melk gekookt.

De toppen en knoppen van denne-boomen.

De brandige hoornolie, (*oleum empyreumaticum animale.*)  
van 2 tot 3 oncen daags ingegeven.

Voorts het buikzuiverend middel n<sup>o</sup>. 28. \*) c.

36

Kolijk uit zuren.

|                                                   |   |   |   |        |
|---------------------------------------------------|---|---|---|--------|
| Wijnsteenroom                                     | . | . | . | 1 ons. |
| Zuivere salpeter                                  | . | . | . | 1 ———  |
| Bereide oesterfchelpen, ( <i>conchæ prepar.</i> ) | . | . | . | 1 ———  |

Hiervan geeft men iedere 2 uur, 2 le pels vol met een aftrekfel van kamillen - bl. en bijsenkruid.

37

|                                          |   |   |   |          |
|------------------------------------------|---|---|---|----------|
| Gemalen lijnzaad                         | . | . | . | 3 oncen. |
| Kamillen - aftrekfel                     | . | . | . | 6 pint,  |
| tot op de helft verkookt, en bijgevoegd: |   |   |   |          |
| Lijnolie                                 | . | . | . | 1 ———    |

En in hevige krampen bijgevoegd op ieder half pint:

|                                                                                      |   |   |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|
| Opium tinctur, ( <i>vinum opii aromaticum, (laudanum</i><br><i>liq. sydenhami)</i> ) | . | . | . | 1 drachm. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|

Men geve hiervan inwendig  $\frac{1}{2}$  pint, eerst ieder uur, daarna om de 2 of 3 uur; terwijl men hetzelfde als lavement, eerst ieder vierendeel uurs, daarna alle half uur bezigt.

K o-

38

Koliik door verkouding.

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Duivelsdrek, ontbonden                                              | 1 drachma. |
| Geest van kamfer, ( <i>spir. camphor.</i> )                         | 2 ———      |
| Terebinthijn olie, ( <i>ol. terebinth.</i> ) <i>pinus larix. L.</i> | 2 ———      |
| Geest van minderer                                                  | 1 ons.     |

In een half pint warme wijn, in eens ingegeven.

NOTA, Men wachte zich echter om zoo lang de verstopping duurt, opium in te geven.

De middelen n<sup>o</sup> 8. 33. b. en 34 a. worden na het ophouden van het koliik gegeven om de ingewanden weder te versterken.



39

Lavementen, vooral in kolijken.

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Kamillen-bloemen, ( <i>flor. chamam.</i> ) <i>matricaria</i> |            |
| <i>chamomilla L.</i>                                         | 2 ons.     |
| Heemstwortel.                                                | 2 ———      |
| Kaasjeskruid,                                                | 1 handvol. |
| $\frac{1}{2}$ uur in 3 pond water gekookt en bijgevoegd,     |            |
| Lijnolie, ( <i>ol. lini.</i> )                               | 1 pond.    |

b.

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabak, 2 handvol in $\frac{1}{2}$ kan water gekookt, en daarbij gevoegd: |          |
| Lijnolie                                                                 | 3 oncen. |

d. In den loop.

Lijnzaadwater.

Lijnolie.

Van ieder evenveel, waarbij men, indien de krampen sterk zijn, 2 drachma duivelsdrek voegt.

Zwart



6.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Zwart bilfenkruid, . . . . .                                     | 1 ounce.   |
| In 2 pond kokend water afgetrokken, doorgezijgd<br>en bingevogd: |            |
| Opium . . . . .                                                  | 2 drachma. |

*f.* In opstopping van water.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kamillen - aftreksel . . . . . | 1 pint.           |
| Wonderzout . . . . .           | 2 oncen.          |
| Duivelsdrek . . . . .          | $\frac{1}{2}$ ——— |
| Laauwarm alle 4 uur.           |                   |

*g.* In zenuwkoortfen.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Duivelsdrek . . . . . | $\frac{1}{2}$ ons. |
| Lijnolie . . . . .    | 4 ———              |
| Tabakswater . . . . . | 2 pond.            |



40

## De loop.

Uit gebrekkige afzondering, verkoudheid,  
of opgehoopte vuiligheid in de darmen.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wijnsteenroom . . . . . | 6 ons. |
| Wonderzout . . . . .    | 6 ———  |
| Rabarber . . . . .      | 1 ———  |

Met honig, meel of wortelsap tot een sliksbrok.

Uit

41 Uit zuren en toevallig (symptomatisch) ontstaanden loop.

Tormentilwortel, (*rad. tormentillæ erectæ L.*) 4 oncen.

Zoutzuur bitterzout, (*urias magnesicæ*) 1 —

Waarbij men indien dezelve galachtig is, voegt:

Rabarber 1 ons.

Tot een poeder, waarvan men alle 4 uur 2 lepels vol met lijnzaad - afkookfel ingeeft.

42 Uit koude.

Tormentil - wortel . . . . . 2 oncen.

Oranjeschillen, (*cort. aurantiorum.*) . . . . . 2 —

Met 2 fleschen water tot op de helft verkookt.

Rabarber. 1 —

Met een flesch roode wijn, 's morgens en 's avonds een half pint.

Toevallig en in zachte afgangen.

43

Ijslandfche mos, (*lichen island.*) . . . . . 4 oncen.

Paarden - kastanje - bast. . . . . 2 —

Gekookt in 8 pond bronwater tot een lijnachtig vocht.

Rabarber tot poeder . . . . .  $\frac{1}{2}$  ons.

Alle 4 uur een pint.

44

a.

Opium . . . . .  $\frac{1}{2}$  once.

Ipecacuanha, (*psychotria emetica L.*) . . . . . 1 drachma.

Oranjeschillen . . . . . 4 oncen.

Arabifche gom of heemst - w. . . . . 2 —

Alle 4 uur het vierendeel met rooden wijn.

C

In

# XXXIV VOORSCHRIFTEN

b.

In langdurigen loop.

|                          |   |   |   |          |
|--------------------------|---|---|---|----------|
| Gentiaan-wortel          | . | . | . | 2 oncen. |
| Knoflook, fijn gefneeden | . | . | . | 8 —      |

Te zamen vermengd en 3 maal daags twee lepels vol over het voeder.

45

In zenuwkoortfigen loop.


|                                             |   |   |   |            |
|---------------------------------------------|---|---|---|------------|
| Baldriaan - w.                              | . | . | . | 4 oncen.   |
| Kamfer                                      | . | . | . | 2 drachma. |
| Wolverlei-bloemen, ( <i>flor. arnica.</i> ) | . | . | . | 2 oncen.   |

Het eerste en derde in een kan water tot de helft verkookt.

|                                  |   |   |   |            |
|----------------------------------|---|---|---|------------|
| Vlocibare geest van ammoniakzout | . | . | . | 1 drachma. |
| Roode wijn                       | . | . | . | 1 flesch.  |

In twee reizen ingegeven.

NOTA. Na het ophouden der loop geve men no. 8. 33. 7. of 34. a.



Gebrekkige spijsverteering en verlorene eetlust.

c.

|                     |   |   |   |       |
|---------------------|---|---|---|-------|
| Rabarber,           | . | . | . | 1 ons |
| Roode gentiaan - w. | . | . | . | 7 —   |
| Oranjeschillen      | . | . | . | 8 —   |
| Ijzervijfel         | . | . | . | 2 —   |

Ontstaat dat toeval uit zuren, zoo voege men daarbij,  
Zoutzuur bitterzout . . . . . 1 1/2 —

Op ieder voeder één lepel vol.

Kal-

b.

|                                                          |   |   |   |                    |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| Kalmus - w.                                              | . | . | . | 1 drachma.         |
| Paarden kastanje - schors, ( <i>cort. hippocastani</i> ) | . | . | . | 1 ———              |
| Mosterdzaad                                              | . | . | . | 1 ———              |
| Keukenzout                                               | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ons. |

Op het voeder als boven.

c.

|             |   |   |   |                   |
|-------------|---|---|---|-------------------|
| Mosterdzaad | . | . | . | 1 ons.            |
| Keukenzout  | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ——— |

Op het voeder als boven.



# Opstopping van water.

d.

|                         |   |   |   |                    |
|-------------------------|---|---|---|--------------------|
| Gestoten peterfeliezaad | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ons. |
| Salpeter                | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ———  |
| Kamfer of duivelsdrek   | . | . | . | 1 drachma.         |

Alle uur met een pint warm kamillenaftreksel.

e.

|                                                                                                              |   |   |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|
| Baldriaan                                                                                                    | . | . | . | 1 ons.            |
| Venetiaansche terebinthijn, ( <i>terebinth. venet.</i> )                                                     | . | . | . | $\frac{1}{2}$ ——— |
| Jeneverbezienmoes, zoo veel als genoegzaam is om zulks tot één slijbrok te maken, welke men in eens ingeeft. |   |   |   |                   |
| Voorts het lavement n. 39, f.                                                                                |   |   |   |                   |



48      Vervangenheid of rheumatismus.

\*) a.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Geest van kamfer . . .     | 2 oncen.   |
| Geest van hartshoorn . . . | 1 drachma. |
| Met een flesch warm bier.  |            |

b.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Angelika - w. . . . | 2 drachma.          |
| Gentiaan - w. . . . | 2 —————             |
| Ammoniakgom . . . . | $\frac{x}{2}$ ————— |
| Pokhoutgom . . . .  | $\frac{x}{2}$ ————— |
| Goudzwavel . . . .  | 10 grein.           |

Tot een poeder, in eens.

Voorts geeft men, indien dezelve ontstekingsachtig is, (*rheum. activus, s. sthenicus*) n<sup>o</sup>. 27, met lijenzaadwater.

In den verplaatsten droes (*rh. passivus. s. asthenicus*) n<sup>o</sup>. 2, 9 en 10. In jigt, n<sup>o</sup>. 10.



49      De klem.

a.

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vast loogzout . . . . | 1 schrupel |
| Opium . . . .         | 2 —————    |

Met honig - water, alle uur inwendig of in lavementen.

Dui-



b.

|             |   |   |   |            |
|-------------|---|---|---|------------|
| Duiveldrek. | . | . | . | 1 drachma. |
| Kamfer      | . | . | . | 1 ———      |
| Opium       | . | . | . | 1 ———      |

Alle acht uur met een pint water.

*Uitwendig. c*

|                                                                          |   |   |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|
| Kamfer gewreven                                                          | . | . | . | 2 drachma. |
| en intruschen bijgedaan.                                                 |   |   |   |            |
| Lijnolie                                                                 | . | . | . | 4 ons.     |
| Wijngestige zwavel-aether, ( <i>aether sulph. alco-</i><br><i>hol.</i> ) | . | . | . | 1 —        |

Hiermede de kaken gewreven.



Dolle hondsbeet.

Guichelheil, (*herb. anagallis*,) 2 oncen, in 8 oncen kookend water, in een digte pot afgetrokken, doorgezeijgd en bijgedaan:

Poeder van guichelheil . . . . . 4 drachma.  
Vloeibaar vlug bijtend loogzout, (vloeibare ammoniak,) *spir. sal. amm. caustic.*) *amm. liq.*)  $\frac{1}{2}$  schrupel.

Gedurende 14 dagen geeft men deze hoeveelheid iedere 12 uur.

~~~~~

Koortfen.

51 In ontsteking en wondkoortfen.

a.

Verkoelend middel.

Salpeter	1 ons.
Wijfteenroom	1 ———
Glauber of wonderzout	1 ———
Gekookt water	2 pond.
Driemaal daags $\frac{1}{2}$ pint.	

b.

In eenvoudige uit verzwakte levenskracht
ontstaande koortfen.

Wilgenbast	4 oncen. ¹
Mosterdzaad.	4 ———
Op ieder voeder een lepelvol.	

52

a.

Wilgenbast	6 oncen.
Roode pentiaan - w.	4 ———
In 4 poeders, op ieder voeder een.	

Wid.

b.

Wilgenbast	3 oncen.
Kalmus - w.	2 ———
Nagelkruid-w. (<i>r. caryophyllat.</i>) <i>geum. urban. L.</i> 3) ———	

Met genoegzamen honig tot een slikbrok.

53

Rotkoortfen.

a.

Baldriaan of angelika - wortel	4 oncen.
Roode gentiaan - w.	4 ———
Wilgenbast.	8 ———

De eene 2 uur een groote lepelvol in $\frac{1}{2}$ pint lijn-
zaad - afkookfel.

b.

Zamengedrongen zeezoutz. (*spir. salis marini concentr.*)

(*acid. muriat. conc.*) 1 ons.

Overgehaalde wijngeest, (*alcohol vini*) of } 3 —
Wijngeestige zwavelather, (*ather sulph. alcoh.*) }

De andere 2 uur een lepelvol, in een pint lijnzaad-
afkookfel.

54

Rabels - water.

a.

Vitrioololie, (*ol. vitrioli*,) zamengedrongen zwa-

velzuur, (*acidum sulphuric. concentr.*) 1 ons.

Overgel. aalden wijngeest, (*spir. vini rectific. subt.*) 3 —

Alle 2 uur een lepel vol met lijnzaad - water.

C 4

Zout-

XL VOORSCHRIFTEN

Zoutgeest, (<i>acid. muriat.</i>)	.	.	1 drachma.
Overgehaalde wijngeest	.	.	3 —
Regenwater	.	.	1 pint.
Honig	.	.	4 ons.
Alle 2 uur in eens.			

55 Kwaadaardige rotkoortsen of koortsen met borstkramp, (het zoogenaamde longenvuur.)

Arabische gom, fijngestoten	.	.	1 ons.
ontbonden in			
Bronwater	.	.	12 —
Heemstwortel - afkookfel	.	.	1 pond.
Rabelswater.	.	.	$\frac{1}{2}$ ons.
Alle 4 uur in eens.			

Kamfer, ontbonden	.	.	2 drachma.
Gemeene honig	.	.	1 ons.
Baldriaan - w. fijn gestoten	.	.	2 —
In 4 pillen, waarvan men ieder 2 uur één inneest.			

57 Uitwendig tegen den tongkanker en de sponsachtige gezwellen in den mond.

Zamengedrongen zeezoutzuur	.	.	2 drachma.
Gemeene honig	.	.	1 ons.
Met een penceel opgestreken.			

58

a.

Paarden - kastanje - bast ,	.	.	4 oncen met
Putwater	2 pond.
tot op de helft verkookt.			
Geest van minderer	2 oncen..
Gemeene honig	4 —
Alle 4 uur.			

b.

Geschraapte St. Ignatius boonen , (<i>rasura fabarum</i>			
<i>S. ignatii.</i>)	$\frac{1}{2}$ ons.
Putwater	4 pond.
gedurende een uur in eene geslotene pot ge-			
kookt , en bijgedaan :			
Honig	1 —
Alle 4 uur het vierendeel.			

59

Zenuwkoortsen.

Opium, (<i>opium thebaicum purum.</i>)	$\frac{1}{2}$ ons.
Braakwijnsteen	2 drachma.
Roode wijn	2 fleschen
Alle 4 uur het vierendeel.			

60

Baldriaan	2 oncen.
een vierendeel uur gekookt in :			
Putwater	1 pond.
Wijngceestigen zwavel - æther	$\frac{1}{2}$ ons.
Geest van minderer	2 oncen.
Honig	4 —
Alle 4 uur in eens.			

C 5

Kam.

61

n.

Kamfer	1 ons.
Baldriaan - w.	6 —
Mosterdzaad, (<i>sem. sinap.</i>)	8 —
Kaskaril, (<i>cort. cascarilla.</i>) of orange - schillen, (<i>cort. aurantiorum.</i>)	8 —

Met honig tot 16 pillen gemaakt, waarvan men
iedere 2 uur ééne ingeeft.

v.

Wilgenbast	3 dragma.
Angelika-wortel, (<i>rad. angelica.</i>)	3 —
Kalvus - w.	3 —

Met genoegzamen honig tot een slixbrok, in eens.

62

Fijn staalvijsfel	2 ons.
Meekrap - w. (<i>rad. rub. tinct.</i>)	6 —
Roode gentiaan	4 —

Tot poeder, twee lepels vol op ieder voeder,
of van no. 8, wanneer de ziekte voorbij is.

63

In de hoofdzwellings, (*mal d' espagne.*)

Baldriaan	2 ons.
Wilgenbast	2 —
IJslandsche mos	1 —
met water, 2 pond, tot op de helft verkookt	
Vinriool napiwa, (<i>snaphia vitrioli</i>) of zwavelæther (<i>æther sulphur.</i>)	2 drachma.
Overgehaalde wijngeest	1 once.

Alle 2 uur in eens.

Ei-

64

Eiken- of paardenkastanje - bast	.	2 ons.
Pepermunt - kr. (<i>mentha peperita.</i>)	.	$\frac{1}{2}$ once.
_ tot op de helft verkookt met en doorgegoten in		
Water	.	2 pond
Geest van minderer	.	2 oncen,
Overgehaalde wijngeest	.	1 —
Alle 2 uur, in eens.		

65

Uitwendig.

Zuiver ammoniakzout	.	1 ons.
ontbonden in		
Wijnazijn	.	8 —
Geest van kamfer	.	2 —

66

I d e m.

Extract van lood, (vloeibaar azijnzuur lood, <i>extr.</i>		
<i>saturni) acetis plumbi liquida.)</i>	.	1 ons.
Ontbonden in overgehaald water	.	1 pond.
Geest van kamfer	.	2 oncen.

67 Boosaardige zenuwachtige flijmkoorts.

..

Wilgenbast	.	$\frac{1}{2}$ ons.
Kalmus - w.	.	$\frac{1}{2}$ —
Braakwijnsteen	.	10 grein
Kamfer	.	$\frac{1}{2}$ drachma.
Jeneverbezienmoes	.	2 oncen.

Alle twee uur eene zoodanige pil.

Tot

XLIV V O O R S C H R I F T E N

Tot nakuur.

b.

Fijn staalvijsfel	2 ons.
Venetiaansche terebinthijn	1 —
Wilgenbast	6 —
Meekrap	6 —

Met Jeneverbezienmoes tot pillen gemaakt, alle dagen 3 pillen.

68

Galkoortfen.

Pokhout - gom, (<i>gumm. guajac.</i>)	1 drachma.
Galgant - w. (<i>rad. galangæ</i>)	2 —
Rabarber	1 —
Ijzervijsfel	1 schrupel.

Tot poeder, in eens.



Huidziekten.

69

Schurft.

a.

Bloem van zwavel	2 ons.
Spiesgians	2 —
Salpeter	1 1/2 —

Met meelbrij of honig tot een sliktbrok, waarvan men tweemaal daags een lepel vol ingeeft; dit middel is bijzonder heilzaam in de drooge schurft.

Je.

b.

Jeneverbezien	.	.	.	2 ons.
Roode gentiaan - w.	.	.	.	2 —
Baldriaan - w.	.	.	.	2 —
Zevenboom	.	.	.	1 —
Karwijzaad (<i>sem. carvi.</i>) <i>carum carvi L.</i>	.	.	.	2 —
Spiesglans	.	.	.	1 —

Tot een poeder als boven, over het voeder.

Uitwendig wasfche men het geheele paard met zeep-
water of houtaschloog; de ontstokene plaatfen met aluin,
tabaks- en kalkwater.

c.) c.

Zwavelbloem	.	.	.	3 drachma.
Heemstwortel	.	.	.	3 —

Met genoegzamen honig tot een flikbrok, in eens.

d.

Wilgenbast-w.	.	.	.	2 drachma.
Kaskaril	.	.	.	2 —
Pokhoutgom,	.	.	.	1 —
Goudzwavel	.	.	.	24 grein.
Ijzervijlfel	.	.	.	20 —
Zoete kwik.	.	.	.	10 —

Tot een poeder, in eens.

XLVI V O O R S C H R I F T E N

In hardnekkige verouderde fchurft.

*) e.

Bloem van zwavel	2 drachma.
Zoete kwik.	15 grein.
Zevenboom	1 drachma.
Zoethout	2 ———

Met genoegzamen honig tot een slikbrok, in eens.

Verfterkend middel voor herftellende.

*) f.

IJzervijfel	1 drachma
Roode gentiaan-w.	1 ———
Wilgenbast	$\frac{1}{2}$ ———
Ieneverberien	$\frac{1}{2}$ ———

Met genoegzamen honig of meelbrij, tot een slikbrok, in eens.

Uitwendig middel.

g.

Witte neergeplofte kwik	1 drachma.
Reuzel	1 once.

Men beftrijkt hiermede de aangedane plaatfen, 2 maal daags.

Mok,

70 Mok, ezelsvoet, rotstraal, enz.

c.

Spiesglans	1 pond.
Wijnsteenroom	.	.	.	6 ons.
Wonderzout	.	.	.	6 —

Met meel tot een slikbrok, daags een lepelvol.

Bijtend water, (*aqua phagadenica*.)

b.

Opgehevene bijtende kwik	.	.	24 grein.
Ammoniak - zout	.	.	24 —
Overgehaald water	.	.	1 pond.

Hiermede uitwendig gewasfchen, alsmede met lood-
azijn, kalkwater.



HEEL-

H E E L M I D D E L E N

I N

U I T W E N D I G E T O E V A L L E N.



Wonden.

71 Verdeelenden omflag in kwerffingen, en om den omtrek, der met kneuzing verzelde wonden te wasfchen.

Ammoniakzout	.	.	.	8 oncen.
Salpeter	.	.	.	2 —
Wonderzout	.	.	.	2 —
Wijnazijn	.	.	.	1 pond.
Zuiver water	.	.	.	3 —

N o t a. Wanneer men dit middel fterk wil doen werken, zoo moet men de falpeter en het wonderzout in het vocht oploffen, en het ammoniakzout, op de kompresfen ftrooijen.

72 Wondwater om laauwwarm mede te wasfchen.

Osterlucie- of holwortel-kruid, (*r. aristol. rot.*) 1 once.
 $\frac{1}{2}$ uur gekookt in water . . . 2 pond.
 doorgegoten en bijgedaan

Wijn	.	.	.	4 oncen.
Zuiker	.	.	.	2 oncen.
Geest van vitriool	.	.	.	2 drachma.

Bloed-

73

Bloedstillend middel.

Aluin	1 ons.
Blaauwe vitriool, (zwavelzuur koper,) <i>sulph. cupri.</i>	1 —
Zuiker	$\frac{1}{2}$ —
Opgelost in bronwater.	1 pond.
Vitriool - olie,	2 drachma.

74 Pijnstillend middel in sterke ontstekingen.

Zwart bilfenkruid, (*herb. hyosc. nigri*)

Vlierbloemen.

Osterlucie.

van ieder 1 handvol, gekookt $\frac{1}{2}$ uur in

Putwater 1 pint.

en voorts uitgeperst.

Om de wonden en derzelver omtrek laauwarm
mede te wasschen.

75

Etterbevorderende middelen.

a.

Lijnolie, (<i>ol. lini.</i>)	.	.	.	4 oncen.
Terebinthijn - olie, (<i>ol. tereb.</i>)	.	.	.	$1\frac{1}{2}$ —

b.

Omflag.

Gestoren lijnzaad, in een pint melk gekookt, tot eenen
warpjen omflag.

76

a.

Basilicum - zalf, (*ung. basil.*)

b.

Basilicum - zalf.	3 oncen.
Roode neergeploste kwik, (gesalpeterzuurd kwik- verzwaarfel, (<i>merc. præcip. rubr. (oxydum hydrar- gyri nitratum)</i>)	1 —

77

Ettermakende zalf.

Venetiaanschen terebinthijn	1 ons.
Gemeene honig	2 —

78

Omflag.

Rosemarijn

Salij, (*salvia.*)

Druizendblad, (*achillea millefolium L.*)

van ieder een handvol.

Gekookt in één pint water, en warm ongeslagen.

79 Zalf om de wondranden te verzachten.

Boonolie	1 pond.
Loodwit, (<i>cerussa</i>) oxyd. plumb. carb.)	4 oncen.
Walfischot, (<i>sperma ceti</i>)	3 —

Dit te zamen gekookt, en met dunne wicken op de
wond gelegd, om het aankleven der wicken op de-
zelve te verhinderen.

Zui-

80 Zuiverende wondzalf.

Spaanschgroen, (azijnzuur koper, (<i>virid. aris</i>) <i>acetis cupri</i> ,)	.	.	.	I ons.
Wierook en mastik	.	.	.	I —
Heemstbalfem, (<i>bals. alth.</i>)	.	.	.	I $\frac{1}{2}$ —
Terebinthijn - olie	.	.	.	I $\frac{1}{2}$ —

81 Tegen de wormen in de wonden

a.

Wijnruit	.	.	.	I handvol.
Een uur gekookt in houtaschloog doorgegoten en bijgedaan,	.	.	.	I pint.
Wijnazijn	.	.	.	$\frac{1}{2}$ pint.
Zout	.	.	.	$\frac{1}{2}$ ons.

b.

Terebinthijn - olie	.	.	.	I ons.
Brandewijn	.	.	.	2 —

82 Bijtend wondwater.

a.

Gebrande aluin, (<i>alum. ustum.</i>)	.	.	.	I ons.
Spaansch groen.	.	.	.	I —
Honig	.	.	.	2 —
Wijn	.	.	.	$\frac{1}{2}$ pint.
	D 3			Zuig

LII VOORSCHRIFTEN

aa.

Zuiverend middel in verouderde wonden.

Osterlucie			
Rosemarijn			
Elzenbladeren, van ieder een handvol.			
Wilgenbast	.	.	2 oncen.
Gekookt $\frac{1}{2}$ uur in putwater	.	.	1 $\frac{1}{2}$ pint.
doorgegoten en bijgevoegd :			
Aloë - tinktuur	.	.	2 oncen.

b.

In vuile flecht etterende wonden en verzweringsen, met verzwakte levenkracht.

Osterlucie	.	.	1 ons.
Alcë - tinktuur	.	.	1 —
Duivelsdrek	.	.	1 —

83 Balfemachtig etterbevorderend middel.

Venetiaansch terebinthijn	.	.	2 oncen.
Peruviaansch balfem	.	.	4 drachma.
Honig, in een steene mortier gemengd	.	.	2 oncen.
Zuiver kalkwater, (<i>aqua calcis vive</i>)	.	.	$\frac{1}{2}$ pond.

84 Omflagen in kneuzingen.

a.

Gedroogde potaarde	.	.	2 pond.
Ammoniakzout	.	.	1 ons.

Met osterlucie-aftrekfel, azijn of loodextrakt, tot een dunne breij.

Am-

VAN HEELMIDDELEN. III

b.

Ammoniakzout	.	.	.	1 ons.
Wijnazijn	.	.	.	$\frac{1}{2}$ pint.

Met potaarde tot een omslag, waarbij men in koude gezwollen voegt:

Geest van kamfer	.	.	.	2 oncen.
------------------	---	---	---	----------

c.

Groene zeep	.	.	.	2 oncen.
Ammoniakzout	.	.	.	1 ———
Brandewijn	.	.	.	4 ———

d.

Uitwendige levensbalfem, (<i>bals. vit. extern.</i>)	.	.	.	2 oncen.
In putwater	.	.	.	1 pint.

e.

Putwater, warm gemaakt	.	.	.	1 pint.
Geest van kamfer	.	.	.	1 ons.
Extrakt van lood	.	.	.	2 drachma.
Ammoniakzout	.	.	.	1 ons.

Met potaarde tot eenen omslag,

f.

Zuiver ammoniakzout.	.	.	.	3 oncen.
Gezuiverde salpeter	.	.	.	2 ———
Wonderzout.	.	.	.	2 ———
Wijnazijn	.	.	.	1 kan.
Putwater	.	.	.	3 ———

n 3

Bal.

LIV V O O R S C H R I F T E N

A.

Balsam in kneuzingen.

Kamfer.

Ammoniakzout.

Duivelsdrek, van ieder even veel.

Met genoegzame witte zeep tot eenen balsam.



85 Middelen tegen zadelkwetsingen.

Groene elzenbladeren	1 handvol.
Een half uur gekookt in azijn.	1 pint.
Ammoniakzout	2 oncen.

Hierin lappen gedoopt en warm opgelegd.

86 Inwrijving wanneer de verdeeling mislukt.

Renzel	1 ons.
Spaansehe vliegen, (<i>pulv. canth.</i>)	1 drachme.
Euphorbium-gom	$\frac{1}{2}$ ———

Eens hiermede inwrijven.

Tegen de brandvlekken.

87

Boom- of lijnolie	1 ons.
Lood-extrakt	$\frac{1}{2}$ ———
Wijnazijn	$\frac{1}{2}$ ———

Tweemaal daags hiermede inwrijven.

88 Omflagen bij verminderde ontsteking.

Majolijn

Rosemarijn

Lavendel

Kalmus - wortel, van ieder $\frac{1}{2}$ ons, gekookt $\frac{1}{2}$ uur in

Wijn 1 flesch.

89 Idem bij geopende zadelwonden.

Wijnazijn $\frac{1}{2}$ flesch.

Jenever $\frac{1}{2}$ —

Bronwater 1 —

Aluin $\frac{1}{2}$ ons.

Vitriool - olie 2 drachm.

Hierin de compresen nat gemaakt.

Voorts gebruikt men om de ettering te bevorderen no. 75 en 79.

90 Indien de nekband aangetaast is.

Geest van inijrrhe 1 ons.

Opgelost in kalkwater $\frac{1}{2}$ flesch.

91 Om bijna geflotene wonden verder te genezen en op te drogen.

Zinkbloemen, (*flores zinci oxydum zinci*) 1 ons.

Reuzel 4 —

- 92 Tegen wild vleesch, valsche ontstekingen en verzweringen met vuilen etter.

Helsche steen, (gesmolte salpeter-zuur zilver, (*lapis infernalis*,) *nitras argenti fusum*,) 1 drachma.
 Ontbonden in gedistilleerd water . 4 oncen.

- 93 Middel tegen fistels.

Teer, gesmolten . . . 2 ponden.
 bijgevoegd:
 Terebinthijn . . . 6 oncen.
 Honig . . . 6 ———
 vervolgens van het vuur nemende, en nog laauw warm zijnde, voege men er bij:
 Spaansch groen . . . 1 ons.

- 94 Genezenden wondsteen in wonden, kwetsingen en zadeldrukken

Aluin . . . 3 oncen.
 Witte vitriool, (zwavelzure zink,) *vitriolum album*,) *sulphas zinci*,) . 3 ———
 Armenischen bolus, (*bol. armen.*) . 2 ———
 Ammoniakzout . . . 1 ———
 Spaansch groen . . . 1 ———
 Zilverglid, (*lythargyrium*) *oxydum plumbi semivitreum*,) . 1 ———

Tot poeder gestoten en met een pint putwater . 24
 lang gekookt tot het geheel vervlogen is. Hier-
 van ontbindt men 1 ons in een pond water.

Kneuzingen en koude gezwellen.

95 Leggers en schijthakken.

Teer	.	.	.	1 pond.
Groene zeep	.	.	.	1 —
Loodwit	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —

Gemengd en op een koolvuur bestendig roerende gekookt.

Hiermede driemaal daags sterk ingefmeerd.

96 Kniezwam

a.

Spaansche vliegen	.	.	.	$\frac{1}{2}$ ons.
Euphorbium - gom	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Oprement	.	.	.	2 drachma.
Terebinthijn - olie	.	.	.	1 ons.
Reuzel	.	.	.	2 —

b.

Spaansche vliegen	.	.	.	$\frac{1}{2}$ ons.
Euphorbium-gom	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Vloesbare ammoniak, (<i>spir. sal. amm. caust.</i>)	.	.	.	1 —
Geest van vitriool	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Rooide neergeplofte kwik	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Terebinthijn - olie	.	.	.	1 —
Reuzel	.	.	.	2 —

D 5

Braak

LVIII VOORSCHRIFTEN

c.

Braakwijnsteen	1	4	1	ons.
Reuzel	.	.	.	2 ons.

97 Zure zeepachtige balfem in kneuzingen en koude gezwellen.

d.

Vitriool - olie	.	1	1	1 ont.
Terebinthijn - olie	.	.	.	2 —
Lijnolie	.	.	.	4 —

Dit in eene aarde pot gemengd, en wanneer de opbruifching geëindigd, en het koud geworden is, voegt men er zoo veel sterke brandewijn bij, tot het eene melkwitte kleur aanneemt.

e.

Peeskwetfing.

Extrakt van lood en water, zeepgeest en geest van kamfer.
84 g.

f.

Kwetfing in den halsterketen.

Thedens wondwater of extrakt van lood met water. 84, g. en f.

Blaauw.

98

Blaauw water in voetwonden.

Blaauwe vitriool	.	.	.	1 onse.
Ammoniakzout	.	.	.	1 $\frac{1}{2}$ —
Spaansch green	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Kalkwater	.	.	.	2 pint.

waarin men het bovenstaande ontbindt.

Bewarende hetzelfde in eene welgeslotene flesch.

Voorts no. 82 en 83.



Verrekkingen en verstuikingen.

99

In geringe.

Kamfergeest	.	.	.	2 oncen.
Terebinthijn - olie	.	.	.	1 —

100

100

Aluin	.	.	.	1 onse.
Ammoniakzout	.	.	.	1 —
Blaauwe vitriool	.	.	.	1 —

Hiermede eene hand - breede zwachtel bevochtigd;

101

101

In verrekkingen en kneuzingen.

Geest van kamfer	.	.	.	2 oncen.
Geest van ammoniakzout	.	.	.	1 —
Terebinthijn - olie	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Wijnazijn	.	.	.	1 —

Ver.

LX V O O R S C H R I F T E N

102 Verdeelend afkookfel.

Kamillen bloemen	.	.	.	$\frac{1}{2}$ once.
Duizendblad	$\frac{1}{2}$ —
Jeneverbezien,	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Gekookt in wijnazijn	$\frac{1}{2}$ flesch.
Water, doorgegoten en bijgedaan	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —
Ammoniakzout	.	.	.	1 ons.

103 Gezwollene achterbeenen

Extrakt van lood	.	.	.	2 oncen.
Geest van kamfer	.	.	.	1 —
Geest van ammoniakzout	.	.	.	1 —
Terebinthijn - olie	.	.	.	3 —
Putwater	.	.	.	$1\frac{1}{2}$ flesch.

104 Boeglammingheid, gallen, enz.

Steen - olie	.	.	.	1 ons.
Terebinthijn - olie	.	.	.	1 —
Laurier - olie	1 —



105 Oogmiddelen.

Braakwijnsteen	.	.	.	1 drachma.
Vlierbloem - aftreksel.	.	.	.	1 pond.

Oog-

106

Oogontsteking.

Putwater, warm gemaakt	.	.	.	1 flesch.
Geest van kamfer	.	.	.	2 ons.
Extrakt van lood	.	.	.	2 —
Ammoniakzout	.	.	.	$\frac{1}{2}$ —

107

Zuiver Ammoniakzout	.	.	.	1 ons.
Gezuiverd spaansch groen	.	.	.	8 grein.
Ontbonden in wijnazijn	.	.	.	8 oncen.

108

Extrakt van lood	.	.	.	$\frac{1}{5}$ ons.
Koud putwater	.	.	.	3 —

of

Putwater	.	.	.	1 pond.
Aluin	.	.	.	1 drachma.
Witte vitriool	.	.	.	1 —
Loodzuiker, (azijnzuur lood, (<i>sacch. saturni</i>),				
(<i>acetis plumbi</i> .)	.	.	.	1 —

109

Etteroog.

Ongezoutene boter	.	.	.	2 oncen.
Roode neergeplofte kwik	.	.	.	1 drachma.
Om uitwendig mede te sincren.				

LXII V O O R S C H R I F T E N

110

Opgehevene lijtende kwik	.	.	.	12 greis.
Rozenwater	.	.	.	12 oncen.

Om uitwendig mede te waschen.

111

Vliezen op de oogen

a.

Armenifchen bolus	.	.	.	1 ons.
Witte zuiker	.	.	.	1 —
Wijnsteenroom	.	.	.	1 —

Tot een fijn poeder gemaakt, hetwelk men in het oog strooit.

b.

Ammoniakzout	.	.	.	1 lood.
Witte vinlool	.	.	.	1 —

In een bierglas water opgelost en in het oog gespoeren.

112

Scherpe tranen.

Zuiver wijnsteenzout, (<i>sal. tartari purum</i>)				1 drachma.
ontbonden in:				
Rozenwater	.	.	.	4 oncen.

Scher-

113 In Oogontstekingen met verzwakking gepaard.

a.

Wolverlei bloemen	.	.	.	2 oncen.
Kamillen - bl.	.	.	.	2 ———
gekookt in 2 kan water, doorgezigt en bijgevoegd:				
Witte viarool	.	.	.	1 drachme.

Op linnen kompresen.

Dit pare men inwendig met een versterkend middel.

b.

Wolverlei - bloemen	.	.	$\frac{1}{2}$ once.
Baldriaan - w.	.	.	$\frac{1}{2}$ ———
Genoegzamen honig tot een slikbok, dagelijks in drie giften.			



*De bepaling der hoeveelheden over, en de overeenkomst
van de geneeskundige gewigten en maten.*



Daar het in de geneeskunde van het hoogste belang is alles te vermijden, wat tot dwalingen aanleiding zoude kunnen geven, zullen de volgende ophelderingen geenzins overbodig gekeurd kunnen worden, welke zoo de verschillende giften in de bijgevoegde aanwijzing der geneesmiddelen, als de betrekking tusschen de gewone, (*officiële*) en de nieuwe maten en gewigten, ten onderwerp hebben.

De in deze aanwijzing opgegevene giften, zijn wat de geringste betreft, diegene welke gewoonlijk in eene reis in één voorschrift worden gebezigd en toegediend, terwijl de hoogste hoeveelheid diegene is, tot welke men, naar omstandigheden, door herhaalde toediening dagelijks kan opklimmen; Voorts hebbe men te bemerken, dat wortels, zaden en vormige basten, meestal in vaste zelfstandigheid, de kruiden, houten en veelal de basten in aftreksel, en de gommen en harsten in de oplossing van eenig geestrijk vocht worden toegediend.

Daar alle hedendaagse fransche vecartsenijkundigen, bij hunne voorschriften het nieuwe stelsel van maten en gewigten hebben gevolgd, is het bijna eene behoefte deze te kennen, om van hunne aanwijzingen vrucht te kunnen trekken; men dient dus te weten, dat omtrent:

1 pond (℔)	overeenstemt met .	$\frac{1}{2}$ kilogramme.
3 oncen (℥)	1 hectogramme.
1 ———	3 decagrammen.
3 drachma (ʒ)	1 —————
1 —————	4 grammen.
1 schrupel (ʒ)	20 decigrammen.
18 grein,	1 gramme.
2 —————	1 decigramme.
1 flesch of pint	1 liere.

ENKELVOUDIGE GENEESMIDDELEN UIT HET DIEREN- EN DELFSTOFFELIJKE RIJK.

II. Uit het DIERENRIJK.

Nederduitsche.	gewone Latijnsche.	Kunstbenamingen.	Fransche.	Hoogduitsche.	hoeveel der giften aangew.
Ongezoutene boter.	butyrum.	bos taurus L.	du beurre frais.	ungefalzene butter.	uitwendig.
Eijerdoren.	vitellus ovi.	phasianus gallus L.	le jaune d'oeuf.	eyerdotter.	id.
Honig.	mel vulgare.	apis mellifica L.	du miël.	honig.	$\frac{1}{2}$ ons tot 4 oncen. <i>uw.</i>
Oesterfchelpen.	concha preparata.	ostra edulis L.	des écailles.	austerfchalen.	$\frac{1}{2}$ ons tot 2 oncen.
Ren.	axungia porcina.	fus scrofa L.	du saindoux.	fchweinefett.	uitwendig.
Sperma ceti.	sperma ceti.	physeter macrocephalus L.	blanc de baleine.	walrath.	id.
Spannfche vliegen.	cantharides.	meloe vesicatorius L.	des cantharides.	fpanifche fliegen.	id.
Was.	ceras.	apis mellif. L.	de la cire.	wachs.	id.

III. Uit het DELFSTOFFELIJKE RIJK.

Bruinfteen.	magnesia nigra.	oxyd. magnes. nigr. nativ.	manganèse.	braunftein.	tot berookingen.
Kwik.	mercurius.	hydrargyrum.	hydrargyre.	quackfilber	uitwendig.
Oprement.	auripigmentum.	arsenicum fulphur.	orpiment. (<i>oxide d'arsenic sulfuré jaune.</i>)	oprement.	10 grein tot $\frac{1}{2}$ dr.
Wit rattenkruid.	arsenicum album.	oxyd. arsen. alb.	acide arsénieux. (<i>oxide d'arsenic blanc.</i>)	arsénik.	$1\frac{1}{2}$ — tot 3 grein.
Spiesglas.	antimonium crudum.	fulphuretum stibii.	antim. crud. (<i>sulfure d'antimoine.</i>)	spiesglans fchwefel.	2 drachma tot 1 on.
Ijzervijfel.	limatura ferri.	ferrum pulveratum.	limaille de fer.	eifenfeile.	$\frac{1}{3}$ — tot 2 —
Zwavel. (ruwe	fulphur crudum.	. . .	du foufre.	roher fchwefel.	
Zwav. bloemen (gezuiv. zw.	flores sulphuris.	fulphur depuratum.	fleurs de foufre.	fchwefel - blumen.	$\frac{1}{4}$ — tot 4 —

TOEBEREIDE GENEESMIDDELEN.

A. Zuren en loogzouten.

<i>Nederduitsche.</i>		<i>Latijnsche.</i>		<i>Fransche.</i>	<i>Hoogduitsche.</i>	<i>hoeveelheid der giften daags.</i>
<i>gewone.</i>	<i>scheikundige.</i>	<i>gewone.</i>	<i>scheikundige.</i>			
Vloeibare ammoniak.	vloeibaar vlug bijtend loogzout.	spir. falis ammon. cum calce viva.	ammonia liquida.	ammoniaque liquide.	falmiakgeist.	1 schrupel tot 3 sch.
Potasch (groei-stoffelijk vast loogzout.)	kooizure kali.	carbonas potasæ alcalinum.	potasfa venalis.	potasse.	potasch.	uitwendig.
Sterk water.	salpeter-zuur.	aqua fortis.	acidum nitricum.	acide nitrique.	scheidewasfer.	idem.
Bijtend loogzout.	drooge bijtende kali.	lapis causticus.	potasfa fusa.	potasse caustiq. (piërre)	aetzstein.	idem.
Vitriool-olie.	zwavel-zuur.	oleum vitrioli.	acidum sulphuricum.	acide sulfurique. à cau-	schwefel - fäure.	10 grein tot 30 grein.
Zoutgeest.	zeezout-zuur.	spir. falis marini.	— muriaticum.	— muriatique. (tère.)	salz - fäure.	10 — tot 30 —
Zamengedrongen zoutg.	zamengedr. zeezout-zuur.	acidum falis concentr.	— muriat. concentrat.	— — — concentré.	concentrirte salz-fäure.	5 — tot 15 —

B. Middenzouten zonder metaalachtig beginfel.

Aluin. (ruwe — (gebrande)		alumen crudum. — ustum.	fulphas aluminæ. — ustum.	alun. (sulfate d'alun.) — (sulfate d'alumine calciné.)	alaun. gebrannter alaun.	$\frac{1}{2}$ drachma tot 3 dr. uitwendig.
Ammoniakzout.	zoutzure ammoniak.	sal ammoniacus.	urias ammoniæ.	sel ammoniac. (muriate d'ammoniac.)	falmiak.	1 drachma tot 6 —
Dubbeltzout.	zwavelzure potasch.	tartarus vitriolatus.	fulphas potasæ.	tartre vitriolé. (sulfate de potasse.)	vitriolisirter weinstein.	1 — tot 4 oncen
Glaubers wonderzout.	— foda.	sal mirabile glauberi.	fulphas fodæ.	sel de glauber. (sulfate de soude.)	glauber - falz.	1 — tot 6 —
Hartshoorn-geest.	koolzurige brandige ammoniak.	spiritus cornu cervi.	carbonas ammoniæ pyro-animale liquidum.	esprit volatil de corne de cerf. (alcali volatil.)	hirschhorn - geist.	30 grein tot $\frac{1}{2}$ —
Gekristalliseerd groei-stoffelijk loogz. (alcali.)	gekristalliseerde koolzure potasch.	alcali vegetabile.	carbonas potasæ cristallifatum.	alcali végétal doux. (carbonate de potasse)	pflanzen alcali. weinstein - falz.	uitwendig.
Magnesia.	koolzure bitteraarde.	magnesia alba.	carbonas magnesiæ.	magnésie. (carbonate de magnésic.)	bitterfalz-erde.	1 dr. tot 4 dr.
Geest van minderere.	azijnzure ammoniak.	spiritus mindereri.	acetis ammoniæ liquid.	esprit de mindrerus. (acétate ammoniacal liquid.)	minderers geist, estig falmiak.)	1 ons tot 4 onc.
Salpeter.	salpeterzure potasch.	nitrum depuratum.	nitras potasæ depur.	sel de nitre. (nitrate de potasse.)	salpeter.	$\frac{1}{2}$ — tot 2 —
Wijnsteenroom.	zurige wijnsteenzure potasch.	cremor tartari.	tartris acidula potasæ.	crème de tartre. (tart. acidulé de potasse.)	weinsteinrahm.	$\frac{1}{2}$ — tot 2 —
Zeezout.	zoutzure foda.	sal culinaris.	urias fodæ.	sel marin. (muriate de soude.)	kochfalz.	$\frac{1}{2}$ — tot 3 —

C. Bereidingen uit metalen.

Nederduitſche		Latijſche.		Frantiſche.	Hoogduitſche.	hoeveelheid der giften daags.
gewone.	ſcheikundige.	gewone.	ſcheikundige.			
Braakwijnſteen.	geſpiesglansde wijnſteen zure potaſch.	tartarus emeticus.	tartris potaſæ ſtibiata.	émétique, (tartrite antimonie de potaſſe)	breehweinſtein.	$\frac{1}{2}$ dr. tot 2 dr.
Kwik, (bijtende opge- hevene	zoutzure kwik.	mercurius ſublimatus corroſivus.	murias hydrargyri oxy- dati.	ſublimé corroſif, (muri- ate de mercure ſuroxi- géné.	ätzender quekſilber ſu- blimat.	5 — tot 10 gr. en uitwendig.
Kwik, (roode neerge- ploſte	geſalpeterzuurd kwik- verzuurſel.	merc. præcip. ruber.	oxydum hydrargyri ni- tratum.	précipité rouge, (oxide de mercure rouge.)	rother præcipitat.	uitwendig.
Kwik, (witte neergepl.	zoutzure ammoniakale kwik.	— præcipitatus albus	murias hydrargyri am- moniacale.	précipité blanc (mercu- riate ammoniacal.)	weiſſer quekſilber præ- cipitat.	id.
Kwik, (zoete	onvolkomene zoutzure verzuurde kwik.	— dulcis, calomel.	murias hydrargyri oxydulati.	mercure doux (muriate de mercure doux.)	verſuſtes quekſilber.	10 gr. tot 3 ſch.
Kermes, (mijnſtoffelijke	waterſtoffig verzuurde ſpiesglans.	kermes mineralis.	hydro - fulphuretum oxyduli ſtibii.	kermes minéral, (oxide d'antimoine hydro - ſulfuré rouge.)	mineral - kermes.	1 ſchr. tot $1\frac{1}{2}$ dr.
Lood-extrakt.	vloeibaar azijnzuur lood	extractum ſaturni.	acetis plumbi liquida concentrata.	vinaigre ou extrait de ſaturne, (acétite de plomb concentré.)	bleij - extrakt.	uitwendig.
Lood - zuiker.	azijnzuur lood.	ſaccharum ſaturni.	aectis plumbi.	ſel de ſaturne, (acétite de plomb critalliſé.)	bleij - zucker.	id.
Loodwit.	azijnzuur verzuurd lood	ceruſa.	oxydum plumbi carbo- natum.	céruiſſe, (oxide de plomb carbonné.)	bleij - weiſſ.	id.
Moor, (mijnſtoffelijke	zwarte gezwavelde kwik.	æthiops mineralis.	fulphuretum hydrargy- ri nigrum.	æthiops minéral (ſulfu- re noir de mercure.)	quekſilbermoor.	id.
Potaſch zwavellev. met eene groeiftoff. loog- zoutige grondſtof.	gezwavelde potaſch.	hepar ſulphuris aleali- num.	fulphuretum potaſæ. alcalinum.	ſoijede ſouffre, (ſulfure de potaſſe.)	ſchwefelleber.	id.
Spaanſch - groen.	azijnzuur koper.	viride æris.	cuprum acetatum.	verd de gris, (oxide de cuivre.)	grün - ſpan.	id.
Spiesglans zwavellever.	gezwavelde ſpiesglans bevattende potaſch.	hepar antimonii.	fulphuretum potaſæ ſtibiatum.	ſoije d'antimoine, (oxi- de d'antim. ſulfuré.)	ſpiesglansleber.	3 dr. tot 3 oncen.
Steen, (helfche	geſmolten ſalpeterzuur zilver.	lapis infernalis.	nitras argenti fuſum.	pierre infernale, (nitra- te d'argent fondu.)	hölleſtein.	uitwendig.
Vermillioen.	roode gezwavelde kwik	cinnaberis factitia.	fulphuretum hydrargy- ri rubrum.	cinnabre artiſciel, (ſul- furé rouge de mercure	Zinnober.	id.
Vitriool, (blauwe	zwavelzuur koper.	vitriolum cupri.	fulphas cupri.	vitriol bleu, (ſulfate de cuivre.)	kupfer - vitriol.	id.
Vitriool, (witte	zwavelzure zink.	— album.	— zinci.	vitriol blanc, (ſulfate de zinc.)	zink - oder weiſſer vi- triol.	id.
Vitriool, (zuivere ijzer-	zwavelzuur ijzer.	— martis.	— ferri.	vitriol vert, (ſulfate de fer.	eiſen - vitriol.	id.
Zilverglid.	azijnzuur verzuurd, half verglaasd lood.	lithargyrium.	oxydum plumbi femi- vitreum.	litharge (oxide de plomb demi-vitreux.)	ſilberglätte.	id.
Zinkbloemen.	verzuurde ſpianteur.	flores zinci.	oxydum zinci.	fleurs de zinc, (oxide de zinc.)	zinkblumen.	id.
Zwavel, (goud-	gezwavelde verzuurde ſpiesgl. met waterſtof.	ſulphur auratum anti- monii.	fulphuretum oxyduli ſtibii hydrogenatum.	ſoufre doré, (ſoufre d'antimoine hydrogè- né.)	goldfärbiger ſpiesglans- ſchwefel.	15 gr. tot 2 ſchr

(*) De mijnſtoffelijke kermes is meer geſpiesglansd en minder gezwaveld, daarentegen is de goudzwavel minder geſpiesglansd en meer gezwaveld, terwijl de ſpiesglansmoor uit kwik en ſpiesglans, en de mijnſtoffelijke uit kwik en zwavel beſtaat.

TOEBEREIDE GENEESMIDDELEN.

D. Extracten en conferven.

Nederduitsche		Latijnsche,		Fransche.	Noogduitsche.	hoeveelheid der giften daags.
gewone.	scheikundige.	gewone.	scheikundige.			
Zoethoutdrop.	. . .	succus liquiritiae depu- ratus.	extractum liquiritiae.	extrait de réglise.	eingedickter Lusholz- saft.	$\frac{1}{2}$ ons tot 1 oncen.
Jeneverbezien conferf.	. . .	rob. juniperi.	. . .	rob de bayes de geni- (vre.	wachholdermus.	1 — tot 4 —
Vlierbezien conferf.	. . .	— ramosi.	. . .	— de sureau.	holiaander muss.	1 — tot 4 —

E. Azijn- en wijnoplossingen.

Eenkele honig - azijn.	. . .	oxymel simplex.	. . .	oximel simple.	fauerhonig.	2 — tot 6 —
Zee-ajuin honig - azijn.	. . .	— scilliticum.	oxymel scillae.	— scintique.	meerzwiebel - honig.	1 — tot 4 —

F. Aftrekkels, (tincturen.)

Tinktuur van aloë.	. . .	tinct. aloës.	. . .	teinture d'aloës.	aloë - tinktur.	uitwendig.
— van myrrhe.	. . .	— myrrhe.	. . .	— de myrrhe.	myrrhe - tinktur.	id.
— van sp. vlieg.	. . .	— cantharidum.	. . .	— de cantharides.	spanische vliegen-tinkt.	id.

G. Geesten en overgehaalde wateren.

Mout of koom-brandew.	. . .	spir. frumenti.	. . .	eau de vie de grain.	kornbrandtwein.	id.
Brandewijn of wijngeest	. . .	— vini.	. . .	eau de vie.	brandwein.	id.
Wijngeest (overgehaalde	. . .	— — rectificatus.	. . .	esprit de vin.	weingeist.	id.
— (voorloop van)	. . .	alcohol.	. . .	aleoöl.	stärkester weingeist.	id.
— met kamfer.	. . .	spir. vini camphoratus.	. . .	eau de vie camphré.	kamfer - spiritus.	id.
Hoffmans droppelen.	Wijngeestige zwavelæ- ther.	liquor anodijus mine- ralis.	æther sulphuricus alco- holicus.	liqueur minérale de hoffmann, (æther sul- furique alcoolisé.	verfäster schwefel- geist.	$\frac{1}{2}$ ons tot 2 oncen.
Verzoete salpetergeest.	— — — salpeter æther.	spir. nitri. dulcis.	— nitricus alcoho- licus.	esprit de nitre dulcifié, (nitrique alcoolisé.)	— — — salpetergeist.	2 dr. tot 1 —
Zeepeest.	. . .	— saponis.	. . .	esprit de savon.	seifen - spiritus.	uitwendig.

TOEBEREIDE GENNEESMIDDELEN.

H. ZAMENGESTELDE WATEREN.

<i>Nederduitsche.</i>			<i>Latijnsche.</i>		<i>Fransche.</i>	<i>Hoogduitsche.</i>	<i>gebruik.</i>
<i>gewone.</i>	<i>scheikundige.</i>		<i>gewone.</i>	<i>scheikundige.</i>			
Blaauw water.	.	.	aqua cerulea.	liquor cupri ammoniaci.	eau saphirine.	vitriol-wasfer.	uitwendig.
Bijtend water.	.	.	— phagedenica.	— muriat. hydrarg.	eau phagadénique.	phagad. wundwasfer.	id.
Water van goulard,	.	.	— goulardi.	— acetis plumbi.	eau de goulard.	blei-wasfer.	id.
Kalk-water.	.	.	— calcis.	.	eau de chaux.	kalch - wasfer.	meest uitwendig.
Water van rabel.	.	.	— rabelii.	acid. sulf. alcool.	acide sulfurique alcoolisé.	rabels-wasfer.	id.
Wondwater van <i>Theden</i> (arquebufade.)	.	.	— traumatica thedeni.	mixtura vulneraria acida.	eau vulnéraire de theden.	Thedens wundwasfer.	uitwendig.

I. O L I E N.

Boom- of olijf olie.	.	.	oleum olivarum.	.	huile d'olive.	baumoel.	meest uitwendig.
Lijnolie.	.	.	— lini.	.	— de lin.	leinoel.	id.
Laurier - olie.	.	.	— lauri.	.	— de laurier.	lorbeeroel.	uitwendig.
Raap - olie.	.	.	— raparum.	.	— de navette.	Rüboel.	id.
Steen - olie.	.	.	— petræ.	.	pétréole.	steinoel.	id.
Terebinthijn - olie.	.	.	— therebinthinaceum æthereum.	.	huile de terébinthine.	terpentinoel.	id.

K. Z E E P E N.

Groene zeep.	.	.	fapo viridus.	.	du savon noir.	grüne seife, schmierseife	uitwendig.
Witte zeep.	.	.	fapo venetus sive albus.	.	— blanc.	weisse seife.	meest uitwendig.

L. BALZEMS, ZALVEN, SMEERSELS, enz.

Nederduitſche.		Latijnsche.		Frantiſche.	Hoogduitsche.	gebruik.
gewoont.	ſcheikundige.	gewoont.	ſcheikundige.			
althea-balfem.	. . .	balf. althææ.	. . .	onguent de la mère.	eibich-falbe.	uitwendig.
Baſilikum - zalf.	. . .	unguent. baſilicum.	ung. picis.	— de baſilicum.	baſilicum-falbe.	id.
Ettermakende - zalf.	. . .	ung. excitans, vulgo diſſolvivum.	ung. terebinthaceum.	— ſuppuratif.	diſſolvent-falbe.	id.
Hecht - pleiſter.	. . .	empl. adheſivum.	empl. refinofum.	emplâtre agglutinatif.	heft-pſaſter.	id.
Loodwit - zalf.	. . .	ung. ceruſtæ.	ung. oxydi plumbi carb.	. . .	bley-falbe.	id.
Uitw. levensbalfem.	. . .	balfamum vitæ exter- num.	. . .	baume de vie externe.	äufferlicher lebensbal- ſem.	id.
Laurier - zalf.	. . .	ung. nervinum.	ung. laurinum.	onguent de laurier.	lorbeer - falbe.	id.
Kwik - zalf.	. . .	ung. mercur ceruleum, neapolitanum.	— oxydi hydrargy- ri.	onguent mercuriel.	mercurial - falbe.	id.
Opoſeldok - balfem.	. . .	balf. opodeldoch.	linim. ſapon. camphor.	baume d' opodeldoque.	ſeifen-balfem.	id.
Kalmesij - zalf.	. . .	ung. grifeum, ſive cum lapide calamin.	ung. zinci.	. . .	calmey-falbe.	id.
Peru - balfem.	. . .	balf. peruvianum.	. . .	baume de perou.	peruvianifcher balfem.	id.
Spaniſche vliegen' zalf en pleiſter.	. . .	ung. vel emplastr. veſi- cator.	ung. vel empl. cantha- ridum.	ong. ou emplâtrej vé- ſicatoire.	ſpaniſche ſliegen-falbe.	
Spaanschgroen - zalf.	. . .	— ægyptiacum.	ung. acetitis cupri cum melle.	ong. de verd de gris.	grünſpan-falbe.	id.
Zwavelzalf.	. . .	— ad ſcabiem.	ung. ſulphuratum .	ong. antipſorique ou contre la gale.	krätzfalbe.	id.

AANWIJZING EN BENAMINGEN

der voornaamfte geneesmiddelen die in de paardenartfenijkunde gebezigt worden.

ENKELVOUDIGE GENEESMIDDELEN.

I. Uit het PLANTENRIJK.

A. WORTELS welke in poeder moeten gegeven worden.

Nederduitsche.	gewone Latijnsche.	volgens Linneus.	Fransche.	Hoogduitsche.	hoeveelh. der giften daags.
* 1 Alands - w. (5.	enulla campana. (helenium)	inula helenium.	aunée.	alantswurzel.	$\frac{1}{2}$ ons tot 3 oncen.
* 2 Angelika - w. (11.	angelica.	ang. archangelica.	angelique.	angelik - w.	$\frac{1}{2}$ — tot 3 —
* 3 Baldriaan - w. (2.	valeriana sylvestris.	valeriana officinalis.	valeriane.	baldrian, katzen - w.	$\frac{1}{2}$ — tot 3 —
4 Galgant - w. (1.	galanga.	maranta galanga.	galanga.	galgant - w.	2 dr. tot 2 —
* 5 Gentiaan - w. (roode) (1.	gentiana.	gent. lutea.	gentiane.	gelber enzian - w.	2 dr. tot 3 —
6 Gras - w. (12.	gramen.	triticum repens.	chiendent.	quecken - w.	1 ons tot 4 —
* 7 Heemst - of althea - w. (38	althea.	alth. officin.	guimauve.	eibisch - w.	3 dr. tot 4 —
* 8 Holwortel, osterlucie.	aristolochia.	arist. rotunda.	aristoloche ronde.	runde osterlucy - w.	$\frac{1}{2}$ ons tot 3 —
* 9 Jalappen. (17.	jalappa.	convolvulus jalapp. (?)	jalappe.	jalappe.	3 dr. tot 1 —
10 Ipecacuanha.	ipecaacuanha.	psychotria emetica.	ipécaeanha.	ruhrwurz.	3 — tot 1 —
* 11 Kalmus - w. (2.	calamus aromaticus.	acorus calamus.	calament.	kalmus - w.	$\frac{1}{2}$ once tot 3 —
12 Klisfen - w. (6.	bardana.	aretium lappa.	bardane, glouteron.	kletten - w.	1 — tot 3 —
* 13 Meckrap.	rubia tinctorum.	rub. tinct.	garanec.	färberröthe, krapp.	2 dr. tot 2 —
* 14 Nachtsbade - w. (31.	belladonna.	atropa bellad.	belladonne.	tollbeere, tollkirche.	1 — tot 1 —
* 15 Nagelkruid-wortel. (2.	caryophyllata.	geum urbanum.	la benoite.	nelkenwürzel.	2 — tot 1 $\frac{1}{2}$ —
16 Nies - wortel. (witte	helleborus albus.	veratrum album.	ellebore blanc.	weisfe nieswurz.	uitwendig.
17 Rabarber. (9.	rhabarbarum.	rhei. species.	rhubarbe.	rhabarber.	$\frac{1}{2}$ once tot 2 —
18 Slangen - w. (3.	serpentaria virginiana.	aristolochia serp.	serpenaire.	virginianische schlangen-w.	3 dr. tot 2 —
19 Varen - w.	filix mas.	polypodium F. mas.	fougère.	farrenkraut - w.	$\frac{1}{2}$ once tot 1 $\frac{1}{2}$ —
* 20 Suikerij - w.	cichorium.	cichorium intibae.	cichorée.	ziehorei, wegwart,	1 — tot 4 —
21 Wilden wijngaard - w.	bryonia.	bryonia alba, vel. dicæca	couleuvrée.	zaunrübe, gichtrübe.	$\frac{1}{2}$ — tot 3 —
* 22 Wolverlei - w. valkruid.	arnica.	arn. montana. (Jacq.	bétoine des montagnes.	arnica, wolferlei.	$\frac{1}{2}$ — tot 4 —
23 Tormentil - w. (20.	tormentilla.	torm. erecta.	tormentille.	tormentil - w.	$\frac{1}{2}$ — tot 1 $\frac{1}{2}$ —
* 24 Zee - ajulia - w.	feilla.	feilla maritima.	scille.	meerzwiebel.	2 fchr. tot $\frac{1}{2}$ —
25 Zedoar - w. (4.	zedoaria.	kaempfer. rotund. s. am. zed.	zedoïre.	zittwer - w.	2 dr. tot 2 —
* 26 Zoethout.	liquiritia.	glyzyrrhiza offic.	régliste.	fischholz.	1 once tot 4 —

ENKELVOUDIGE GENEESMIDDELEN UIT HET PLANTENRIJK

B. KRUIDEN met of zonder bloemen.

Nederduitsche.	gewone Latijnsche.	volgens Linneus.	Fransche	Hoogduitsche.	hoeveelh. der giftendaags
*27 Agrimonie (29.	agrimonia.	agr. eupatoria.	aigremoine.	odermenning.	meest nitwendig.
*28 Alzem. (blad. en knop.	absinthium vulgare.	artemisia abs.	absinthe.	vernuth.	$\frac{1}{2}$ once tot 4 oncen.
29 Bernage. (27.	borrago.	borrago offic.	bourrache.	ochsenzung, boretsch.	1 — tot 4 —
30 Berenklaauw.	acanthus.	acanth. mollis.	branche ursine, acanthe.	ärenklauen.	1 — tot 4 —
31 Bilzenkruid. (14.	hyoscyamus niger.	hyosc. niger.	jusquiame.	bilsenkraut.	meest uitwendig.
*32 Duizendblad. (39.	millefolium.	achillæa millef.	millefeuille.	schaaflarbe.	$\frac{1}{3}$ — tot 3 oncen.
*33 Duizendguldenkr. (28.	centaurea minor.	gentiana centaurium.	petite centauree	taufendgülden-kr.	$\frac{1}{3}$ — tot 3 —
*34 Gezegenden distel. (61.	cardus benedictus.	centaurea benedicta.	chardon benit.	gesegneter distel, carde ben.	$\frac{1}{3}$ — tot 3 —
35 Glaskruid.	parietaria.	pariet. offic.	casse pierre, parietaire.	glaskraut, tag u nachtkr.	1 — tot 4 —
*36 Guichelheil.	anagallis.	a. arvensis.	mouron.	gauchheil.	3 dr. tot 3 —
*37 Holwortel bladen. (3.	(zie boven: holwortel 3.)	id.	id.	osterlucie.	
*38 Kaasjes-kr. malva. (7.	malva.	m sylvestris rotunda folia.	mauve.	malve, pappel.	1 ons tot 4 —
*39 Kamillen-bloemen	chamœmelum vulgare.	matricaria chamomilla.	camomille.	chamillen.	1 — tot 4 —
*40 Koorts- of waterkl. (28.	trifolium fibrinum.	meniantes trifoliata.	menianthe. (treffe aquatiq.	lieberklee.	$\frac{1}{2}$ — tot 3 —
*41 Kervel. (wilde	cicuta.	conium maculatum.	ciguë.	schierling.	3 dr. tot 1 —
42 Lauw. (35.	lactua.	lactua sativa.	laituë.	lattich.	2 once tot 8 —
43 Lavendel. (47.	lavendula.	l. spica.	lavande.	lavendel, spiek.	$\frac{1}{3}$ — tot 3 —
44 Majoliijn. (49	majorana.	origanum maj.	marjolaine.	majoran.	$\frac{1}{3}$ — tot 3 —
45 Mourkruid. (54.	ruta muraria.	adiantum album.	rue des murs, mouron.	bünerbisz, mauer-raute.	3 dr tot 2 —
*46 Pepermunt.	mentha piperita.	mentha species.	menthe poivrée.	pfeffer-münze.	3 — tot 2 —
*47 Rotemarijn. (49.	rosmarinus.	rosm. officin.	romarin.	rosmarin.	3 — tot 2 —
*48 Rijnvaren. (83.	tanacetum.	tanac. vulg.	tanaise.	rheinfarn.	1 — tot 3 —
*49 Salij. (47.	salvia.	salv. offic.	sauge.	salbey.	$\frac{1}{2}$ — tot 2 —
*50 Senebladen.	fennæ folia.	casia fenna.	du senné.	fennen-blätter.	1 — tot 2 —
*51 Tabak	nicotiana.	nicot. tabacum.	tabac	taback.	uitwendig.
*52 Vingerkruid. (purper	digitalis purpureæ folia.	digit. purp.	digitale pourprée.	rother fingerhut.	2 grein tot $\frac{1}{2}$ schnupel.
53 Vlierbloemen. (35.	flor sambuci.	sambucus nigra.	sureau.	hollunder.	1 once tot 8 oncen.
54 Wijruit.	ruta.	r. graveolens.	rue.	raute.	$\frac{1}{2}$ — tot 1 $\frac{1}{2}$ — en uitw.
55 Wolfsmelk.	euphorbium.	euph. offic.	euphorbe.	euphorbium.	$\frac{1}{2}$ dr. tot 4 dr. uitw.
*56 Wolverlei-bl enw. (22.	flor. arnica,	arnica mont.	zie boven, wolverleiwortel.	$\frac{1}{2}$ once tot 3 oncen.
57 Zevenboom. (54.	fabina.	juniperus sabina.	sabine.	fägebäum.	1 dr. tot 1 —

ENKELVOUDIGE GENEESMIDDELEN UIT HET PLANTENRIJK.

C. Houten en basten.

<i>Nederduitſche.</i>		<i>gewone Latijſche.</i>	<i>volgens Linnæus</i>	<i>Frantiſche.</i>	<i>Hoogduitſche.</i>	<i>hoeveelh. der giften daags.</i>
*53 Eikenzwam.		agaricus.	boletus incarnas.	de l'amidou. (agaric	feuerschwamm.	nietwendig.
*59 Eikenbast.	(64.	cortex querens.	querc. robur.	chêne.	eichenrinde.	$\frac{1}{2}$ ons tot $1\frac{1}{2}$ once.
60 Kancel.		— cinnamomi.	laurus cinnam.	canelle.	zimmt.	2 dr. tot 2 —
61 Kaskaril.	(67.	— cascarillæ.	croton cascarillæ.	cascarille.	cascarillen rinde.	2 — tot $1\frac{1}{2}$ —
62 Koortsbast.	(68.	— chinæ. (c. peruvian.	cinchona offic.	quinquina.	feber rinde.	1 ons tot 4 —
63 Laurierbast.		— laurea.	laur. nobilis.	laurier.	lorbeer - r.	3 dr. tot 2 —
*64 Paardenkaſtanjeb.	(59.	— hippo - caſtani.	æsculus hippocastanum.	maronnier d'inde.	roſſkaſtanie - r.	1 ons tot 6 —
*65 Pokhout.		ligni guajaci rafura.	guajac. offic.	bois ſaint. s. guajac.)	franzofenholz.	1 — tot 3 — in aſtr.
*66 Okkernootbast.	(59.	putamen nueu juglandum.	juglans regia.	noix corneaux.	die äußere grüne ſchale der unreife wallnüsſe.	$\frac{1}{2}$ — tot $1\frac{1}{2}$ — in aſtr.
67 Oranjefchillen.		cortex aurantiorum.	citrus aurantium.	écorce d'orange.	pomeranzen ſchalen.	$\frac{1}{2}$ — tot $1\frac{1}{2}$ —
*68 Wilgenb. (laurier-		— falix laurea.	ſal. pentandra.	sautle.	weiden-rinde, bruchweide-r.	1 — tot 6 —
*69 IJslandſche moos.		lichen islandicus.	l. isl.	lichen islandique.	islandiſches moos.	1 — tot 8 —

D. Zaden en vruchten.

*70 Anijszaad.	(77.	femen anifi.	pimpinella anisum.	anis.	anisaamen.	2 drachma tot $1\frac{1}{2}$ ons.
*71 Fœnegriek.	(76.	— ſœnu-græcum.	trigonella cœnu-græcum.	foenugree. ſénégrain.	bokshorn - s.	$\frac{1}{8}$ once tot 4 —
72 Hennip.		— cannabis.	cannabis fativa.	du chanvre.	hanif.	1 — tot 4 —
73 St. ignatius boonen.		ſabæ ſt. ignatii.	ſtrygnos ignatis.	ſèves de ſt. ignace.	ignatius boonen.	1 drachma tot 1 —
*74 Jeneverbez.		baecæ juniper.	juniperus communis.	baies de-genievre.	wachholderbeeren.	$\frac{1}{2}$ ons tot 3 —
75 laurier - bez.	(74.	— lauri.	laur. nobilis.	(zie boven.)	lorbeer - b.	2 drachma tot $1\frac{1}{2}$ —
*76 Lijnzaad.		femen lini.	linum uſtatiſſimum.	grain du lin.	leinfzaamen.	als bijvoegſel afgekookt.
*77 Komijn - z.	(70.	— carvi.	carum carvi.	carvi.	maltenkûmmel.	3 drachma tot 2 oncen.
78 Kraanoogen.		nuces vomicæ.	ſtrychnos nux vomica.	noix vomiques.	krähenaugen.	
*79 Moſterd - z.		fem. ſinapeos.	ſinapis nigra et alba	moutarde.	ſenf.	$\frac{1}{2}$ ons tot 2 —
80 Peterſelie - z.		— petroſelin.	aprum petroſelinum.	persil.	peterſelie.	$\frac{1}{2}$ — tot 2 —
81 Venkel - z.	(70.	— ſœniculi.	arctium ſœniculum.	fenouil.	ſenchel.	2 drachma tot $1\frac{1}{2}$ —
*82 Watervenkel - z.		— ſœniculi aquatici.	phellandrum aquaticum.	— aquatique.	waſerſenchel.	2 — tot 6 drachma.
83 Wormkruid - z.	(48.	— ſantonici.	artemiſia contra. (?)	ſemen contra.	wûrmzaden.	2 — tot $1\frac{1}{2}$ oncen

ENKELVOUDIGE GENEESMIDDELEN UIT HET PLANTENRIJK.

D. Natuurlijk verdikte sappen, gommen en harsten.

<i>Nederduitſche.</i>	<i>gewone Latijnsche.</i>	<i>volgens Linneus.</i>	<i>Fransche.</i>	<i>Hoogduitſche.</i>	<i>hoeveelh. der giften daags.</i>
*84 Aloë. (iever-	aloë hepatica.	aloë perfoliata.	aloës.	aloë.	$\frac{1}{2}$ once tot 1 ons.
*85 Ammoniak - gom.	gumm. ammoniacum.	(onbekend tot nu toe.)	gomme ammoniacque.	ammoniak-harz.	$\frac{1}{2}$ — tot 1 —
86 Arabiſche - g. (7.	— arabicum.	minofa nilotica.	gumme arabique.	arabiſcher gumme.	gelijk heemſtw.
87 Cachou. (66.	catechu, s. terra japonica.	catechu.	cachou.	japoniſche erde.	zie okkernootbaſt.
88 Draganth - g. (86.	gumm. tragacanth.	astragalus trag.	gumm. draganth.	tragant - gumme.	$\frac{1}{2}$ ons tot 1 $\frac{1}{2}$ ons
89 Drakenbloed.	— ſanguis draconis.	dracæna draco.	sang dragon.	drachenblut.	1 ſchr. tot 2 ſchr.
*90 Daivelsdrek.	— asa foetida.	ſerula asa foet.	assa fétide.	ſtinkender aſfant, teufelsdr.	$\frac{1}{2}$ dr. tot 1 ons.
91 Euph. (wolſmelk) - g.	— euphorbium.	(zie boven 55.)	id.	id.	uitwendig.
92 Harſt.	colophonium.	pinus abies.	colophone pix réſine.	colophonium, geigenharz.	id.
*93 Kamfer.	camphora.	laurus camphora.	camphre.	kamfer.	$\frac{1}{2}$ dr. tot 1 —
94 Mijrrhe.	myrrhæ.	id.	id.	id.	uitwendig.
95 Maſtik.	mastiſches.	pistachia lentiscus.	duk maſtic.	maſtik.	id.
*96 Opium.	Opium.	papaver ſomniferum.	opium.	opium.	15 gr. tot 1 drachma.
97 Pik.	pix.	pinus abies.	poix.	pech.	uitwendig.
98 Pokhout - gom.	gumm. guajac.	guajacum off.	réſine de guajac.	guajac - harz.	3 dr. tot 1 once.
*99 Terebintlijn. (venet.	tereb. veneta.	pinus larix.	térébenthine.	terpentin.	2 — tot 1 —
100 Teer.	pix liquida.	pinus abies et ſylveſtris.	goudron.	theer.	uitwendig.

B E N A M I N G E N

der voornaamste ziekten, toevallen en gebreken waaraan het paard onderhevig is.



Ziekten die bijzonder de opflorpemde vaten aandoen.

<i>Nederduitsch.</i>	<i>Fransch.</i>	<i>Hoogduitsch.</i>
De verkoudheid.	la morfondure.	strengel.
De droes.	la gourme.	druse, kropf.
De kwade droes.	la morve.	roz.
De worm.	le farcin.	wurm.
De dolle hondsbeer.	la rage.	die hundswuth.

Rheumatieke en krampachtige toevallen.

De jigt.	la goutte.	die gicht.
Zinkingen.	des fluxions.	flüsse.
Rheumatismus.	le rhumatisme.	rheumatismus. (genheit
Vervangenheid.	la fourbure.	rehe, verschlag, verfan-
De vallende ziekte.	l'épilepsie.	die fallende fucht.
Verlamming.	la paralysie.	lähmung.
De klem.	le tetanus, mal de cerf.	die klemme, maußper-
		re, hirschkrankheit.
De kramp.	le spasme.	krampf.
Stijfheid der voorbe-	cheval froid ou épris	stijfheid der vorderbei-
nen.	des epaules.	ne.

Ziekten der levenswerktuigen.

Van het hoofd.

De ontsteking der her-	l'inflammation du cer-	gehirnentzündung.
fenen.	veau.	
De kolder.	la phrénésie.	koller.
Duizeligheid.	le vertige.	schwindel.

*

Der

B E N A M I N G E N

Der ademhalingswerktuigen.

Nederduitsch.

Fransch.

Hoogduitsch.

De ontfleking der keel.	l'angine, l'inflammation du gosier.	halssentzündung, bräune.
Die der oorklieren of de vijvel.	les parotides.	seifeln, ohrdrüsen-geschwulst.
Het zijlewée of die van het borstvlies.	la pleurésie, courbature.	brustfell-entzündung.
De longontfleking.	la peripneumonie.	langen-entzündung.
De longtering.	la pulmonie, phthisie.	langenfucht, lungensaule.
De borstwaterzucht.	l'hydropésie de poitrine, (hydro-thorax)	brustwasserfucht.
Kortademigheid of dampigheid.	la pousse, l'asthme.	herzfeldächtigkeij, engbrüstigkeij, dampf.
Blazen, snuiven.	cornard, siffleur.	blafer.
De hoest.	la toux.	husten.

Toevallen der werktuigen tot spijsverteering en afzöndering.

Kribbenbijter.	tiqueur.	kopper, kribbenbeiser.
Onverduwelijkheid.	indigestion.	unverdaulichkeit.
Veriorene eetlust.	dégout.	ekel.
Het buikwee.	la colique.	darmgicht, bauchgrim-
De loop.	le cours de ventre, la diarrhée.	durchfall. (men.)
De bloedloop.	la dyssentérie.	ruhr.
Vetfmelten.	gras fondu, devoyement	fettfchmelzen.
Wormen.	vers.	würmer.
Buikwaterzucht.	l'hydropésie du bas ventre. (ascite.)	die bauchwasserfucht.
Trommelzucht.	le météorisme.	trommelfucht.
Opstopping van water.	la rétention d'urine.	wasser-verhaltung.
Koude pis, louterstal.	la difficulté d'uriner.	kalte pisse.
Ontfleking der nieren.	inflammation des reins. (nephrite.)	nieren-entzündung.
Vermagering of branding.	vercheval fortrait.	die fchnur.

K o o r t -

DER VOORNAAMSTE ZIEKTEN, enz.

Koortfen.

<i>Nederduitsch.</i>	<i>Fransch.</i>	<i>Hoogduitsch.</i>
De koorts.	la fièvre.	das fieber.
Ontstekingskoorts.	fièvre inflammatoire.	das entzündungs-fieber.
	(<i>f. angiotenique</i>)(<i>mique</i>	
Rotkoorts.	fièvre putride(<i>f. adyna-</i>	das faulfieber.
Pestkoorts, legerkoorts	<i>f. pestilentielle, le char-</i>	pestbeule, kriegspest
	<i>bon. (adynamico-ataxique.)</i>	karsum: elkrankh.
Zenuwkoorts.	fièvre nerveuse (<i>f. ata-</i>	das nervenfieber. (heit.
Spanifche hoofdziekte.	<i>le mal d'espagne (xique.</i>	die spanifche kopfkrank-

Uitwendige toevallen.

Eene wond.	une playe.	eine wunde.
Eene zweef.	ulcère.	ein gefchwür.
Eene bloedftorting.	Phémorrhagie.	ein blutfluss.
De ontsteking.	l'inflammation.	die entzündung.
De ettering.	la supuration.	die eiterung.
Het verfterf, koude vuur	la gangrène: (<i>sphacèle</i>)	der brand.
Beenbederf.	la carie des os.	der beinfrass.
Wild vleesch.	chair morte.	fchwammigtes fleisch.
Eene beenbreuk.	une fracture.	ein beinbruch.
Eene darm- navel- lies- breuk.	une hernie inguinale, ombilicale, &c.	ein darm- navel- &c. bruch.

Kneuzingen.

Kneuzing.	contusion.	quetfchung.
Kwetfing door den za- del.	blessure de garot.	fatteldruck.
Brandvlekken.	des cors.	brandflecken.
Peeskwetfing.	nerf-ferrure.	fehnentklapp.

Verrekkingen.

Verrekking.	effort.	ausdehnung.
Verftuiking.	entorse.	verftauchung.
Ontwrichting.	luxation.	verrenkung.

B E N A M I N G E N

<i>Nederduitsch.</i>	<i>Fransch.</i>	<i>Hoogduitsch.</i>
boezlam.	écart.	buglahm.
Heuplam.	effort des branches.	hüßlahm.
Kruislam.	effort des reins.	kreuzlahm.
Overkoot.	bouleté.	ueberkothig.
Verftuiking van het kogelgewricht.	mémarchure.	verrenkung des kugelgelenks.

Gezwellen.

Dikte in het oor.	grosseur dans l'oreille.	ohren-gefehwulst.
De mol of varent.	la taupe ou testudine.	maulwurf- oder fehildd-krötengefehwulst.
(zwellling.		
De vijfelen of oorklier.	les parotides ou avives.	die feifeeln.
Laatfistel aan den hals.	fistule de la saignée	aderlafffistel.
bloedader.	du col.	
Het hangen van den rooster of zwellen van het verhemelte.	le fève ou le lampas.	voller rache, der frosch.
Gezwellen in den mond.	barbillons, aphtes.	hungerzitzen, fröfche.
Borstgezwel.	avantcoeur.	brust-gefehwulst.
Spek- of zakgezwellen.	tumeurs.	balg- oder faekgefehw.
Slagadergezwel.	anéurisme.	fehlagadergefehwulst.
Adergezwel.	varice.	adergefehwulst, krampf-
Watergezwellen.	oedème	wasfergefehwulst. (ader-
Gezwollene beenen en koker.	jambes et fourreau enflé.	angefehwollene fehenkeln und fehlauch.

Koude gezwellen en beënitwasfen.

Legger.	loupe.	ftollbeule.
Schijthak.	capelet ou passe-camp-	piephaecke.
Hazenhak.	jardon.	(ue. hafenhacke.
Peesgallen.	vessigons.	fehnergallen.
Vlotgallen.	molettes.	flusfgalle.
Gezwollene waai.	jarret enflé.	gefehwollenes fprung-
Koe- of bolspat.	éparvin de boeuf.	ochfenfpatt. (gelenk.
Bloed- of aderspat.	varice.	adersfpatt.
Hanenfpat.	éparvin sec.	hahnenfpatt, hahnentritt.
		Been-

DER VOORNAAMSTE ZIEKTEN, enz

<i>Nederduitsch.</i>	<i>Fransch.</i>	<i>Hoogduitsch.</i>
Beengezwel aan het schenkelbeen.	<i>course.</i>	beingeschwulst, kurbe.
Beenspat.	<i>éparvin.</i>	beinspatt,
Overteen, schevelbeen.	<i>suros.</i>	ueberbein.
Klosfen.	<i>osselet, fusée.</i>	spindeln.
Overhoef.	<i>forme.</i>	schale, leisten, ringbein
Wrannen.	<i>porreaux.</i>	warzen.
Een beemuitwas.	<i>exostose.</i>	beinauswuchs.
Een beenvergroeijing.	<i>anchylose.</i>	verknöchering.

Huid ziekten.

De schurft.	<i>la gale.</i>	die raude.
De drooge schurft.	<i>les dartres.</i>	die trockene raude.
De manenschurft.	<i>le roux vieux.</i>	die mänen-raude.
Barsten.	<i>malandres.</i>	raspen.
Kloven.	<i>solandres, crevasses.</i>	id.
mok.	<i>les eaux aux jambes.</i>	die mauke.
egelsvoet.	<i>peigne.</i>	straubfuss. (beulen.
zomerbuilen, uitflag.	<i>ébullition.</i>	fommerbeulen, hitz-

Voet gebreken.

Voetkwerfing.	<i>clou de rue.</i>	fussstich.
Vernagelen.	<i>enclouure.</i>	vernagelen.
Klemhoef.	<i>encastelure.</i>	zwanghuf.
Volvoet.	<i>pied comblé.</i>	vollhuf.
Kwartiervoet.	<i>seime.</i>	hornspalt. (fuss.
Osfenvoet.	<i>pied de boeuf.</i>	ochsenklaue, ochsen-
Steenzallen.	<i>bleimes.</i>	steingallen.
Kroongezwel.	<i>javart.</i>	kronen-geschwulst.
Kroonbetrapping. ¹	<i>atteinte.</i>	kronentritt.
Afvallen des hoefs.	<i>avalure.</i>	(chette. abfallen des hufs.
Rotstraal.	<i>pourriture de la four-</i>	strahlfäule.
Vijgwratten.	<i>porreaux.</i>	seigwarzen.
Fijk of padgezwel.	<i>fic ou crapaudine.</i>	kröte.
Voetkanker.	<i>cancer au pied.</i>	fusskrebs.
Verballen of verpellen.	<i>sole battue.</i>	verballen.

BENAMINGEN DER VOORNAAMSTE ZIEKTEN, enz.

O o g g e b r e k e n .

<i>Nederduitsch.</i>	<i>Fransch.</i>	<i>Hoogduitsch.</i>
Zwelling der oogleden.	enflure des paupières.	anschwellung der augenlieder.
Ontsteking van het bindvliesvlekken.	inflammation de la conjonctive.	entzündung der verbindende augenhaut.
Kwetfing van het hoornvlies.	lésion de la cornée transparente.	Verletzung der hornhaut.
Verduistering van het hoornvlies.	opacité de la cornée dragon.	verdunklung der hornhaut. augenfell.
Verduistering van het waterachtige vocht.	opacité de l'humeur aqueuse.	verdunklung der wässrichte feuchtigkeit.
Maanoogen.	chêval lmatique.	mond blindheit.
De graauwe ftaar.	la cataracte.	der graue ftaar.
De zwarte ftaar.	amaurose, paralysie du nerf optique.	der schwarze ftaar.



VERKLARING

DER

PLAATEN.



PLAAT I.

Heelkundige verrigtingen.

Verbeeldt de wijze om de aderlatingen, het ingeven der geneesmiddelen en het nederwerpen van het paard te verrigten, benevens de werktuigen tot verzekering van hetzelfde.

Fig. 1. a. Vertoont de wijze hoedanig de aderlating aan de halsbloedader verrigt wordt.

1. Plaatting der hand met het lancet, en aanwijzing der plaats waar de aderlating geschiedt.
2. Wijze om den laatband te bevestigen.

b. Wijze om het paard door strikken neder te werpen, waarbij de kluisters met ringen om de vier beenen worden gelegd, en de koord aan die van den linker vóórvoet bevestigd, door alle ringen heengaande, aldaar te voorschijn komt, om de beenen te zamen te kunnen trekken.

c. Iedere gevoederde kluister met dubbele ringen, door welke de koorden gaan, en die van zelve afvallen.

VERKLARING DER PLATEN.

- b.* Kluister met één ring en gesp, welke dient wanneer men gedurende de bewerking eene der beenen moet losmaken.
- c.* De houten praam.
 - 1. Van eene koord voorzien.
 - 2. De steel welke tevens tot een klopper bij het aderlaten dient.
- d.* De mondrooster.
 - 1. Het gedeelte dat den mond des paards opent.
 - 2. Het handvat.
- e.* Het werktuig tot berooken.
 - a. 1. Het komfoor waarin het vuur of een gloeiend ijzer geplaatst wordt.
 - 2. Deszelfs handvat of steel.
 - b. 1. Het gedeelte dat men over hetzelfde heenzet.
 - 2. Deszelfs bovenste gedeelte, dat met
 - 3. De slangwijze pijp eindigt.
 - 4. Schuif en opening tot inwerpen der berookings-poeders.

Fig. 2. Verbeeldt de wijze hoedanig de dranken aan een paard ingegeven moeten worden.





VERKLARING DER PLATEN.

PLAAT II.

Heelkunde.

Verbeeldt de wijze hoedanig de verschillende verbanden gelegd, en op welke eene wijze en waar ter plaatse het, branden verrigt moet worden.

Verbanden.


1. Achtvormig hoofdverband, waaronder men de kompresfen plaatst, zoo bij de mol of varent, het trepaneren, als bij de ooggebreken of eenige beenverbrijzeling.
2. Halfter als een hoofdgestel gevormd en met nestelgaten voorzien, om de verbandstukken op hunne plaats te doen blijven.
3. Verbanden voor het lijf, om de kompresfen voor onderscheidene lichaamswonden te bevestigen.
4. Kruisverband voor de knie.
5. Kruisverband voor de waai.
6. Kootverband.
7. Verband voor de hoef- en kroonbetrappingen.

Het branden.

- a. Het branden van den schouder.
- b. Van de knie- of smeerschijf.
- c. Branden van de binnenzijde der waai, met strepen en punten.
- d. Dat van het koot- en kroongewricht met schuin-
sche streepen en punten.

VERKLARING DER PLATEN.

- e. Van de buigpees en het been, met evenwijdige regtstandige lijnen.
- f. Van de gallen der voorbeenen, met punten.





VERKLARING DER PLATEN.

P L A A T III.

Heelkundige werktuigen.

Vertoont de onderscheidene werktuigen tot het verrigten der aderlatingen en het zetten van dragten.

NOTA. Dezelve zijn alle, uitgenomen de brandijzers, op de helft der natuurlijke groote afgebeeld.

Fig. 1. Een aderlaat-lancet.

- a. De kling.
- b. De punt.
- c. De koker.

2. De aderlating snepper.

- a. Dezelve links
- b. regts en inwendig } te zien.
- c. Van voren

1. Het lancet.

2. De veër.

3. De aftrekker.

4. De veër van denzelven.

5. De kopere doos die het lancet en de veër bevat, en regts met eene schuif geopend en gesloten kan worden.

VERKLARING DER PLATEN.

3. De fontenel- of fetonnaald.
 - a. De scherpe.
 - b. De platte.
 1. De punt.
 2. Het platte gedeelte.
 3. De oogen tot doorsteken van den band.
 4. De schroef.
 5. De moer waarmede beide stukken vereenigd worden.

PLAAT

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



VERKLARING DER PLATEN.

P L A A T IV.

Heelkundige werktuigen.

Verbeeldt de verschillende foorten van mesvormige werktuigen bij de paarden-heelkunde in gebruik.

Fig. 4. Een schalpel of insnijdingsmes met een vast hecht.

- a. De kling.
- b. Het hecht.

5. Eene gebogene puntige bistourie.

6. Eene spitte tweesnijdige bistourie.

7. Eene bistourie met ronde snede.

- a. Het heft.
- b. De kling welke even als bij andere bistourien tuschen het heft bevat wordt.

8. Eene kromme insnijdings-bistourie.

9. Eene diergelijke met een knopje aan de punt.

Hoefmesfen.

10. Een hoefmes of hoef-bistourie.

11. Het groefmes tot openen der zool.

- a. Van voren
 - b. Van ter zijde
- } te zien.


VERKLARING DER PLATEN.

1. De omgebogene tweesnijdige punt.

Fig. 12. Het mijrtenbladvormige mes.

a. Van voren }
b. Van ter zijde } te zien.

13. Een gebogen links hoefmes.



VERKLARING DER PLATEN.

P L A A T V.

Heelkundige werktuigen.

Verbeeldt onderscheidene heelkundige werktuigen en
brandijzers.

Fig. 14. De gebogene infnijdings schaar.

a. Van voren.

b. Van ter zijde.

15. De kromme infnijdings schaar.

16. De gegroefde fonde.

17. Het pincet.

a. Van ter zijde.

b. Van boven.

De brandijzers.

18. De mesvormige brandijzers.

a. Het vierkante mesvormige.

1. Het ijzer.

2. De ijzereestee.

3. De houtgreep.

b. Het bijlvormige.

c. Het mesvormige.

19. De

VERKLARING DER PLATEN.

Fig. 19. De puntige en platte brandijzers.

d. Het puntige of peervormige.

e. Het spitse.

f. Het knopvormige.

g. Het ringvormige tot het schroeijen der staart bij het angliferen.

20. De wondnaalden.

a. De oogen.

b. De driekantige punt.

